
II



Nicolson

Merrill, Philipp. J. Sci. 19: 328-388. 1921.

C. E. RAPPAPORT
LIBRI RARI
ROMA

Pritzel 1396

Burmannus

NICOLAI LAURENTII BURMANNI

FLORA INDICA:

CUI ACCEDIT

SERIES ZOOPHYTORUM INDICORUM,

NEC NON

PRODROMUS FLORAE CAPENSIS.

LUGDUNI BATAVORUM,
Apud CORNELIUM HAEK.
AMSTELAEDAMI,
Apud JOHANNEM SCHREUDERUM.
MDCCLXVIII.

PARENTI OPTIMO

JOANNI BURMANNO

STUDIORUM

SUORUM

DUCI

SACRUM.

PROOEMIUM.

Singulari modo proſpexit natura ſtirpium diſtributioni, quod plures regiones propriis ſuis ſuperbiant plantis, quae morbis illic terrarum praecipue graſſantibus adverſae obſervantur, cumque harum cognitio non tantum curioſitatis cauſſa, ſed ob utilitatem inde redundantem quam maxime iis neceſſaria ſit, qui in morborum curatione fauſto eventu procedere conantur, optime fecerunt illi, qui accurata ſcrutatione obſervationes deſcripſerunt, virtutesque plantarum, in ſingularibus morbis valde laudatas, cum orbe erudito communicarunt, in quibus Veteres, prae caeteris feliciores, maximum nobis attuliſſent lumen, ſi per notas ſpecialiores rite demonſtraſſent ſtirpes, quarum vires in quibusdam caſibus experti fuerant, hi vero cum florum ac fructuum characteres ſaepe neglexerint, incertum nec ſatis diſtinctum in plurimis nobis reliquerunt intellectum, & paucis exceptis magis Pharmaceutici quam veri Botanici dicendi ſunt.

Hac itaque in re hujus aevi Botanici, poſteritati melius conſulentes, noſtro tempore Floras exhibere inceperunt, in quibus plantae, certis in regionibus & locis obviae, penitus neglectae vel incognitae, in claram exponuntur lucem, & orbi Botanico ſecundum ſyſtematicum ordinem diſtribuuntur, ſique Hodoeporici hac in re laudabile ſcrutinium, quod Nobiliſſimus *Rheedius* in accuratiſſimis plantarum Indicarum delineationibus, & *Georgius Everhardus Rumphius* in immenſi laboris deſcriptionibus collocarunt, ſequi vellent, fieri non aliter poſſet, quin ex remotiſſimis Orbis plagis plurimae detegerentur

 ſtir-

ſtirpes, quae ſummum humano generi adferrent emolumentum, optandumque eſſet, ut plures, per nobile Regis Danici & Suecici inſtitutum incitati, in commune bonum id ſequerentur, & hiſtoriae naturalis ex profeſſo periti in diſſitas & nondum accurate exploratas terras mitterentur, qui reliqua, quae globi terreſtris ſinu abdita proferuntur, in publicam emitterent lucem; hinc non a re alienum exiſtimavi, ſi ex Indicarum plantarum theſauro, quem ſubſecivis horis ſaepius perluſtravi, Floram quamdam deſcriberem, in qua plantae, barbaris incolarum nobisque incognitis nominibus tantum indigitatæ, more Botanicis conſueto exponerentur, &, quantum ex ſicco Herbario licitum, aequis & peritis Hiſtoriae Naturalis cultoribus exhiberentur.

Hinc vagas plantas in ordinem diſponere, cum figuris & deſcriptionibus auctorum comparare, obſcuras & incognitas illuſtrare incepi, obſtupuique, cum ingentem rariſſimarum numerum, & incognitarum ſyllogen viderem, quas cariſſimus meus Parens, harum deliciarum amantiſſimus & expertiſſimus, ſingulari fortuna & induſtria per dimidiam fere ſeculi partem collegit, obtinuitque ex Collectionibus vaſtiſſimis praeſtantiſſimorum Botanicorum, *Piſonis*, *Hermanni*, *Garcini*, *Breynii*, *Oldenlandi*, *Harthogii*, *Kleinhovii*, *Outgaerdenii*, *Pryonis*, quorum favore & beneficio pulcherrimam & locupletiſſimam hanc collectionem poſſidemus, quique materiem huic Florae ſubminiſtrarunt, quam methodice, uti peritis mox conſtabit, & quidem ſecundum normam ſyſtematis magni & immortalis *Linnæi*, (Praeceptoris mei eo, quo Upſaliae verſatus ſum, tempore honoratiſſimi &

fa-

familiariſſimi, qui ſuas obſervationes circa nonnullas plantas mecum communicavit,) digeſſi & diſpoſui, adnexis eximiorum Auctorum ſynonymis, & rariſſimarum plantarum deſcriptionibus, quaeque novae & antea numquam vel obſcure delineatae fuerunt, iconibus illuſtravi, quum ſolae deſcriptiones in Botanicis, licet exactae & prolixae, lectoribus haud claram ſtirpis formam exprimant: quum vero plures ex ſpeciminibus, quorum quædam ante ſeculi dimidium ſub torrida zona exſiccata fuere, deſumſerim, hinc factum eſt, ut in nonnullis, quae nimis arida nec extricanda oculorum aciem aufugiebant, fructificationum partes non tam rite, quam quidem exoptaveram, lectoribus meis conſpiciendas praebere potuerim.

Porro adnexa eſt Indiae Orientalis Zoophytorum ſeries, „quae *Cl. Pallas* vocavit plantas quaſi animatas, vel ani„malia in plantae formam excreſcentia, & alias plantarum „partes quoque affectantia, hinc Plantae-formia vel Plant-Animalia dicenda, in quibus animalem indolem cum Vegetabilis habitu conjunxit natura, mixtamque formam & compagem inter plantas & animantia mediam habent; quae Zoophyta ad plantarum marinarum claſſem a priſtinis Botanicis relata, ex creſcendi forma, quam fruticum inſtar in pelagis monſtrant, nominibus, ad plantas terreſtres accedentibus, indigitata fuere, licet ſagaciſſimus *Rumphius*, cujus perſpicuitatem non tantum in vegetabili ſed & in animali regno cum admiratione perluſtramus, ſuo tempore jam haeſitaſſe videatur, ad quaenam regna forent referenda, quum in ejus Muſaeo L. I. c. 37. cruſtaceis & teſtaceis tertium ſubjunxerit ordinem.

Zoo-

Zoophyta continentem, quorum plurima in Ejus Amboinenſi Herbario t. 6. l. 12. deſcribuntur.

Haec vero cum reliquis variorum auctorum & regionum Zoophytis in ordinem ſyſtematicum eleganter ad genera & ſpecies retulit indefeſſo labore exercitatus admodum, & Zoologorum peritiſſimus ſcrutator, cum maxime Petropoli Profeſſor clariſſimus P. S. Pallas, in Zoophytorum Elencho, cujus ductum in ſerie mea ſecutus ſum.

Denique Florae huic addidi Florae Capenſis prodromum, in quo prae reliquis recenſentur plantae, quae ab *Oldenlando* in Promontorio Bonae Spei collectae in ejus herbario occurrunt: Cum vero multae culinares & Europeae aliis inmixtae conſpiciantur, dubitandum, num omnes pro nativis habendae, an potius per ſemina illuc allatae vel ſola culturae ope propagatae fuerint; Illarum tantum generica nomina cum trivialibus, additis quorumdam Iconographorum teſtimoniis, recenſui, quae vero nuſquam expreſſae inveniuntur, eas breviter per concinnas deſcriptiones delineare conatus fui, cumque a longo abhinc tempore quotannis novae raraeque in ipſis Promontorii locis collectae plantae, beneficio Gubernatorum tam per ramulos quam per ſemina & bulbos afferantur, non inutile me facturum exiſtimavi, ſi in poſterum accuratiori examini ſubjicerem eas, quas prodigioſo naturae proventu terra illa profert, quaeque peculiari facie & ſingulari duriuſculo habitu ſe ab omnibus aliis plantis plerumque diſtinguunt.

Hiſce interim utimini, Lectores Benevoli, donec plena harum ſtirpium Flora in lucem prodeat, in qua recenſitae ad genera referentur, & obſcurae, favente ſummo Numine, clarius exponentur.

FLO-

FLORA INDICA.

MONANDRIA MONOGYNIA.

CANNA (*indica*) foliis ovatis utrinque acuminatis nervoſis. *Linn. ſp.* 1. *Fl. zeyl.* 1. *Roy. lugdb.* 11. *n.* 1.
Canna indica rubra. *Beſl. eyſt. aut. ord.* 2. *f.* 1. 2.
Canna indica, flore rubro punctato. *Merian. floril. t.* 18. *Surin. t.* 41. *Weimann.* 37. *t.* 297. 298. *Swert. flor.* 2. *t.* 32. *Moriſ. hiſt.* 250. *ſ.* 8. *t.* 14. *f.* 1.
Cannacorus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 177. *t.* 71. *f.* 2.
Cannacorus latifolius vulgaris. *Tourn. inſt.* 367. *Burm. zeyl.* 53.
Arundo indica latifolia. *Bauh. pin.* 19.
Katu-bala. *Rheed. mal.* 11. *p.* 85. *t.* 43.
Meeru. *Piſo. ind.* 212. *f.* 1.
Habitat inter Tropicos Aſiæ, Africæ, Americæ.
Variat floribus croceis, punctatis, & flavis.

AMOMUM (*Zingiber*) ſcapo nudo, ſpica ovata. *Linn. ſp.* 1. *Fl. zeyl.* 3. *Roy. lugdb.* 12. *n.* 1.
Zingiber majus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 156. *t.* 66. *f.* 1.
Zingiber anguſtiore folio fœmina utriusque Indiæ alumna. *Plukn. alm.* 397. *Burm. zeyl.* 235.
Zingiber. *Bauh. pin.* 35. *Brown. jam.* 119. *Pom. drog.* 61. *f.* 1.
Caſſamuniar officinarum. *Petiv. gazoph.* 1. *t.* 27. *f.* 1.
Inſchi. *Rheed. mal.* 11. *p.* 21. *t.* 12.
Creſcit in utraque India.

AMOMUM (*Zerumbet*) ſcapo nudo, ſpica oblonga obtuſa aphylla. *Linn. ſp.* 1. *Fl. zeyl.* 2. *Roy. lugdb.* 12. *n.* 2. *Mill. ic. n.* 5. *t.* 26. *Ehret. Pict. t.* 14. *f.* 1. *Brown. jam.* 113. *Pom. drog.* 61. *f.* 2.
Zingiber latifolium ſylveſtre. *Herm. lugdb.* 636. *t.* 637. *Burm. zeyl.* 234.
Zerumbet. *Petiv. gazoph. t.* 22. *f.* 3.
Lampujum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 148. *t.* 64. *f.* 1.
Katou-inſchi-kua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 27. *t.* 13.
Paco-ceroca. *Piſo. ind.* 213. *f.* 2.
Habitat in Java, Malabara, Zeylona, Jamaica.

AMOMUM (*Cardamomum*) ſcapo ſimpliciſſimo breviſſimo, bracteis alternis laxis. *Linn. ſp.* 2. *Fl. zeyl.* 4.
Amomum verum. *Petiv. gazoph. t.* 20. *f.* 2.
Cardamomum minus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 152. *t.* 65. *f.* 1.
Cardamomum Enſal dictum. *Burm. zeyl.* 54.
Elettari. *Rheed. mal.* 11. *p.* 9. *t.* 6.
Habitat in Indiæ umbroſiſſimis, cænoſis montium radicibus, & paludoſis locis.

COSTUS (*arabicus*) *Linn. ſp.* 2. *Fl. zeyl.* 5. *Roy. lugdb.* 11. *Hill. pl.* 149. *t.* 3. *Merian. ſurin.* 36. *t.* 36.
Coſtus arabicus. *Bauh. pin.* 36.
Coſtus indicus Violæ martiæ odore. *Burm. zeyl.* 78.
Zingiber ſylveſtre majus, fructu in pediculo ſingulari. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 165. *t.* 105. *f.* 2.
Amomum minus, ſcapo veſtito, floribus ſpicatis. *Brown. jam.* 113.
Alpinia floribus ſpicatis, bracteis ovalibus. *Jacq. amer.* 11.
Tſiana-kua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 15. *t.* 8. quæ optime cum miſſa ex Java planta convenit.
Paco-caatinga. *Marcgr. braſ.* 48.
Zerumbed? *Rumph. amb.* 5. *p.* 172. *t.* 68.
Habitat in utraque India.

MARANTA (*Galanga*) culmo ſimplici. *Linn. ſp.* 3. foliis lanceolatis ſubſeſſilibus.
Galanga. *Rumph. amb.* 5. *p.* 143. *t.* 63. *Piſo. ind. mant.* 191. *Burm. zeyl.* 102. *Cluſ. arom.* 1. *p.* 211.
Habitat in Indiæ locis ſaxoſis.

MARANTA (*malaccenſis*) culmo ſimplici, foliis ovatis, petiolatis.
Galanga malaccenſis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 177. *t.* 71. *f.* 1.
Habitat in Malacca.

Culmus in noſtra planta erectus villoſus, (nec glaber uti in *Rumph.* figura) floribus duodecim alternis. Folia e viridi tomentoſa, lineata inſtar *Cannæ.*

CURCUMA (*rotunda*) foliis lanceolato-ovatis, nervis lateralibus rariſſimis. *Linn. ſp.* 3. *Fl. zeyl.* 6. *Roy. lugd.* 12. *n.* 1.
Curcuma. *Rumph. amb.* 5. *p.* 162. *t.* 67.
Curcuma foliis latioribus & rotundioribus. *Breyn. prod.* 2. *p.* 40.
Curcuma radice rotunda. *Burm. zeyl.* 84.
Manja-kua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 19. *t.* 10.
Per totam Indiam in hortis colitur cum ſubſequente.

CUR-



1 BOERHAVIA *diandra*.
2 ——————— *erecta*.

CURCUMA (*longa*) foliis lanceolatis, nervis lateralibus numeroſiſſimis. *Linn. ſp.* 3. *Fl. zeyl.* 7. *Roy. lugdb.* 12. *n.* 2.
Curcuma radice longa. *Herm. lugd.* 208. *t.* 209. *Burm. zeyl.* 83.
Manjella-kua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 21. *t.* 11.

KÆMPFERIA (*Galanga*) foliis ovatis ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 3. *Fl. zeyl.* 8. *Roy. lugdb.* 12.
Aro orchis tuberoſa platyphyllos. *Burm. zeyl.* 33. *t.* 13. *f.* 1.
Calceolus philippenſis pumila, plantaginis folio, radice alexipharmaca. *Petiv. gazoph.* 29. *t.* 19. *f.* 7.
Sonchorus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 173. *t.* 69. *f.* 2.
Wanbom. *Kæmpf. amoen.* 901. *t.* 902.
Colchicum indicum platyphyllum, radice tuberoſa, Carlinæ odore & ſapore, flore albo. *Herm. zeyl.* 54.
Katsjula-kelengu. *Rheed. mal.* 11. *p.* 81. *t.* 41.
Hortorum indigena, raro extra eos reperitur.

KÆMPFERIA (*rotunda*) foliis lanceolatis petiolatis. *Linn. ſp.* 3. *Fl. zeyl.* 9.
Zedoaria rotunda. *Bauh. pin.* 36. *H. Beaumont.* 14.
Colchicum zeylanicum, flore, violæ odore & colore, ephemero. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 646.
Malan-kua. *Rheed. mal.* 11. *p.* 17. *t.* 9.
In montanis Indiæ locis habitat.

BOERHAVIA (*diffuſa*) caule diffuſo. *Linn. ſp.* 4. *Fl. zeyl.* 10. *Roy. lugdb.* 234. *n.* 1.
Boerhavia ſolanifolia major. *Vaill. ſerm.* 51.
Valerianella curaſſavica, ſemine aſpero viſcoſo. *Herm. par.* 237. *t.* 237.
Thalictro affinis indica Alni folio, ſemine ſtriato aſpero. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 101.
Antaniſophyllum ſolanifolium majus. *Vaill. act.* 1722. *p.* 190.
Herba indica, foliis ſubrotundis, floſculis plurimis ſimul cyathiformibus, vaſculo oblongo. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 390.
Habitat in arenoſis Indiæ locis.

BOERHAVIA (*diandra*) glabra diffuſa, floribus diandris. *Linn. ſp.* 4. ubi deſcr. *Tab.* 1. *f.* 1.

BOERHAVIA (*erecta*) caule erecto glabro. *Linn. ſp.* 3. *Tab.* 1. *f.* 2.
Boerhavia, Solanifolia, erecta, glabra. *Amm. herb.* 241.
Talu-dama. *Rheed. mal.* 7. *p.* 105. *t.* 56.
Ex Java ſæpius miſſa ſpecimina caule glabro ac pubeſcente differunt.

NYCTANTHES (*arbor triſtis*) caule tetragono, foliis ovatis acuminatis, pericarpiis membranaceis compreſſis. *Linn. ſp.* 8. *Fl. zeyl.* 11.

Arbor triſtis myrto ſimilis. *Bauh. pin.* 469. *Plukn. phyt.* 46. *t.* 262. *f.* 4. *almag.* 46. *Cluſ. arom. l.* 2. *p.* 225. *f.* 1. *Burm. zeyl.* 33. *Grim. lab. zeyl.* 116.

Manja-pumeran. *Rheed. mal.* 1. *p.* 35. *t.* 21.

In Zeylona, Malabara & Java frequens.

NYCTANTHES (*Sambac*) foliis inferioribus cordatis obtuſis, ſuperioribus ovatis acutis. *Linn ſp.* 8. *Fl. zeyl.* 12. *Roy. lugdb.* 398.

Jaſminum Limonii folio conjugato. *Burm. zeyl.* 128. *t.* 58. *f.* 2. *Angl. hort. catal. t.* 7.

Jaſminum, ſeu ſambac arabum, folio acuminato. *Till. piſ.* 87. *t.* 31.

Jaſminum arabicum. *Cluſ. cur.* 3. *t.* 3.

Syringa arabica, foliis mali aurantii. *Bauh. pin.* 398.

Flos manoræ. *Rumph. amb.* 5. *p.* 52. *t.* 30.

Katu-tsjiregam-mulla. *Rheed. mal.* 6. *p.* 95. *t.* 54.

Dauen-malati Portug. Javanis.

Differt flore pleno, ut ex miſſis ſpeciminibus, variisque auctorum tabulis conſtat, tum & foliis alternis & oppoſitis, creſcit in plurimis Indiæ locis, & colitur in hortis.

NYCTANTHES (*undulata*) foliis ovatis acuminatis undulatis, ramis teretibus, pedunculis axillaribus. *Linn. ſp.* 8.

Jaſminum indicum, flore polypetalo exalbido, fructu minori. *Raj. hiſt.* 1601.

Tsjiregam mulla. *Rheed. mal.* 6. *p.* 97. *t.* 55.

Folle-Aaros Javanis.

Creſcit in India & ob gratiſſimum florum odorem colitur.

Ex iis nectunt fæminæ coronas feſtales, inunguntque caput oleo, quod paratur ex floribus.

NYCTANTHES (*hirſuta*) petiolis pedunculisque villoſis, floribus corymboſis. *Linn. ſp.* 8.

Rava-pu. *Rheed. mal.* 4. *p.* 99. *t.* 48.

Habitat in India, at in Malabara non occurrit, niſi culta.

Circa noctem flores ſeſe aperiunt, & oriente ſole decidunt.

Tab. 2. NYCTANTHES. (*triflora*) foliis alternis, ramulorum oppoſitis ovatis, pedunculis terminalibus ternis, pedicellis unifloris.

Jaſminum javanicum *Dni. Garcin.*

Habitat in Java.

Caulis fruticoſus teres glaber, ramulis oppoſitis divergentibus. *Fol.* caulina alterna, ſubpetiolata lanceolata ovata integerrima glabra ſubtus fuſca, ramea oppoſita. *Pedunc.* ramei terminales terni, pedicellis unifloris. *Cal* tubuloſus ſexfidus, ſegmentis linearibus breviſſimis. *Cor.* ſæpius quinque partita, longitudine pedicellorum.

NYC-



NYCTANTHES *triflora*

2



NYCTANTHES triflora

NYCTHANTHES (*multiflora*) pedunculis multifloris terminalibus, foliis ovatis. *Tab. 3. f. 1.*
Jaſminum chinenſe rotundifolium *Dni. Kleynhof*, a quo miſſum.
Nalla-mulla. *Rheed. mal. 6. p. 87. t. 50.*
Habitat in China, & Malabara.

Caul. fruticoſus ſolidus erectus teres pubeſcens ramoſus. *Fol.* oppoſita petiolata ovata integerrima glabra. *Fl.* terminales capitati. *Cal.* ſexfidus villoſus, laciniis linearibus. *Cor.* tubus calyce duplo longior, limbus ſexfidus aliquando ſeptemfidus.

NYCTANTHES. (*anguſtifolia*) foliis lanceolatis obtuſis ovatisque. *Linn. ſp.* 8. pedunculis terminalibus geminis.
Jaſminum indicum anguſtifolium, fructu gemino. *Tourn. inſt.* 598.
Jaſminum indicum, flore polypetalo candido, oris rufeſcentibus. *Raj. hiſt.* 1602.
Katu-pitsjegam mulla. *Rheed. mal. 6. p. 93. t.* 53.
Creſcit in Java & Malabar.

NYCTANTHES. (*acuminata*) foliis lanceolatis acuminatis, pedunculis bigeminis, bifloris.
Jaſminum indicum, folio oblongo, flore albo pleno odoratiſſimo. *Burm. zeyl.* 129. *t.* 59.
Syringa malabarica lacteſcens, flore pleno niveo odoratiſſimo. *Amman. char. pl.* 483.
Flos manilhanus. *Rumph. amb. t.* 4. *p.* 87. *t.* 39.
Nandi-ervatam major. *Rheed. mal.* 2. *p.* 105. *t.* 54.
In Java, Malabara, Zeylona indigena, tranſlata a Portugallis ex Manilhis in Amboinam.

Pedunculi terminales & axillares. Differt flore pleno & ſimplici, tranſmittitur ſub nomine *Folla-Martega.*

JASMINUM. (*officinale*) foliis oppoſitis pinnatis. *Linn. ſp.* 9. *Ry .ugdb.* 397. *n.* 1.
Jaſminum vel Gelſeminum, flore albo candido odorato. *Beſl. eyſt. æſt.* 11. *p.* 2. *Lob. hiſt.* 542. *icon.* 106. *J. Bauh. hiſt.* 2. *p.* 101.
Jaſminum vulgatius, flore albo. *Bauh. pin.* 397. *Duham. arb.* 309. *t.* 122.
Ex India huc allata, nunc fere indigena in noſtris hortis ubique colitur cum grandifloro, qui fragantis odoris ab hac differt caule erecto.

JASMINUM (*grandiflorum*) foliis oppoſitis pinnatis, foliolis extimis confluentibus. *Linn. ſp.* 9. ubi vid. deſcr.
Jaſminum humilius, magno flore. *Bauh. pin.* 397. *Merian. t.* 46.
Gelſeminum catalonicum. *Camer. epit.* 37. flore albo. *Beſl. eyſt. æſt.* 11. *p.* 2.

Jaſminum hiſpanicum, magno flore externe rubente. *J. Bauh. hiſt. t.* 2. *p.* 101. *Angl. Hortul. cat. t.* 7.
Pitsjegam-mulla. *Rheed. mal.* 6. *p.* 91. *t.* 52.
Creſcit in utriusque Indiæ locis arenoſis, in hortis noſtris vulgare.

JASMINUM (*azoricum*) foliis oppoſitis ternatis. *Linn. ſp.* 9. *Roy. lugdb.* 396. *n.* 2.
Jaſminum azoricum trifoliatum, flore albo odoratiſſimo. *Commel. hort.* 1. *p.* 159. *t.* 82.
Jaſminum album trifoliatum, flore magno. *Plukn. alm.* 195. *t.* 303. *f.* 1.
Jaſminum ſylveſtre triphyllum, floribus rubellis umbellatis. *Burm. zeyl.* 127. *t.* 58. *f.* 1.
Creſcit in variis Indiæ locis, frequens in hortis.

Differt caule ſulcato & foliorum magnitudine.

JASMINUM. (*odoratiſſimum*) foliis alternis ternatis pinnatisque, ramis teretibus. *Linn. ſp.* 10. *Roy.* 397. *n.* 4.
Gelſeminum Indicum flavum odoratiſſimum. *Ferrar. cult. t.* 93.
Jaſminum flavum odoratum. *Barr. ic.* 62.
Habitat in India, teſtibus *Ferrario* & *Barrelerio.*

Tab. 3. *f.* 2. JASMINUM (*oblongum*) foliis oppoſitis ſimplicibus, pedunculis alternis axillaribus unifloris.
Jaſminum javanicum. *Herb. Garcin.*
Habitat in Java.

Rami teretes, ſimpliciſſimi, *Fol.* oppoſita petiolata ovalia integerrima cum acumine glabra. *Pedunc.* axillares alterni uniflori. *Fl.* lutei minores quam in odoratiſſimo.

OLEA (*indica*) foliis lanceolatis ſubtus tomentoſis.
Olea indica *Dni. Kleynhof*, a quo 1758. ex Java miſſa; quæ vix differt ab Europæa.

CHIONANTHUS. (*zeylonica*) pedunculis paniculatis multifloris. *Linn. ſp.* 11. *Fl. zeyl.* 14. *Duham. arb.* 165. *t.* 63.
Arbor zeylanica, Cotini foliis ſubtus lanugine villoſis, floribus albis cuculi modo laciniatis. *Plukn. alm.* 44. *t.* 241. *f.* 4. *Raj. dendr.* 3. *p.* 124. *Burm. zeyl.* 31.
Ghaeriethaghas. *Herb. Herm.* ſeu arbor bovina. *Muſ. zeyl.* 23 & 33. *Burm. zeyl.* 105.
Habitat in Zeylona.

JUSTI-



1. *NYCTANTHES multiflora.*
2. *JASMINUM oblongum.*
3. *AZALEA rosmarinifolia decandra.*

JUSTICIA (*Adhatoda*) arborea, foliis lanceolatis ovatis, bracteis ovatis perſiſtentibus, corollarum galea concava. *Linn. ſp.* 20. *Fl. zeyl.* 16. *Roy. lugdb.* 291. *no.* 1.
Adhatoda zeylanenſium. *Herm. lugdb.* 642. *t.* 643. *Plukn. alm.* 9. *t.* 173. *f.* 3. *Burm. zeyl* 6.
Arbor indica, cujus cortex fœtum extrahit. *Herm. muſ. zeyl. p.* 23.
Ecbolium zeylanenſium, foliis laurinis. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 59. ubi deſcr.
Ecbolium. *Rivin. mon.* 129.
Habitat in Zeylona & Java, unde ſæpius miſſa, in hortis vulgaris.

JUSTICIA (*Ecbolium*) arborea, foliis lanceolato-ovatis, bracteis ovatis deciduis mucronatis, corollarum galea reflexa. *Linn. ſp.* 20. *Fl. zeyl.* 17.
Adhatoda ſpica longiſſima, flore reflexo. *Burm. zeyl.* 7. *t.* 4. *f.* 1.
Adhatoda floris labio ſuperiore anguſtiſſimo, & ad poſteriora reflexo. *Tourn. inſt.* 175.
Arbor zeylanica, floribus cæruleis in ſpica diſpoſitis. *Herm. Muſ. zeyl.* 33.
Curimi forte prima ſpecies e Madaraſpatan. *Plukn. alm.* 126. *t.* 171. *f.* 4.
Adhatoda zeylanica, plantaginis folio. *Herb. Garcin.*
Carim-curini. *Rheed. mal.* 2. *p.* 31. *t.* 20.
Invenitur præcipue in Malabara & Zeylona.

Floret quotannis in horto, maturaque profert ſemina, *Caul.* ſuffruticoſus, bipedalis, *Cor.* caduca albicans nunquam cærulea, uti in naturali ſolo.

JUSTICIA (*infundibiliformis*) fruticoſa, foliis lanceolato-ovatis quaternis, bracteis lanceolatis ciliatis. *Linn. ſp.* 21. imbricatis, pedunculis longiſſimis.
Herba fruticoſa indica, foliis ad genicula quaternis, ſpicis ſquamoſis, flore monopetalo, labio tripartito, capſulis oblongis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 402.
Manja-kurini. *Rheed. mal.* 9. *p.* 121. *t.* 62.
Creſcit in Malabar & Java, unde tranſmiſſa ſub nomine *Tryba-Japan*, quaſi ex Japan allata.

Fl. lutei vel aurantii, deſcripti. a. *Linn. in ſpec.*

JUSTICIA (*picta*) fruticoſa, foliis lanceolato-ovatis pictis, corollis fauce inflatis. *Linn. ſp.* 21.
Folium bracteatum. *Rumph. amb.* 4. *p.* 73. *t.* 30.
Periclymenum ſinenſe variegatum, flore ſanguineo amplo, Tjude-maram. *H. mal. Breyn. prodr.* 2. *p.* 89.
Periclymenum indicum, foliis maculatis latioribus. *Burm. zeyl.* 186.
Tsjude maram. *Rheed. mal.* 6. *p.* 111. *t.* 60.
Transfertur ex China & Manillis in Malabaram, Amboinam, & Javam, unde accepimus, ubi colitur in hortis & per ramos propagatur.

Deſcr. floris vid. in *Sp. Linn.* Caul. ſtriatus glaber. Fol. oppoſita ſubpetiolata integerrima acuta glabra, in medio macula flava lucide colorata.

JUSTI-

JUSTICIA (*Betonica*) fruticoſa, foliis lanceolato-ovatis, bracteis ovatis acuminatis venoſo-reticulatis coloratis. *Linn. ſp.* 21. *Fl. zeyl.* 18.
Adhatoda flore minore. *Journ. inſt.* 175.
Adhatoda malabarica. *Herb. Garcin.*
Betonica fruteſcens. *Bont. jav.* 146.
Betonica Hormini ſativi coma, Amaranthi foliis. *Burm. zeyl.* 47.
Frutex indicus ſpicatus: florum pediculis brevibus. *Raj. hiſt.* 709.
Bem-curini. *Rheed. mal.* 2. *p.* 126. *t.* 21.
Creſcit in variis Indiæ locis.

JUSTICIA (*procumbens*) foliis lanceolatis integerrimis, ſpicis terminalibus lateralibusque alternis, bracteis ſetaceis. *Linn. ſp.* 22. *Fl zeyl.* 15.
Euphraſia ſinica, Parietariæ foliis, Rubiæ modo ſpicatis. *Plukn. amalth.* 83. *t.* 392. *f.* 4.
Euphraſia, Alſines anguſtiore folio, Rubiæ modo ſpicata golcondea. *Plukn. alm.* 142. *t.* 56. *f.* 3.
Planta ſpicata, floribus cæruleis, hulunaykola dicta. *Burm. zeyl.* 194.
Tjeru-tardavel. *Rheed. mal.* 10. *p.* 187. *t.* 94.
Habitat in Zeylona & Java.

Conveniunt noſtra ſpecimina cum *H. mal.* & prima *Plukn.* (in qua ſpicæ longiores) figura, foliis magis ovatis, ſpicis ſeſſilibus imbricatis brevioribus incraſſatis.

JUSTICIA (*pectinata*) diffuſa, ſpicis axillaribus ſeſſilibus tomentoſis ſecundis, dorſo imbricatis, bracteis ſemilanceolatis. *Linn. ſp.* 22. *Amoen. acad* 4. *p.* 299. ubi deſcript.
Euphraſia indica Ladani ſegetum folio, flore amplo purpureo. *Plukn. amalth.* 84. *t.* 393. *f.* 1.
Habitat in India.

JUSTICIA (*repens*) foliis ovatis ſubcrenatis, ſpicis terminalibus, bracteis lanceolatis. *Linn. ſpec.* 22. *Fl. zeyl.* 20.
Adhatoda ſpicata, floſculos ex foliolis membranaceis producens. *Burm. zeyl.* 7. *t.* 3. *f.* 2.
Adhatoda zeylanica minima, flore albo. *Hart. MSS.*
Adhatoda maderaſpat: ſpica longa foliacea, marginibus albis. *Petiv. muſ. n.* 338.
Habitat in Zeylona.

Tab. 4. *f.* 1. JUSTICIA (*chinenſis*) herbacea, foliis ovatis, floribus lateralibus, pedunculis trifloris, bracteis ovalibus. *Linn. ſp* 22. ubi deſcr.
Planta, quæ in urbe Batavia creſcit juxta muros. *Herb. Garcin.*
Habitat in China.

Flores verticillati, *Pedunc.* axillares ex uno centro quinque, bracteæ ad baſin maculatæ ſtriatæ acuminatæ.

JUSTI-



1. JUSTICIA *chinensis*.
2. ——— *gangetica*.
3. ——— *madurensis*.



1. *JUSTICIA chinensis.*
2. ——— *gangetica.*
3. ——— *madurensis.*

JUSTICIA (*gangetica*) foliis ovatis, racemis ſimplicibus longis, floribus alternis ſecundis, bracteis obſoletis. *Linn. ſp.* 24. *Amœn. acad.* 4. *p.* 299. ubi deſcr. *Tab.* 4. *f.* 2.
Adhatoda minor. *D. Kleinhof.*
Habitat in Java.

JUSTICIA (*echioides*) foliis lanceolato-linearibus obtuſis ſeſſilibus, ramis adſcendentibus ſecundis, bracteis ſetaceis. *Linn. ſp.* 22. *Fl. zeyl.* 21.
Euphraſiæ affinis indica echioides. *Herm. lugdb.* 668. *t.* 669.
Digitali ſimilis planta bicapſularis, flore tubuloſo, galea trifida, & labio integro obtuſo conſtante. *Burm. zeyl.* 88.
Gratiolæ adfinis echioides zeylanica major. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 69.
Bugloſſum echioides zeylanica, foliis convolvuli indici minoris cærulei. *Breyn. eph. nat. cur. ann.* 4. *obſ.* 159
Aſperifolia indica, foliis ex adverſo binis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 660.
Peetumba. *Rheed. mal.* 9. *p.* 87. *t.* 46.
Habitat in Malabaræ & Zeylonæ locis incultis, humidis & ſordidis.

JUSTICIA (*paniculata*) diffuſa, panicula axillari, foliis ſeſſilibus lanceolatis.
Adhatodæ ſimilis planta zeylanica. *Herb. Garzin.*
Cara-caniram. *Rheed. mal.* 9. *p.* 109. *t.* 56. quæ magnitudine, & foliis latioribus a noſtra tantum differt. Flores in noſtro ſpecimine ſecundi.
Habitat in Malabara & Zeylona.

JUSTICIA (*madurenſis*) fruticoſa, foliis ovalibus obtuſis dentatis, floribus axillaribus ſolitariis. *Tab.* 4. *f.* 3.
Adhatoda madurenſis fruteſcens, ſampſanchi folio, caule argenteo. *Herb. Garzin. Petiv. Gazoph. t.* 2. *f.* 8.
Habitat in *Madura.*

Caulis fruticoſus ſolidus teres glaber albicans. *Folia* oppoſita ſubpetiolata obverſe ovata glabra denticulata obuſa, apice vel emarginata vel acuminata. *Bracteæ* binæ deciduæ. *Flores* rariores axillares. *Per.* capſ. oblonga baſi anguſtata acutiuſcula.

JUSTICIA (*naſuta*) foliis lanceolato-ovatis integerrimis, pedunculis dichotomis. *Linn. ſp.* 23. ubi deſcr.
Adhatoda foliis ſibi mutuo oppoſitis, flore carneo. *Dn. Bryon.*
Pulcolli. *Rheed. mal.* 9. *p.* 135. *t.* 69.
Creſcit in locis arenoſis in Malabara & Java.

JUSTICIA (*Moretiana*) herbacea, foliis lanceolatis integerrimis, floribus axillaribus, ſolitariis.

Adhatoda, flore ſolitario ex ſingula folii ala proveniente. *Burm. zeyl.* 7. *t.* 3. *f.* 1.

Moretiana. *Rumph.* 6. *p.* 53. *t.* 23.

Creſcit in variis locis Indiæ arenoſis.

Caulis herbaceus angulatus. *Folia* oppoſita remota ſubpetiolata lanceolato-acuminata integerrima. *Flores* axillares ſolitarii, *capſula* ut in madurenſi.

JUSTICIA (*purpurea*) foliis ovatis utrinque mucronatis integerrimis glabris, caule geniculato, ſpicis ſecundis. *Linn. ſp.* 23. ubi deſcr. *Osb. it.* 230.

Folium tinctorum. *Rumph.* 6. *p.* 51. *t.* 22. *f.* 1.

Habitat in China & Amboina, ubi planta repens læte viget, ac ſeſe propagat ex nodis radicantibus.

JUSTICIA (*bivalvis*) foliis lanceolato-ovatis, pedunculis ſexfloris, pedicellis lateralibus bifloris, bracteis ovatis parallelis. *Linn. ſp.* 23.

Bungum. *Rumph.* 6. *p.* 55. *t.* 22. *f.* 2.

Adel-odagam. *Rheed. mal.* 9. *p.* 81. *t.* 43.

Habitat in locis arenoſis Malabaræ, Amboinæ & Javæ, unde recepimus foliis magis ovatis quam in exhibitis figuris, ramis absque nodis, quibus præcipue a præcedenti differt.

JUSTICIA (*Gendaruſſa*) fruticoſa, foliis lanceolatis integerrimis, ſpicis terminalibus ſimplicibus.

Adhatoda malabarica, ſalicis folio, floribus ſpicatis. *Herb. Garzin.*

Gendaruſſa ſoſa. *Rumph.* 4. *p.* 70. *t.* 28.

Vada-kodi. *Rheed. mal.* 9. *p.* 79. *t.* 42.

Creſcit in Malabara, Amboina & Java, unde ſpecimina ſæpius miſſa.

Caul. fruticoſus, erectus, teres, geniculatus, glaber. *Fol.* decuſſata, ſubpetiolata, lanceolata, integerrima, venis rubris, glabra. *Spica* terminalis, ſimplex, floribus oppoſitis. *Bracteæ* lanceolatæ apice ſetaceo. *Cal.* perſiſtens breviſſimus, *corolla* lutea. *Stilus* perſiſtens, longitudine corollæ. Raro floret in *Amboina*, ubi variat ſilveſtris & domeſtica; ex Java binas quoque recepimus ſpecies, (vulgarem & ſilveſtrem) quæ in hortis coluntur & per ſurculos propagantur. vid. *Rumph.* 4. *p.* 72. *t.* 29. ubi exhibetur Femina, caule geniculato, ſpicis ſparſim inter folia axillaribus.

Tab. 5. *f.* 1. JUSTICIA (*nutans*) herbacea, foliis lanceolatis denticulatis, pedunculis terminalibus cernuis, bracteis ſetaceis.

Habitat in Java, unde cum ſubſequenti absque denominatione miſſa.

Caul.



1. JUSTICIA nutans.
2. DIANTHERA hyssopifolia.
3. MOLLUGO stricta.
4. ——— spergula.



1. JUSTICIA nutans.
2. DIANTHERA hyssopifolia.
3. MOLLUGO stricta.
4. ——— spergula.

Caul. herbaceus erectus teres ſtriatus, ramis ex alis alternis. Fol. oppoſita petiolata denticulata bipollicaria glabra. Pedunc. breviſſimi cernui terminales, floribus nutantibus luteis. Bracteæ lanceolatæ ſetaceæ, ſingulo pedicello tres. Cal. perianth. monophyllum pubeſcens, ad baſin uſque partitum, laciniis quinque lineari-lanceolatis æqualibus, perſiſtens. Cor. monopetala, ringens labio inferiore lanceolato indiviſo, ſuperiore trifido. Stam. filam. duo ſubulata, longitudine corollæ Anth. oblongæ didymæ. Piſt. germ. conicum, Styl. filiformis, ſtaminibus longior. ſtigma bifidum. Per. capſula. . . . . Pili breviſſimi rariores glanduloſi.

DIANTHERA (*hyſſopifolia*) floribus terminalibus pedunculatis, foliis lanceolatis ſcabris. *Tab.* 5. *f.* 2.
Habitat in Java.

Caul. herbaceus. Fol. petiolata. Pedunc. ex involucro ſuperiorum foliorum pollicares quinque, circa medium ſæpius diviſi erecti, bracteis duabus lanceolatis, calycem obvolventibus. Cal. quinque partitus. Cor. tubus longitudine calycis, limbus ringens, labio ſuperiore obtuſo, inferiori trifido.

GRATIOLA (*virginiana*) foliis lanceolatis obtuſis ſubdentatis. *Linn. ſp.* 25. *Gron. virg.* 6.
Tjieria-maija-nari. *Rheed. mal.* 9. *p.* 165. *t.* 85.
Alſine ſpuria indica chamædryfolia, flore cæruleo tripartito. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 422.
Habitat in Virginia, Malabara & Java, unde miſſa fuit.

Rad. fibroſa. *caul.* palmaris procumbens, ramis oppoſitis. *Fol.* oppoſita ſeſſilia, verſus apicem ſerrata. *Pedunc.* axillares uniflori, *Cal.* quinque partitus tubuloſus perſiſtens, laciniis breviſſimis linearibus, *Stil.* perſiſtens. *Per. capſula* oblonga acuminata, calyce duplo longior, dehiſcens.

UTRICULARIA (*bifida*) ſcapo nudo bifido. *Linn. ſp.* 26. ubi deſcr. *Osbeck. iter.* 243. *t.* 3. *f.* 2.

UTRICULARIA (*cærulea*) ſcapo nudo, ſquamis alternis vagis ſubulatis. *Linn. ſp.* 26. *Fl. zeyl.* 23.
Aphyllos indica aquatica volubilis, flore dipetalo difformi, calcari donato. *Raj. app.* 404.
Rudhumeti flore cæruleo, calcitrapæ facie. *Burm. zeyl.* 208. *Herm. muſ. zeyl.* 18.
Planta aquatica aphyllos repens, flore cæruleo. *Commel. Fl. mal.* 54.
Nelipu. *Rheed. mal.* 9. *p.* 137. *t.* 70.
Habitat in Malabaræ & Zeylonæ locis paludoſis & aquoſis, inprimis ubi Oryza colitur, cui ſe circumvolvit.

UTRICULARIA (*vulgaris*) nectario conico, ſcapo paucifloro. *Linn. ſp.* 26. *Fl. zeyl.* 22. *Roy. lugdb.* 304.
Lentibularia. *Rivin. monop.* 78. zeylanica. *Burm. zeyl.* 140.

 Mil-

Millefolium aquaticum, flore luteo galericulato. *Parkinſ. theatr. botan.* 1258.
Millefolium aquaticum lenticulatum. *Bauh. pin.* 141.
β Millefolium paluſtre galericulatum minus. *Plukn. phyt.* 251. *t.* 99. *f.* 6.
Habitat in Europa & Zeylona, teſte Hermanno.

DIALIUM (*javanicum*).
Coerandje. Javanis.
β Cortex papetarius. *Rumph. amb.* 3. *p.* 212. *t.* 137. quæ differt foliis ſerratis.
Habitat in Java.

Caul. arboreus. Fol. pinnata alterna; foliola ſeptem palmaria ovato-oblonga acuminata integerrima lævia, petiolis breviſſimis. Flores rubentes paniculati. Cal. per. nullum. Cor. petala quinque elliptica obtuſa ſeſſilia æqualia decidua. Stam. filamenta duo conica breviſſima ad latus ſuperius germinis ſita. Antheræ oblongæ obtuſæ quaſi didymæ. Piſt. germ. ovatum: Stylus ſubulatus declinatus, longitudine ſtaminum. Stigma adſcendens ad apices Antherarum ſimplex. Peric.?

VERBENA (*indica*) diandra, ſpicis longiſſimis carnoſis nudis, foliis lanceolato-ovatis oblique dentatis, caule lævi. *Linn. ſp.* 27. ubi deſcr.
Habitat in Zeylona.

Tab. 6. *f.* 1. VERBENA (*nodiflora*) tetrandra, ſpicis capitato-conicis, foliis cuneiformibus apice ſerratis, caule repente. *Linn. ſp.* 28. *Fl. zeyl.* 399. *Roy. lugdb.* 326. *no.* 9. *Gronov. virg.* 7.
Verbena nodiflora, capite oblongo. *Barrl. ic.* 855. *Dn. Pryon*, qui ſub hoc nomine ex India miſit.
Verbena nodiflora. *Bauh. pin.* 269. repens. *prodr.* 125. ubi icon.
Verbena nodiflora major indica, flore niveo Hermanni. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 419.
Sherardia repens, folio ſubrotundo craſſo, nodiflora. *Vaill. ſtr. flor.* 231. *Burm. zeyl.* 214.
Ana-coluppa. *Rheed. mal.* 10. *p.* 93. *t.* 47.
Mallei-cajan-tagare incolis.
Reperitur in locis arenoſis Coromandeli, Malabaræ & Zeylonæ; frequentiſſima in hortis publicis.

Tab. 6. *f.* 2. VERBENA (*javanica*) ſpicis numeroſis oblongo-conicis, foliis ovato-oblongis ſubcrenulatis, caule erecto.
Habitat in Java.

Differt a præcedenti: *caule* tenuiore erectiuſculo, *foliis* oblongis acuminatis, marginibus ſubcrenulatis, *ſpicis* inferioribus oppoſitis, in ſummitate numeroſis oblongo-conicis duplo longioribus.

MONARDA (*zeylanica*) floribus verticillatis, foliis ſubcordatis, calycibus piloſis, involucro longioribus. *Linn. zeyl.* 24. ubi deſcr.
Marrubium odoratiſſimum, Betonicæ folio. *Burm. zeyl.* 153. *t.* 71. *f.* 1.
Mar-

Marrubium zeylanicum odoratum Nepetæ facie, folio Lamii pannonici. *Herm. muſ. zeyl.* 30.
Habitat in Zeylona.

SALVIA (*officinalis*) foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus ſpicatis, calycibus acutis. *Linn. ſp.* 34. *Roy. lugdb.* 307. *n.* 1.
Salvia incana, ſub quo nomine ex Java recepimus.

Licet quoad deſcriptionem cum hac ſpecie quadret, habitu tamen differt, caul. & petioli tomento albo lanuginoſi, folia ferruginea rugoſa, margine crenulata incraſſata. ſpica compacta breviſſima. cal. tomentoſus acutus, corolla albicans; hybrida forte ſpecies ex officinali & cretica.

SALVIA (*indica*) foliis cordatis acute crenatis, ſummis ſeſſilibus, verticillis ſubnudis remotiſſimis. *Linn. ſp.* 37. *Roy. lugdb.* 309. *n.* 15.
Sclarea indica, floribus variegatis. *Tourn. inſt.* 179.
Sclarea pes trigidis vulgo dicta, ſeu Horminum indicum maximum, floribus variegatis. *Hort. reg. par.*
Horminum hirſutum, flore violaceo, punctis aureis notato. *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 11. *t.* 13. *f.* 16.
Habitat in India.

DIGYNIA.

ANTHOXANTHUM (*indicum*) ſpica lineari, floſculis ſeſſilibus, ariſta brevioribus. *Linn. ſp.* 40. *Fl. zeyl.* 25.
Gramen geniculatum brevifolium criſpum, ſpica purpureo-ſericea. *Plukn. alm.* 177. *t.* 119. *f.* 1.
Gramen alopecuroides. *Burm. zeyl.* 105.
Habitat in Zeylona.

TRIGYNIA.

PIPER (*nigrum*) foliis ovatis ſubſeptemnerviis glabris, petiolis ſimpliciſſimis. *Linn. ſp.* 40. *Fl. zeyl.* 26.
Piper rotundum nigrum. *Baub. pin.* 411. *Plukn alm.* 297. *t.* 437. *f.* 1. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 602. *ſ.* 15. *t.* 1. *f.* 1.
Piper rotundum ex Malabara, foliis latis quinque nerviis albicantibus. *Burm. zeyl.* 193. *Herm. zeyl.* 32.
Piper indicum vulgare, ſemine nigro, folio quinque nervio: malaice Lada. *Dn. Pryon* ex Java.
Malago-codi. *Rheed. mal.* 7. *p.* 23. *t.* 12.
Habitat in variis Indiæ locis, potiſſimum in Malabara & Java, ubi colitur.

Piper ſemine nigro & albo tantum pro varietate habendum, dicitque *Rheede*, quod cortice nigro ablato fit Piper album.

PIPER (*Betle*) foliis ovatis oblongiuſculis acuminatis ſeptemnerviis, petiolis bidentatis. *Linn. ſp.* 40. *Fl. zeyl.* 27.
Piper quod ſaururus, foliis ſeptinerviis oblongo-acuminatis. *Burm. zeyl.* 193. *t.* 83. *f.* 2.
Piper longum arboreum altius, folio nervoſo minore, ſpica graciliori & breviori. *Sloan. jam.* 134. *t.* 87. *f.* 1.
Piper indicum ſylvaticum. *Herm. muſ. zeyl.* 20 & 24.
Piper longum, foliorum nervis decurrentibus tenuibus & mollioribus, Betle dictum. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 603.
Betre ſeu Betle. *Cluſ. arom.* 176. *f.* 1.
Beetla-codi. *Rheed. mal.* 7. *p.* 29. *t.* 15.
Creſcit in Zeylonæ ac Malabaræ ſilvis, ibique colitur.

PIPER (*Malamiri*) foliis ovatis acutiuſculis ſubtus ſcabris, nervis quinque ſubtus elevatis. *Linn. ſp.* 41. *Fl. zeyl.* 26.
Sirii folium. *Rumph. amb.* 5. *p.* 336. *t.* 116. *f.* 2.
Amalago. *Rheed. mal.* 7. *p.* 31. *t.* 16.
In utrisque reperitur Indiis.

PIPER (*Amalago*).
Huic nimis affinis pro nova ſpecie.

PIPER (*Siriboa*) foliis cordatis ſubſeptinerviis venoſis. *Linn. ſp.* 41. *Fl. zeyl.* 29.
Siriboa. *Rumph. amb.* 7. *p.* 340. *t.* 117.
Sirifolia malaice Caju-ſiri. *D. Pryon* hoc nomine ex India miſit.
Betela, quam Sirii-boa vocant. *Bont. jav.* 91. *t.* 1.
Beteles ſpecies folio lato, ſiriboa Bontii. *Burm. zeyl.* 46.
Creſcit in variis Indiæ locis.

PIPER (*longum*) foliis cordatis petiolatis ſeſſilibusque. *Linn. ſp.* 41. *Fl. zeyl.* 30.
Piper longum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 333. *t.* 116. *f.* 1.
Piper longum Piſtolochiæ foliis absque pediculis madaraſpatanum. *Plukn. alm.* 297. *t.* 104. *f.* 4.?
Laborandi. *Piſ. hiſt. braſ.* 151. *ſ.* 216. *n.* 3.
Cattu-tripali. *Rheed. mal.* 7. *p.* 27. *t.* 14.
Lada Java, ſub hoc nomine miſſa planta, quæ cum figuris *Rumph.* & *Rheed.* convenit.
Colitur in multis Indiæ locis, ſemel florens tempore pluvioſo.

PIPER (*decumanum*) foliis cordatis novem nerviis reticulatis. *Linn. ſp.* 41.
Saururus fruteſcens, foliis plantaginis, fructu breviore. *Plum. amer.* 59. *t.* 76.
Sirium decumanum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 45. *t.* 27. ubi folia multinervia.
Creſcit in utrisque Indiis. PI-



1. VERBENA *nodiflora*.
2. ——— *javanica*.
3. VALERIANA *chinensis*.

PIPER (*peltatum*) foliis peltatis orbiculato-cordatis obtuſis repandis, ſpicis umbellatis. *Linn. ſp.* 42.
Saururus arboreſcens, foliis amplis rotundis & umbilicatis. *Plum. amer.* 56. *t.* 74.
Lomba. *Rumph. amb.* 6. *p.* 133. *t.* 59. *f.* 1.
Habitat in Indiis.

Hujus ex Java miſit *Dn. Kleinhof* ſpecimen, foliis peltatis, orbiculato-cordatis acutis integerrimis, ſpicis umbellatis, axillaribus.

TRIANDRIA MONOGYNIA.

VALERIANA (*cornucopiæ*) floribus diandris ringentibus, foliis ovatis ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 44. *Roy. lugdb.* 235. *n.* 7.
Valeriana peregrina purpurea albave. *Bauh. pin.* 164. *prodr.* 87. *f.* 2.
Valeriana indica. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 54.
Pſeudo-Valerianella cornucopoides rubra vel indica. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 75.
Pſeudo-Valeriana cornucopoides annua purpurea. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 104. *f.* 7. *t.* 16. *f.* 27.
Valerianella flore rubro, capſula mitrata. *Vaill. act. pariſ. ann.* 1722. *p.* 256. *f.* 13. 14. 15.
In India, variiſque mundi plagis, ubi loca arenoſa, vulgaris, & in hortis colitur.

VALERIANA (*chinenſis*) floribus triandris, foliis omnibus cordatis. *Linn. ſp.* 47. ubi deſcr. *Tab.* 6. *f.* 3.
Habitat in China & Cormandeli, unde miſſa ſub nomine Sattisarnei.

OLAX (*zeylanica*). *Linn. ſp.* 48. *Fl. zeyl.* 34.
Arbor ſtercoraria zeylanica glandifera. *Burm. zeyl. p.* 26.
Habitat in Zeylona.

Folia in acetariis adhibentur, uti apud nos Lactuca. *Herm.*

TAMARINDUS (*indica*). *Linn. ſp.* 48. *Fl. zeyl.* 33. *Roy. lugdb.* 465. *Loefl. it.* 210. *Rumph. amb.* 2. *p.* 90. *t.* 23.
Siliqua arabica, quæ Tamarindus. *Bauh. pin.* 403.
Tamarindus indica orientalis. *Blakw. herb. t.* 221.
Balam-puli. *Rheed. mal.* 1. *p.* 39. *t.* 23.
Habitat in Indiis utriſque & Arabia.

RUM-

RUMPHIA (*amboinenſis*). *Linn. ſp.* 49.
Myxa pyriformis, oſſiculo triſpermo. *Raj. hiſt.* 1556.
Tſiem-tani. *Rheed. mal.* 4. *p.* 25. *t.* 11.
Caniri-utan. Javanis.
Habitat in India.

STILAGO (*Bunius*).
Bunius ſativus. *Rumph. amb.* 3. *p.* 204. *t.* 131.
Habitat in India.

Folia alterna petiolata ſimplicia ovato-oblonga glabra integerrima. *Spicæ* alternæ longiſſimæ nudæ, floribus parvis ſparſis. *Cal.* perianthium hæmiſphæricum integerrimum vix trilobum urceolatum. *Cor.* nulla. *Stam.* filam. tria filiformia, calyce longiora patentia. *Anth.* binæ ſubgloboſæ. *Piſt.* germen ſubrotundum ſuperum, *Styl.* cylindricus perſiſtens, ſtaminibus brevior. *Stigma* verrucoſum.

IXIA (*chinenſis*) foliis enſiformibus, floribus remotis, panicula dichotoma, floribus pedunculatis. *Linn. ſp.* 52.
Bermudiana Iridis folio majore, flore croceo eleganter punctato. *Krauſ. hort.* 25. *t.* 25.
Bermudiana radice carnoſa, floribus maculatis, ſeminibus pulpa obductis. *Amman. act. petropol.* 11. *p.* 308. *t.* 7.
Balam canda-ſchularmani. *Rheed. mal.* 11. *p.* 73. *t.* 37.
Habitat in India, frequens in hortis publicis.

COMMELINA (*benghalenſis*) corollis inæqualibus, foliis ovatis obtuſis, caule repente. *Linn. ſp.* 60.
Commelina repens, folio ſubrotundo obtuſo. *Burm. zeyl.* 70.
Ephemerum benghalenſe ſerpens, folio ſubrotundo brevi phalangoides. *Plukn. alm.* 130. *t.* 27. *f.* 3.
Ephemerum indicum bipetalum procumbens obtuſo folio, pediculo alato. *Herm. par.* 156. *Ray. hiſt.* 3. *p.* 566.
β Arundinella. *Rumph.* 6. *p.* 23. *t.* 9. *f.* 2.
Habitat in variis Indiæ locis uliginoſis.

COMMELINA (*communis*) corollis inæqualibus, foliis ovato-lanceolatis acutis, caule repente glabro. *Linn. ſp.* 60. *Roy. lugdb.* 38. *n.* 1. *Gron. virg.* 130.
Commelina procumbens annua ſaponariæ folio. *Dill. elth.* 93. *t.* 78. *f.* 89.
Koo ſeki, ſive Ephemerum dipetalum japonicum. *Kæmpf. amoen.* 888. *t.* 889.
Inter Indicas plantas quoque affertur.

COMMELINA (*tuberoſa*) corollis æqualibus, foliis ſeſſilibus ovato-lanceolatis ſubciliatis. *Linn. ſp.* 61. *Roy. lugdb.* 38. *n.* 3.
Commelina paludoſa latifolia. *Burm. zeyl.* 69. *t.* 20. *f.* 2.

Com-

Commelina radice anacampſerotidis. *Dill. elth.* 94. *t.* 79. *f.* 90. quæ hirſuta.
Commelina lato & acuto folio, flore cæruleo ſtellato, fructu membranaceo. *D. Pryon*, qui ex Java miſit.
Gramen paludoſum, flore cæruleo. *Herm. muſ. zeyl.* 16.
Creſcit in utraque India.

COMMELINA (*erecta*) corollis inæqualibus, foliis ovato-lanceolatis, caule erecto ſcabro ſimpliciſſimo. *Linn. ſp.* 60. *Gron. virg.* 11. *Roy. lugdb.* 38. *n.* 2.
Commelina erecta, ampliore ſubcæruleo flore. *Dill. elth.* 94. *t.* 77. *f.* 88.
Commelina folio anguſto acuto, flore cæruleo ſtellato, in ſummitate proveniente ex folio concavo. *D. Pryon*; quæ ex Java allata ab illa *Dill.* differt, magnitudine, caule lævi ſimpliciſſimo erecto, foliis ſcabris acuminatis, petiolis vaginantibus lucidis glabris.

COMMELINA (*nudiflora*) corollis æqualibus, pedunculis capillaribus, foliis lineari-lanceolatis, involucro nullo. *Linn. ſp.* 61. *Fl. zeyl.* 31.
Ephemerum phalangoides madaraſpatanum minimum, foliis peranguſtis perfoliatum. *Plukn. alm.* 135. *t.* 27. *f.* 4.
Commelina gramineo acuto folio. *D. Pryon.*
Tali-pulli. *Rheed. mal.* 9. *p.* 123. *t.* 63.
Habitat in India.

COMMELINA (*nudicaulis*) corollis æqualibus ſcapo indiviſo, foliis lanceolatis radicalibus. *Tab.* 8. *f.* 1.
Commelina foliis ad radicem poſitis gramineis, flore cæruleo *D. Pryon*, a quo ex Java miſſa.

Rad. fibroſa repens. Caul. procumbentes. Fol. radicalia ad ortum vaginantia. Scap. erectus filiformis indiviſus, in cujus medio Bractea revoluta. Flor. bini cærulei.

COMMELINA (*axillaris*) corollis æqualibus, floribus ſeſſilibus, foliis linearibus. *Linn. ſp.* 61.
Ephemerum phalangoides madaraſpatanum minimum, ſecundum caulem quaſi ex utriculis floridum. *Plukn. alm.* 135. *t.* 174. *f.* 3. & *amalth.* 73.
Ephemerum malabaricum aquaticum procumbens tricoccum, ad ſingulos foliorum ſinus floridum. *Herm. par. bat.* 144. *Ray. hiſt.* 3. *p.* 565 & 567.
Nir-pulli. *Rheed. mal.* 10. *p.* 28. *t.* 13.
Habitat in locis aquoſis Javæ & Malabaræ.

A *Dno. Kleinhof* ex Java miſſa, cujus *caulis* ſimplex, craſſitie pennæ columbinæ, teres vaginatus, foliis alternis reclinatis ſeſſilibus lanceolatis plicatis. *Flores* axillares.

COMMELINA (*papilionacea*) involucris triphyllis alterum recipientibus, caule repente, foliis lanceolato-linearibus. *Tab.* 7. *f.* 1.
Nay-cattarei, flore cæruleo, folio ſedi. *D. Outgaerden.*
Habitat Cormandeli.

Rad. fibroſa alba. *Caul* bipollicaris repens articulatus ad ſingula genicula radicans e rubro viridis. *Fol.* lineari-lanceolata acuta ſeſſilia ſubciliata, vagina latiuſcula breviſſima ſuccoſa. *Spatba* terminalis cordata ſubciliata complicata, ſub qua foliola duo lanceolata lunata vexillo breviori, intra quæ carinæ loco aliud involucrum nondum prodiens.

Tab. 7. f. 2. COMMELINA (*diffuſa*) corollis æqualibus, pedunculis capillaribus, foliis ovato oblongis, involucro nullo.
Cadtu-cannawarei. *D. Outgaerden.*
Habitat Cormandeli.

Tab. 7. f. 3. COMMELINA (*nervoſa*) corollis æqualibus, foliis ovatis nervoſis.
Moukarattei. *D. Outgaerden.*
Habitat Cormandeli.

Ob emarcida & diuturna aſſervatione pro parte detrita ſpecimina, figuras quoad fructificationem adeo perfectas dare non potui, quod in plantis ſub zona torrida nimis diu exſiccatis ſæpius occurrit.


Tab. 7. f. 4. COMMELINA (*criſtata*) corollis æqualibus, involucris ſpicatim imbricatis. *Linn. ſp.* 62. *Fl. zeyl.* 32.
Ephemerum zeylanicum procumbens criſtatum. *Herm. par. bat.* 148. *Burm. zeyl.* 53. *Ray. hiſt.* 566.
Sincana warei Cormandeli. *D. Outgaerden.*
β Veetla caitu. *Rheed. mal.* 7. *p.* 109. *t.* 58.
Habitat in Zeylonæ & Malabaræ paludoſis.

Planta aquatica repens, e nodis radicans. *Fol.* ſeſſilia ſuccoſa ovata acuta. *Pedunc.* terminales ſimpliciſſimi. *Involucra* latiora ſpicatim imbricata criſtata. *Corolla* æqualis.

XYRIS (*indica*). *Linn. ſp.* 62. foliis gladiatis. *Fl. zeyl.* 35. *Gron. virg.* 11.
Gladiolo lacuſtri accedens malabarica, e capitulo botryoide florifera. *Plukn. alm.* 170. *t.* 416. *f.* 4.
Gramen junceum braſilianum, capite ovali ſquamoſo florido. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 229. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 28.
Jupicai braſilienſium. *Piſ. braſ.* 238.
Gramen indicum, capitulis oblongis, floribus aureis ſquamatis. *Burm. zeyl.* 109.
Kotsjiletti-pulli. *Rheed. mal.* 9. *p.* 13. *t.* 7.
In utrisque creſcit Indiis.

SCHOENUS (*coloratus*) culmo triquetro, capitulo ſubrotundo, involucro longiſſimo plano variegato. *Linn. ſp.* 64. *H. Cliff.* 495.
Gramen cyperoides, ſpica compacta alba, foliis ad ſpicam partim albis, partim viridibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 119. *t.* 78. *f.* 1.

Gra-



1. COMMELINA *papilionacea*.
2. ——— *diffusa*.
3. ——— *nervosa*.
4. ——— *cristata*.



1. COMMELINA *papilionacea*.
2. ——————— *diffusa*.
3. ——————— *nervosa*.
4. ——————— *cristata*.



1. COMMELINA *nudicaulis*.
2. CYPERUS *odoratus*.
3. PANICUM *dimidiatum*.



1. COMMELINA nudicaulis.
2. CYPERUS odoratus.
3. PANICUM dimidiatum.

Gramen capitatum. *Rumph. amb. 6. p. 8. t. 3. f. 2.*
Gramen cruciatum ac capitatum javanicum. *D. Pryon.*
Gramen malabaricum repens aquaticum. *D. Garzin.*
Pee-mottenga. *Rheed. mal. 12. p. 99. t. 53.*
Habitat in utrisque Indiis.

SCHOENUS (*tuberoſus*) culmo triquetro, capitulis ternis ſeſſilibus, involucro longiſſimo viridi, radice tuberoſa.
Gramen cyperoides minus, ſpica compacta ſubrotunda viridi, radice odorata. *Sloan. hiſt. jam. 1. p. 119. t. 78. f. 2.*
Cyperus indicus, radicibus glanduloſis, ſpicis parvis ſeſſilibus, in ſummitate caulis congeſtis. *Raj. hiſt. 3. p. 619.*
Mottenga. *Rheed. mal. 12. p. 97. t. 52.*
Habitat in Java & Malabara.

SCHOENUS (*lithoſpermus*) culmo triquetro folioſo, panicula villoſa, ſeminibus globoſis nitidis, foliis trifariam aculeatis. *Linn. ſp. 65.*
Schœnus ſecans. *Linn. amoen. acad. 5. p. 391. ſyſt. 865.*
Cyperus maximus americanus, lithoſpermi ſemine. *Moris. 3. p. 237. ſ. 8. t. 11. f. 16.*
Gramen cyperoides ſylvaticum maximum geniculatum aſperius, ſemine milii folis. *Sloan. hiſt. jam. 36. p. 118. t. 77. f. 1.*
Gramen cyperoides indicum, paniculis e foliorum ſinubus egreſſis, locuſtis raris compreſſis. *Ray. hiſt. 3. p. 618.*
Gramen cyperoides lithoſpermi ſemine, *Plukn. mant. 98.*
Calamagroſtis. *Rumph. amb. 6. p. 16. t. 6. f. 2.*
Kaden-pullu. *Rheed. mal. 12. p. 89. t. 48.*
Habitat in utraque India.

SCHOENUS (*paniculatus*) culmo triquetro folioſo, panicula alterna colorata, calycibus ariſtatis, ſeminibus globoſis lævibus.
Carex amboinica. *Rumph. amb. 6. p. 22. t. 8. f. 1.*
Tsiolap-pullu. *Rheed. mal. 12. p. 127. t. 67.*
Ilad. Javanis.
Ex India miſſa.

Semina licet cum præcedenti conveniant, habitu tamen maxime differens planta. *Folia* alterna. *Panicula* axillaris. *Setæ* plurimæ pollicares. *Semina* ut in *lithoſpermo* ſplendentia ſæpe nigricantia; cum quo maxime adfinis quoad deſcriptionem.

CYPERUS (*ſquarroſus*) culmo triquetro folioſo, umbella folioſa glomerata, ſpicis ſtriatis ſquarroſis. *Linn. ſp. 66. Amoen. acad. 4. p. 303.*
Gramen cyperoides madaraſpatanum minimum, iſchæmi paniculis cum ariſtis. *Plukn. amalth. 114. t. 397. f. 2.*
Habitat in India.

CYPERUS (*haſpan*) culmo triquetro folioſo, umbella ſupradecompoſita, ſpiculis umbellato-ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 66. *Fl. zeyl.* 37.
Gramen cyperoides madaraſpatanum, panicula magis ſparſa & ſpecioſa. *Plukn. alm.* 179. *t.* 192. *f.* 2.
Gramen cyperoides javanicum pectinatum. *Herb. Garzin.*
Habitat in Java.

CYPERUS (*longus*) culmo triquetro folioſo, umbella folioſa ſupradecompoſita, pedunculis nudis, ſpicis alternis. *Linn. ſp.* 67. *Roy. lugdb.* 50. *n.* 7.
Cyperus odoratus, radice longa, ſ: Cyperus officinarum. *Bauh. pin.* 14. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 237. *ſ.* 8. *t.* 11. *f.* 13. *Scheuz. gram.* 378.
Gramen cyperoides rarius & tenuius ſpicatum e madaraſpatan. *Plukn. phyt.* 179. *t.* 192. *f.* 1. quæ cum Javanica convenit.

CYPERUS (*rotundus*) culmo triquetro ſubnudo, umbella decompoſita, ſpicis alternis linearibus. *Linn. ſp.* 67. *Fl. zeyl.* 36.
Cyperus orientalis, radice olivari, ſpicis longis e ſpadiceo purpuraſcentibus. *Scheuz. gram.* 391.
Gramen cyperinum zeylanicum vulgare minus. *Burm. zeyl.* 107.
Habitat in Zeylona.

CYPERUS (*difformis*) culmo triquetro ſubnudo, umbella diphylla ſimplici trifida, ſpicis cuſpidatis, intermedia ſeſſili. *Linn. ſp.* 67. *Amoen. acad.* 4. *p.* 302.
Gramen cyperoides elegans, Vaſſumbo-curry malabarorum. *Plukn. amalt.* *t.* 417. *f.* 5.
Habitat in Malabara.

CYPERUS (*Iria*) culmo triquetro ſeminudo, umbella folioſa decompoſita, ſpiculis alternis, granis diſtinctis. *Linn. ſp.* 67. ubi deſcr.
Gramen cyperoides Indiæ orientalis elatius, panicula ſparſa palleſcente. *Plukn. alm.* 179. *t.* 191. *f.* 7.
Iria ſ: Balari. *Rheed. mal.* 12. *p.* 105. *t.* 56.
Habitat in India.

CYPERUS (*elatus*) culmo triquetro nudo, umbella folioſa ſupradecompoſita, ſpicis digitalibus imbricatis, ſpiculis ſubulatis. *Linn. ſp.* 67. *Amoen. acad.* 4. *p.* 301.

Tab. 8. *f.* 2. CYPERUS (*odoratus*) culmo triquetro nudo, umbella decompoſita ſimpliciter folioſa, pedicellis diſtiche ſpicatis. *Linn. ſp.* 68. *Roy. lugdb.* 50. *n.* 6. *Gron. virg.* 131.
Cyperus longus odoratus, panicula ſparſa, ſpicis ſtrigoſioribus viridibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 116. *t.* 74. *f.* 1.
Habitat in India utraque.

CY-

CYPERUS (*pumilus*) culmo triquetro nudo, umbella diphylla compoſita, ſpiculis alternis digitatis lanceolatis, glumis mucronatis. *Linn. ſp.* 69. *Amoen. acad.* 4. *p.* 302

Gramen cyperoides pumilum elegans e madaraſpatan. *Plukn. alm.* 179. *t.* 191. *f.* 8.

Habitat in India.

CYPERUS (*compreſſus*) culmo triquetro nudo, umbella univerſali triphylla, glumis mucronatis latere membranaceis. *Linn. ſp.* 68.

Cyperus culmo triquetro nudo, panicula folioſa, pedunculis ſimplicibus, ſpicis alternis ſubulatis diſtichis. *Roy. lugdb.* 51. *n.* 11. *Gron. virg.* 131.

Cyperus rotundus gramineus fere inodorus, panicula ſparſa compreſſa viridi. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 117. *t.* 76. *f.* 1.

? Cyperus longus minor pulcher, panicula lata compreſſa ſubflaveſcente. *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 8. *t.* 11. *f.* 37.

Planta ex Java miſſa convenit cum data in ſpeciebus *Linn.* deſcriptione, *umbella*, ſpicis centralibus ſeſſilibus compreſſis exterioribus pedunculatis, ex quatuor ſpiculis conſtans.

CYPERUS (*umbellatus*) culmo triquetro nudo, umbella diphylla, pedunculis longiſſimis ſpicatis. *Tab.* 9. *f.* 1.

Culmus triqueter, *folia* longitudine culmi, *involucr.* diphyllum, *pedunc.* longiſſimi ad ſeptem uſque inæquales ad medium vaginantes, *ſpicæ* capitatæ oblongæ, involucro ſetaceo, *ſpiculæ* lineares, floſculis alternis.

SCIRPUS (*capitatus*) culmo tereti folioſo, capitulis axillaribus pedunculatis, involucro diphyllo lineari.

Gramen hirſutum indicum, glomeratis capitulis lagopi cæruleis, gluma e ſquamulis plurimis purpuraſcentibus, ariſta unica donatis, compactili. *Plukn. phyt.* 178. *t.* 190. *f.* 7.

Habitat in India.

Culmus dodrantalis teres. *Folia* alterna remotiuſcula. *Pedunc.* axillares ſolitarii. *Involucr.* diphyllum lineare. *Spicæ* capitatæ pedicellatæ, tres compreſſæ.

SCIRPUS (*articulatus*) culmo tereti nudiuſculo, ſemi geniculato, capitulo glomerato laterali. *Linn. ſp.* 70.

Juncus indicus geniculatus, panicula compacta, e ſpicis ſquarroſis compoſita. *Ray. hiſt.* 3. *p* 629.

Juncus conglomeratus madaraspatanus, acumine geniculato. *Plukn. alm.* 200. *t.* 197. *f.* 6.

Tsjeli. *Rheed. mal.* 12. *p.* 135. *t.* 71.

Habitat in locis aquoſis arenoſis Malabaræ.

SCIRPUS (*capillaris*) culmo nudo capillari, ſpicis pedunculatis ſeſſilibusque lateralibus. *Linn. ſp.* 73. *Fl. zeyl.* 39.
Gramen junceum perpuſillum, capillaceis foliis, æthiopicum *Plukn. alm.* 179. *t.* 300. *f.* 5.
Gramen puſillum junci capitulis minimis, ad baſin foliolis binis acutis. *Burm. zeyl.* 108. *t.* 47. *f.* 2.
Gramen glareoſum, Junci capitulis ad baſin folioſis. *Herm. muſ. zeyl.* 45.
Motta-pullu. *Rheed. mal.* 12. *p.* 72. *t.* 38?
Habitat in Zeylona, Malabara & Æthiopia.

SCIRPUS (*dichotomus*) culmo triquetro nudo, umbella decompoſita, ſpicis dichotomis ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 74. *Fl. zeyl.* 40.
Gramen cyperoides madaraspatanum, juncelli geſneri capitulis ſparſis. *Plukn. alm.* 179. *t.* 119. *f.* 3.
Gramen parvum, ſpica triunciali ramoſa inſtar cyperi miliacei. *Burm. zeyl.* 101.
Habitat in Indiæ variis locis.

SCIRPUS (*echinatus*) culmo triquetro nudo, umbella ſimplici, ſpicis ovatis. *Linn. ſp.* 74. *Fl. zeyl.* 38.
Gramen cyperoides americanum, ſpicis grandioribus oblongo-rotundis ſparganii in modum echinatis, ad ſummum caulem pediculis longis innitentibus. *Plukn. alm.* 179. *t.* 91. *f.* 4.
Gramen cyperinum zeylanicum porcinum, capitulis conglobatis rotundis. *Burm. zeyl.* 107.
Creſcit in India utraque.

Tab. 9. *f.* 2. SCIRPUS (*miliaceus*) culmo triquetro nudo, umbella ſupradecompoſita, ſpicis intermediis ſeſſilibus, involucro ſetaceo. *Linn. ſp.* 75. ubi deſcr.
Juncus miliaceus umbellatus, Rompot utan Javanis dictus. D. *Kleinhof*, quo nomine 1757. ex Java miſſus.
Habitat in India.

SCIRPUS (*luzulæ*) culmo triquetro nudo, umbella folioſa prolifera, ſpiculis ſubrotundis. *Linn. ſp.* 75. ubi deſcr.
Cyperus paniculis longis cruciatis. D. *Kleinhof.*
Gramen cyperoides orientale, panicula elegantiſſima in glomerulos conflata. *Plukn. mant.* 97. *t.* 417. *f.* 3.
Gramen cyperoides minus, ſpicis compactis ſubrotundis flavicantibus. *Sloan. jam. t.* 79. *f.* 1.
Cyperus virginianus, capitulis globoſis. *Petiv.* e cujus herbario hanc plantam quoque poſſidemus magnitudine duplo minori tantum differentem a javanica; umbellæ rariores, rotundiores.
Creſcit in utraque India.

SCIR-

9



1. CYPERUS *umbellatus*.
2. SCIRPUS *miliaceus*.
3. SACCHARUM *spicatum*.
4. ERIOCAULON *sexangulare*.

SCIRPUS (*corymboſus*) culmo triquetro folioſo, corymbis lateralibus ſimplicibus, terminali prolifero, ſpicis ſubulatis. *Linn. ſp.* 76. *Amoen. acad.* 4. *p.* 303.
Kudira-pullu. *Rheed. mal.* 12. *p.* 97. *t.* 43.
Malabar foliis ſtellatim dentatis. *Petiv. gazoph.* 361. *t.* 54. *f.* 11.?
Habitat in Malabara.

SCIRPUS (*cephalotes*) culmo triquetro nudo, capitulo ovato, involucro triphyllo longo. *Linn. ſp.* 76.
Bobartia ſpicis capitatis, involucro majore folioſo tectis. *Brown. jam.* 129?
Habitat in India utraque.

NARDUS (*ciliaris*) ſpica incurva ciliata. *Linn. ſp.* 78.
Habitat in India.

DIGYNIA.

BOBARTIA (*indica*). *Linn. ſp.* 78.
Bobartia ſpicis capitatis, involucro folioſo. *Linn. fl. zeyl.* 41. *Amoen. acad.* 1. *p.* 388.
Scirpus madaraſpatanus, capitulo ſquamoſo ſubrotundo. *Scheuch. gram.* 369.
Habitat in India.

SACCHARUM (*officinarum*) floribus paniculatis. *Linn. ſp.* 79. *Roy. lugdb.* 52.
Arundo ſacchariſera. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 108. *t.* 66. *Rumph. amb.* 5. *p.* 186 *t.* 74. *f.* 1. *Bauh. pin.* 18 *theatr.* 293.
In aquoſis utriusque Indiæ locis habitat.

SACCHARUM (*ſpicatum*) floribus ſpicatis, foliis undatis. *Linn. ſp.* 79. *Tab.* 9. *f.* 2.
Gramen paniculatum breviſolium criſpum, ſpica purpurea-ſericea, madaraspatanum. *Plukn. alm.* 177. *t.* 119. *f.* 1.
Alopecurus malabarica, foliis undulatis, ſpica prætenui. *Scheuz. gram.* 91.
Tjeria kuren-pulla. *Rheed. mal.* 12. *p.* 117. *t.* 62.
α Saccharum floribus ſpicatis, foliis lanceolatis ſtrigoſis.
β Saccharum floribus ſpicatis, foliis linearibus gramineis.
Habitat in petroſis Indiæ locis.

α & β Specimina ex Java miſſa differunt foliis gramineis linearibus lanceolatis ſtrigoſis, non undulatis ut in *Rheede*, & *Plukn.* figuris, adeo ut ſpeciem alteram conſtituere videantur, niſi floreſcentia cum ſpicato plane conveniret.

PASPALUM (*diſtichum*) ſpicis duabus, altera ſubſeſſili, floribus acuminatis. *Linn. ſp.* 82.
Habitat in Indiis.

PA-

PANICUM (*alopecuroideum*) ſpica tereti, involucris ſetaceis, baſi ciliatis fasciculatis unifloris, floſculo quadruplo longioribus. *Linn ſp.* 82.
Gramen indicum alopecuroides holoſericeum majus, ſpica longa pappeſcente. *Plukn. alm.* 177. *t.* 92. *f.* 5.
Kerpa. *Rheed. mal.* 12. *p.* 85. *t.* 46.
Habitat in Indiis.

Javanica cum figura *H. Malab.* convenit nec niſi magnitudine, quæ duplo minor, ut ſæpius in *H. Malab.* figuris obtinet, differt. *culmus* villoſus, *ſpica* compreſſa *ſetis* ſericeis, *ſeminibus* ex nigro ſplendentibus.

PANICUM (*polyſtachion*) ſpicis teretibus, involucellis unifloris faſciculato-ſetoſis, culmis erectis ſuperne ramoſis. *Linn. ſp.* 82. ubi deſcr.
Schoenanthus amboinenſis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 181. *t.* 72. *f.* 2.
Gramen dactylon, multiplici panicula, ſpicis ab eodem exortu geminis. *Plukn. phyt.* 175. *t.* 92. *f.* 2.
β Gramen avenaceum madaraſpatanum panicula ſparſa, ariſtis longioribus donata. *Plukn. phyt.* 174. *t.* 191. *f.* 3.
Gramen caricoſum alterum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 17. *t.* 7. *f.* 2. ß.
Rompot pallias javanis.
Habitat in Amboina.

PANICUM (*glaucum*) ſpica tereti, involucellis bifloris faſciculato-ſetoſis, ſeminibus undulato-rugoſis. *Linn. ſp.* 83. *Fl. zeyl.* 44.
Gramen typhoides album. *Burm. zeyl.* 111.
Panicum ſpica ſimplici, ariſtis aggregatis floſculo ſubjectis. *Gron. virg.* 134.
Habitat in Indiis.

PANICUM (*italicum*) ſpica compoſita, ſpiculis glomeratis, ſetis mixtis, pedunculis hirſutis. *Linn. ſp.* 83. *Roy. lugdb.* 54. *n.* 2. *Gron. virg.* 134.
Panicum indicum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 202. *t.* 75. *f.* 2.
Panicum italicum. ſ: panicula majore. *Bauh. pin.* 27. *theatr.* 519.
Habitat in Indiis.

Tab. 12. *f.* 1. PANICUM (*hirtellum*) ſpica compoſita, ſpiculis appreſſis alternis, calycibus geminis, valvulis omnibus ariſtatis, ariſta extima longiſſima. *Linn. ſp.* 83. *Amoen. acad.* 5. *p.* 391. ubi deſcr.
Panicum ſylveſtre, panicula rariori, ſpecillis longioribus uno verſu floridis. *Brown. jam.* 133.
Habitat in Indiis utrisque.

In Javanica *caudes* procumbentes glaberrimi. *folia* brevia ovato-lanceolata plana; *vaginis* foliis longioribus, *ſcapus* erectiuſculus, *ſpicæ* ſecundæ ſubſeſſiles ariſtatæ.

PA-

PANICUM (*crus corvi*) ſpicis alternis ſecundis, ſpiculis ſubdiviſis, glumis ſubariſtatis hiſpidis, rachi trigona. *Linn. ſp.* 84.
Habitat in Indiis.

PANICUM (*colonum*) ſpicis alternis ſecundis muticis ovatis ſcabris, rachi teretiuſcula. *Linn. ſp* 84. ubi deſcr.
Gramen paniceum minus, ſpica divulſa inſulæ barbadenſis. *Plukn. alm.* 174. *t.* 189. *f.* 5.
Gramen paniceum minimum humiſtratum, ſpica diviſa mutica, foliis variegatis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 64. *f.* 3. *Ehret. pict. t.* 3. *f.* 3.
Hippogroſtis amboinica. *Rumph. amb.* 6. *p.* 14. *t.* 5. *f.* 2.
Creſcit in utriſque Indiis.

Caul erectus. *Fol.* ſpithamea, *Scapus* erectus ſimplex, *Spicis* alternis erectis ſeſſilibus glaberrimis, numero ſex.

PANICUM (*compoſitum*) ſpica compoſita, ſpiculis linearibus ſecundis, floſculis geminis remotis, calycibus ariſtatis. *Linn. ſp.* 84. *Fl. zeyl.* 42.
Gramen zeylanicum, ex una parte ariſtis donatum, ſpica diviſa. *Herm. muſ. zeyl.* 36.
Habitat in Zeylona.

PANICUM (*dimidiatum*) ſpica dimidiata ſecunda, rachi lineari membranacea, extrorſum floſculis aggregatis. *Linn. ſp* 84. *Tab.* 8. *f.* 3.
Gramen bermudienſe frumentaceum, foliis brevibus obtuſis, ſpica craſſiuſcula compreſſa antrorſum gemino verſu granifera. *Plukn. phyt.* 174. *t.* 244. *f.* 6.
Gramen floridum luteum, capitulis ſquamatis majus. *Burm. zeyl.* 109.
Mothutu. *Herm. zeyl.* 50. *Linn. zeyl.* 207.
Habitat in India.

PANICUM (*ſanguinale*) ſpicis digitatis, baſi interiore nodoſis, floſculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis. *Linn. ſp.* 84. *Roy. lugdb.* 55. *no.* 6. *Tab.* 10. *f.* 1.
Gramen dactylon majus repens, foliis hirſutiſſimis. *Buxb. cent.* 5. *p.* 34. *t.* 65.
Gramen dactylon majus, panicula longa, e ſpicis plurimis gracilibus longis conſtante. *Sloan. hiſt. jam.* 113. *t.* 70. *f.* 3. cum qua Javanica penitus convenit.
Habitat in India utraque.

PANICUM (*lineare*) ſpicis digitatis ſubquaternis linearibus, floſculis ſolitariis ſecundis muticis. *Linn. ſp.* 85. *Tab.* 10. *f.* 2.

Gramen dactylon, panicula longa, ſpicis plurimis gracilioribus & longis. *Sloan. hiſt. jam. t. 70. f. 3.*

Specimina ex India miſſa variant ſpicis ſæpe binis linearibus & floſculis alternis.

Tab. 10. f. 2. PANICUM (*patens*) panicula oblonga patente, calycibus bifloris, foliis lineari-lanceolatis. *Linn. ſp. 86.*
Gramen pratenſe Indiæ orientalis noſtrati ſimile, panicula elegantiore. *Plukn. mant. 96. Ray. hiſt. 3. p. 616.*
Hippogroſtis amboinenſis. *Rumph. amb. 6. t. 5. f. 3.*
Tſiama-pullu. *Rheed. mal. 12. p. 75. t. 41.*

Specimina javanica melius conveniunt cum *Rumph.* quam cum *Rheed.* figura, cujus folia longiora.

PANICUM (*miliaceum*) panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubeſcentibus. *Linn. ſp. 86.*
Milium ſemine luteo & albo. *Bauh. pin. 26. theatr. 502.*
Milium indicum, arundinaceo folio, granis flaveſcentibus. *Raj. hiſt. 3. p. 598.*
Habitat in India.

PANICUM (*punctatum*) panicula laxa patente, floſculis muticis alternis, foliis linearibus.
Gramen paniceum, multiplici ſpica, madaraſpatanum. *Plukn. phyt. 174. t. 191. f. 1.*
Habitat in India.

PANICUM (*brevifolium*) paniculatum, foliorum vaginis longitudinaliter ciliatis. *Linn. ſp. 87.*
Panicum miliaceum, latiore folio, maderaſpatanum. *Plukn. alm. 176. t. 189. f. 4.*
Gramen miliaceum viride, foliis latis brevibus, panicula capillacea, ſemine albo. *Sloan. hiſt. jam. 1. p. 115. t. 72. f. 3.*
Gramen tremulum minus, Itana zeylonenſibus. *Burm. zeyl. 111.*

Tab. 11. f. 1. PANICUM (*repens*) panicula virgata, foliis divaricatis. *Linn. ſp. 87.* ubi deſcr.
Habitant in Java.

Paniculæ racemi alterni in nullo ſpecimine ramoſi occurrunt, qui in noſtris ſex vel octo numero obſervantur.

ALOPECURUS (*hordeiformis*) racemo ſimplici, floſculis ariſtis circumvallatis. *Linn. ſp. 90.* ubi deſcr.
Habitat in Indiis.

ALO-



1. PANICUM *sanguinale*.
3. ——— *lineare*.
2. ——— *patens*.



1. PANICUM *sanguinale*.
3. ——— *lineare*.
2. ——— *patens*.



1. *PANICUM* repens.
2. *POA* malabarica.
3. —— chinensis.



1. PANICUM repens.
2. POA malabarica.
3. —— chinensis.

ALOPECURUS (*typhoides*) racemo ſimplici, floſculis muticis.
Gramen alopecuroides, ſpica maxima Indiæ orientalis. *Plukn. almag.* 174. *t.* 32. *f.* 4.
Gramen alopecuroides indicum maximum. *Raj. hiſt.* 600.

AGROSTIS (*indica*) panicula contracta mutica, racemis lateralibus erectis alternis. *Linn. ſp.* 94. ubi deſcr.
Gramen pratenſe, panicula & foliis anguſtiſſimis, ſpicis brevibus muticis, locuſtis minimis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 115. *t.* 73. *f.* 1.
Gramen ſecalinum indicum, ſpica gracili tomentoſa, ariſtis longioribus ad ſe invicem intortis. *Plukn. phyt.* 175. *t.* 191. *f.* 5.
Creſcit in Indiis utriſque.

AGROSTIS (*radiata*) ſpicis ſubquinis cruciatis, baſi villoſis, valvulis petaloideis ariſtatis. *Linn. ſp.* 94. *Amoen. acad.* 5. *p.* 392.
Gramen cruciatim aſſurgens, ſpicis ſubhirſutis tenuioribus & longioribus deorſum frugiferis. *Brown. jam.* 137.
Gramen dactylon, ſpicis gracilioribus plerumque quatuor cruciformiter diſpoſitis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 111. *t.* 68. *f.* 3.
Gramen dactylon americanum cruciatum. *Plukn. phyt.* 175. *t.* 189. *f.* 7.?
Habitat in Indiis.

AIRA (*indica*) ſpica ſubovata ſecunda, floſculis obtuſis muticis, foliis planis. *Linn. ſp.* 94. ubi deſcr.

POA (*amabilis*) panicula patente, ſpiculis octifloris linearibus. *Linn. ſp.* 100. *Fl. zeyl.* 46.
Gramen amoris alterum, paniculis ſtrigoſioribus magisque ſparſis. *Plukn. alm.* 176. *t.* 92. *f.* 2.
Gramen amoris minus. *Burm. zeyl.* 105.
Habitat in India.

POA (*malabarica*) paniculæ ramis ſimpliciſſimis, floribus ſeſſilibus, ſeminibus diſtantibus, culmo repente. *Linn. ſp.* 100. *Tab.* 11. *f.* 2.
Gramen miliaceum ſylvaticum maximum, ſemine albo. *Sloan. hiſt. jam.* 114. *t.* 7. *f.* 3.
Habitat in Malabara & Java.

Folia lanceolato-ovata. *Panicula* laxa. *Flores* alterni ſeſſiles.

POA (*chinenſis*) paniculæ ramis ſimpliciſſimis, floribus ſeſſilibus, ſeminibus imbricatis, culmo erecto. *Linn. ſp.* 100. ubi deſcr. *Tab.* 11. *f.* 3.
Habitat in India.

Scapus pedalis. *Racemi* per intervalla diſtantes ſæpius ſex lineares ſtricti, *floſculis* alternis.

POA (*tenella*) panicula oblonga capillari ſubverticillata, floſculis ſexfloris minutiſſimis. *Linn. ſp.* 101.
Gramen paniculatum, locuſtis tenuiſſimis ſubrotundis. *Burm. zeyl.* 110. *t.* 47. *f.* 3.
Gramen paniculatum ex oris malabaricis, panicula delicatiore. *Plukn. alm.* 176. *t.* 300. *f.* 2.
Gramen fumi. *Rumph. amb.* 6. *t.* 4. *f.* 3.
Gramen amoris, paniculis rotundis tenuiſſimis. Rompot Javan dictum D. *Kleinhof.*
Habitat in India.

UNIOLA (*mucronata*) ſpica diſticha, ſpiculis ovatis, calycibus ſubariſtatis. *Linn. ſp.* 104. ubi deſcr.
Habitat in India.

Tab. 12. *f.* 2. DACTYLUS (*lagopoides*) ſpica compreſſa ſimplici, foliis divaricatis pungentibus.
Gramen geniculatum, foliis brevibus, aculeos mentientibus. *Plukn. phyt.* 177. *t.* 189. *f.* 3.
Gramen dactyloides javanicum. *Garzin. herb.*
Gramen typhoides album. *Burm. zeyl.* 111.

Culmi palmares procumbentes teretes læves, *ſpicis* magnitudine unguis, ſolitariis compreſſis. *Folia* vaginantia divaricata pungentia.

Tab. 12. *f.* 3. DACTYLUS (*geniculatus*) culmo geniculato, ſpicis diſtichis ternis, foliis linearibus plicatis mucronatis.
Gramen geniculatum junceum minus. *D. Pryon.*
Habitant in Java.

Culmi geniculati ramoſi vaginati. *Folia* alterna linearia, *vaginis* caules inveſtientia. *Spicæ* terminales tres diſtichæ erectæ, *floſculis* alternis.

CYNOSURUS (*ægyptius*) ſpicis quaternis obtuſis patentibus dimidiatis, calycibus mucronatis, caule repente. *Linn. ſp.* 106. *Roy. lugdb.* 64. *n.* 4.
Gramen iſchæmum malabaricum ſpecioſius, longioribus mucronatis foliis. *Plukn. alm.* 175. *t.* 300 *f.* 8.
Gramen dactylon ægyptiacum. *Bauh. pin.* 7. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 184. *f.* 8. *t.* 3. *f.* 7. *Scheuz. gram.* 109.

Planta Javanica vix pedalis.

CYNOSURUS (*indicus*) ſpicis digitatis linearibus, culmis compreſſis declinatis, baſi nodoſis, foliis alternis. *Linn. ſp.* 106. *Roy. lugdb.* 65. *n.* 5.
Gra-



1. PANICUM hirtellum.
2. DACTYLUS lagopoides.
3. ——— geniculatus.

Gramen dactyloides, ſpicis deorſum ariſtatis. *Burm. zeyl.* 106. *t.* 47. *f.* 1.
Gramen vaccinum fæmina. *Rumph. amb.* 6. *p.* 10. *t.* 4. *f.* 2.
Kavata-pullu. *Rheed. mal.* 12. *p.* 131. *t.* 69.
Habitat in Indiis.

CYNOSURUS (*coracanus*) ſpicis digitatis incurvatis, culmo erecto compreſſo; foliis ſuboppoſitis. *Linn. ſp.* 106. ubi deſcr.
Gramen dactylon orientale majus frumentaceum, ſemine napi, coracan cingalenſibus. *Plukn. alm.* 174. *t.* 91. *f.* 5.
Gramen dactylon ægyptiacum. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 110.
Gramen dactylon americanum minus. *Scheuz. gram.* 107.
Gramen dactyloides, fructu eſculento. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 606.
Panicum gramineum, ſ. Naatsjoni. *Rumph. amb.* 5. *p.* 203. *t.* 76. *f.* 2.
Noem & ſabil. *Veſling. ægypt.* 52. *t.* 53.
Tſitti-pullu. *Rheed. mal.* 12. *p.* 149. *t.* 78.
Coracan cinghalenſibus. *D. Knox. itin. p.* 11.
Habitat in Indiis.

CYNOSURUS (*lagopoides*) culmo folioſo, ſpicis conicis pedunculatis ſolitariis villoſis.
Amaranthoides ſpicatum indicum ramoſiſſimum, ſpergulæ foliis, ſpica alopecuroide incarnata. *Plukn. amalth.* 13. t. 357. *f.* 4.
Graminis ſpecies, Canna Pouloe incolis dicta. *D. Outgaerden.*
Habitat Coromandeli.

Rad. alba. *Caul.* erectiuſculus teres folioſus, *ramis* ſparſis ſæpe ſolitariis. *Fol.* lanceolata magnitudine unguis. *Pedunc.* terminales. *Spica* conica compreſſa. *Color* totius plantæ cinereus.

STIPA (*arguens*) ariſtis nudis, bracteis baſi barbatis, floſculis ſeſſili-faſciculatis. *Linn. ſp.* 117. ubi deſcr.
Gramen arguens. *Rumph amb.* 6. *p.* 15. *t.* 6. *f.* 1.
β Gramen æthiopicum, panicula molli virente, ariſtis criſpatis longioribus fuſcis. *Plukn. phyt.* 176. *t.* 300. *f.* 1.
Janjan marap. javanis.
Habitat in Indiis.

STIPA (*littorea*) bracteis lanceolatis, floribus umbellato faſciculatis, foliis vaginantibus recurvatis canaliculatis cuſpidatis.
Cyperus littoreus echinato capite. *Rumph. amb.* 6. *p* 6. *t.* 2. *f.* 2.
Gramen diſtacophoron, ſpica turgida criſtata. *Burm. zeyl.* 107.
Ily-mallu. *Rheed. mal.* 12. *p.* 143. *t.* 75.
Rompot laut javanis.

Rad. repens. *Culmus* bipedalis erectus teres foliatus geniculatus, *ramis* deflexis ſulcatis rigidis. *Fol.* vaginantia recurvata ſpithamea canaliculata rigida cuſpidata nitida. *Floreſcentia* capitulum. *Bracteæ* lanceolatæ. *Flores* umbellato-faſciculati. *Glumæ* bivalves, *ſetis* palmaribus hiſpidis.

LAGURUS (*paniculatus*) paniculæ ramis ſupradecompoſitis proliferis. *Linn. Fl. zeyl. n.* 45.
Arundo zeylanica farcta, odore & ſapore Calami aromatici. *Burm. zeyl. p.* 35.
Arundo indica odorata. *Grimm. labor. zeyl. p.* 120.
Calamus odoratus Matthioli. *Bauh. pin.* 17.
β Arundo farcta. *Rumph. amb.* 4. *p.* 22. *t.* 6.
Habitat in Zeylona.

ARUNDO (*Bambos*) calycibus multifloris, ſpicis ternis ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 120. *Fl. zeyl.* 47.
Arundo arbor. *Bauh. pin.* 18. *Roy. lugdb.* 67. *n.* 6.
Arundo indica arborea maxima, cortice ſpinoſo, Tabaxir fundens. *Burm. zeyl.* 35.
Arundo tabaxifera. *Dale pharm. ſuppl.* 251.
Tabaxir & Mombu arbor. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 222.
Ily. *Rheed. mal.* 1. *p.* 25. *t.* 16.
Habitat in India utraque.

Plures *Arundinis* ſpecies in herbario occurrunt, quæ foliatura inprimis differunt, & a Javanis diſtinguuntur ſub nominibus *Bamboeſe*, quæ *Bambos. Bamboe Tamble*, quæ genubus longioribus, foliatura latiore. *Bamboe Apoes Gittik*, quæ genubus admodum brevibus, foliis longis lineari lanceolaris. *Bamboe Ampal*, quæ parum ab europæa differt. *Bamboe china*, quæ *Beesba. Rheed. mal.* 5. *p.* 119. *t.* 60. Pluresque aliæ, absque nominibus tranſmiſſæ, quæ absque dubio pro diſtinctis ſpeciebus habendæ forent; cum vero omnes absque fructificatione occurrant, nil certi de illis determinare audeo, iisque relinquo, quibus viventes examinare licebit.

TRIGYNIA.

ERIOCAULON (*triangulare*) culmo triangulari, foliis enſiformibus, capitulo ovato. *Linn. ſp.* 128.
Plantaginella aurea alopecuroides braſiliana, foliis gramineis. *Breyn. cent. t.* 50. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 259. *ſ.* 8. *t.* 16. *f.* 17.
Habitat in Braſilia.

ERIOCAULON (*quinquangulare*) culmo quinquangulari, foliis enſiformibus, calyce univerſali pentaphyllo. *Linn. ſp.* 129. *Fl. zeyl.* 48.
Scabioſa graminea nudicaulis, capitulis argenteis: ſeu ſtatice minima madaraſpatana. *Plukn. alm.* 366. *t.* 221. *f.* 7.
Rhandalia madaraſpatana, graminis folio, globulifera. *Petiv. muſ. no.* 796.
Habitat in India.

ERIO-

ERIOCAULON (*ſexangulare*) culmo ſexangulari, foliis enſiformibus. *Linn. ſp.* 129. *Fl. zeyl.* 49. *Tab.* 9. *f.* 4.
Gramen junceum Indiæ orientalis minus, capitulo rotundo ex paleaceis ſpiculis in cacumine caulis glomerato. *Plukn. mant.* 98.
Gramen junceum, chamemæli capitulis albis aphyllis. *Burm. zeyl.* 108.
Gramen indicum, capitulis tomentoſis. *Herm. muſ. zeyl.* 17.
Habitat in Zeylona.

ERIOCAULON (*ſetaceum*) culmo ſexangulari, foliis ſetaceis. *Linn. ſp.* 129.
Rhandalia malabarica, capillaceo folio. *Petiv. gazoph.* 344. *t.* 53. *f.* 10.
Gramen junceum, foliis capillaceis ſericeis, capitulis minimis rotundis. *Burm. zeyl.* 109.
Graminifolia aquatica indica, cauliculis nudis, capitula rotunda geſtantibus. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 604.
Tſieru kotſijelleti pullu. *Rheed. mal.* 12. *p.* 129. *t.* 68.
Habitat in aquoſis Indiæ locis.

HOLOSTEUM (*hirſutum*) foliis orbiculatis hirſutis. *Linn. ſp.* 130.
Habitat in Malabara.

MOLLUGO (*oppoſitifolia*) foliis oppoſitis lanceolatis, ramis alternis, pedunculis lateralibus confertis unifloris. *Linn. ſp.* 131.
Alſine ſpergulæ facie bengalenſis, foliis anguſtis ad genicula binis, floſculis plurimis ad caulem radiatis, ſemine minutiſſimo fulvo. *Plukn. phyt.* 21. *t.* 75. *f.* 6.
Alſine madurenſis, ſpergulæ facie. *Herb. Garzin.*
Creſcit in Zeylona.

Adhibetur in acetariis loco lactucæ. *Herm. muſ.* 4.

MOLLUGO (*ſtricta*) foliis ſubquaternis lanceolatis, racemis paniculatis. *Linn. ſp.* 131. ubi deſcr.

MOLLUGO (*pentaphylla*) foliis quinis obovatis æqualibus, floribus paniculatis. *Linn. ſp.* 131. *Fl. zeyl.* 51.
Alſine ramoſa procumbens quadrifolia, ad radicem polyphylla. *Burm. zeyl.* 13. *t.* 8. *f.* 1.
Alſine zeylanica ſylveſtris repens, floribus albis. *Hartog. herb.*
Alſine ramoſa procumbens quadrifolia, floribus albis. *D. Pryon.*
Habitat in Zeylona & Java, unde miſſa foliis quaternis lanceolatis.

MOLLUGO (*ſpergula*) foliis quinis obovatis, ramis alternis, pedunculis unifloris. *Linn. ſp.* 131. ubi deſcr.
Habitat in India.

MOL-

MOLLUGO (*erecta*) foliis quinis lanceolatis inæqualibus. *Roy. lugdb.* 215. pedunculis ſubbifloris.
Alſine erecta pentaphylla, flore albo. *Burm. zeyl.* 13. *t.* 7.
Alſine zeylanica erecta ſylveſtris, flore albo. *Hartog. herb.*
Habitat in Zeylona.

Caules ramis dichotomis *Folia* verticillata quina vel ſex lanceolata. *Pedunc.* axillares dichotomi.

MOLLUGO (*triphylla*) foliis ternis obovatis inæqualibus, intermedio maximo, pedunculis unifloris verticillatis.
Anthyllis indica, Tithymali fructu botryoide, tricarpos, ad caulem in verticillis poſito, ternis inæqualibus foliis. *Plukn. amalth.* 17. *t.* 357. *f.* 1.
Manſjel calinier ab incolis dictum. *D. Outgaerden.*
Habitat in India.

Caul. ſpithameus ſcaber. *Fol.* terna ſubpetiolata obovata. *Flores* verticillati pednnculati ſæpe numero viginti, ad diviſuram caulis, ubi Folia erumpunt.

MOLLUGO (*paniculata*) foliis quinis obovatis, pedunculis terminalibus.
Alſine lutea ramoſiſſima pentaphylla polyanthos. *Burm. zeyl.* 12. *t.* 6. *f.* 2.
Habitat in Zeylona.

TETRANDRIA MONOGYNIA.

SCABIOSA (*prolifera*) corollulis quinquefidis radiantibus, floribus ſeſſilibus, caule prolifero, foliis indiviſis ſubſerratis. *Linn. ſp.* 144.
Scabioſa ſtellata humilis integrifolia prolifera. *Herm. par.* 223. *t.* 223.
Habitat in India.

SCABIOSA (*atropurpurea*) corollulis quinquefidis, foliis diſſectis, receptaculis florum ſubulatis. *Linn. ſp.* 145.
Scabioſa peregrina rubra, capite oblongo. *Bauh. pin.* 270.
Scabioſa VI Indica. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 3.
Habitat in India, in hortis frequens.

HEDYOTIS (*fruticoſa*) foliis lanceolatis petiolatis, corymbis terminalibus involucratis. *Linn. ſp.* 147.
Valerianella foliis nervoſis acutis, floſculis in caulium ſummo quaſi involucratis. *Burm. zeyl.* 227. *t.* 107.
Tjotjor-bebeck Javanis.
Habitat in Zeylona & Java.

HE-

HEDYOTIS (*auricularia*) foliis lanceolato-ovatis, floribus verticillatis. *Linn. ſp.* 147. *Fl zeyl.* 64.
Valerianella paluſtris, foliis nervoſis oblongis, floſculis ad caulium nodos inter foliorum ſinus collectis. *Burm. zeyl.* 227. *t.* 108. *f.* 1.
Pulegium latifolium zeylanicum aquaticum inodorum, cauliculis atropurpureis. *Herm. herb.*
Alſinefolia indica, foliis ex adverſo binis, floſculis tetrapetalis in foliorum alis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 424.
Muriguti. *Rheed. mal.* 10. *p.* 63. *t.* 32.
Creſcit in variis Indiæ locis.

HEDYOTIS (*herbacea*) foliis lineari-lanceolatis, caule herbaceo dichotomo, pedunculis geminis. *Linn. ſp.* 147. *Fl. zeyl.* 65. ubi deſcr.
Habitat in Zeylona.

SPERMACOCE (*tenuior*) glabra, foliis lineatis, ſtaminibus incluſis. *Linn. ſp.* 147. *Roy. lugdb.* 258.
Spermacoce annuum, foliis lanceolatis glabris, floribus verticillatis. *Loefl. it.* 202.
Anonymos americana, foliis parietariæ ſcabris, floribus albis ad foliorum ortum vix conſpicuis. *Plukn. alm.* 33. *t.* 136. *f.* 4.
Crateogonium amboinicum majus. *Rumph. amb.* 6. *p.* 25. *t.* 10. quæ convenit cum planta a *D. Kleinhof* ex Java tranſmiſſa.

SPERMACOCE (*verticillata*) glabra, foliis lanceolatis, verticillis globoſis. *Linn. ſp.* 148.
Spermacoce verticillis globoſis. *Dill. elth.* 369. *t.* 277. *f.* 358.
Habitat in utraque India.

SPERMACOCE (*hiſpida*) hiſpida, foliis obovatis. *Linn. ſp.* 148.
Galeopſis zeylanica, folio oblongo, flore albo. *Burm. zeyl.* 163. *t.* 20. *f.* 3.
Digitalis forte aſpera repens rotundifolia. *Burm. zeyl.* 88.
Sideritis aſpera rotundifolia indica repens minor, floſculis minimis pallide cæruleis. *Herm. zeyl.* 3.
Tardavel? *Rheed. mal.* 9. *p.* 149. *t.* 76.
Nattei tjourie incolis.
Creſcit in Zeylona & Java.

Folia in omnibus ſpeciminibus obovata undulata, apice obtuſa.

SPERMACOCE (*corymboſa*) procumbens, foliis linearibus, corymbis lateralibus pedunculatis. *Linn. ſp.* 149. ubi deſcr.
Habitat in India.

Tab. 13. f. 1. SPERMACOCE (*ocymoides*) glabra, foliis ovatis acuminatis.
Sajor Babi Javanis. *D. Kleinhof.*

Medium inter tenuiorem & hiſpidum tenet locum, differtque inprimis, *caule* glabro quadrangulari, *foliis* ovatis acuminatis tomentoſis, *verticillis* ſeſſilibus confertis.

Tab. 13. f. 2. KNOXIA (*zeylanica*). *Linn. ſp.* 151. *Fl. zeyl.* 400.
Veronicæ adfinis indica tenuifolia, floſculis in caliculis barbatis, ſummo caule fere umbellatis. *Plukn. phyt.* 384. *t.* 114. *f.* 2.
Dentillaria zeylanica, flore minimo, antirrhinifolio, wiſſaduli zeylonenſibus. *Raj. ſuppl.* 246. *Burm. zeyl.* 86.
Lychnis indica ſylveſtris, floſculis niveis tenellis, wiſſaduch cinghalenſium. *Herm. herb. Burm. zeyl.* 144.
Habitat in Zeylona.

SIPHONANTHUS (*indica*). *Linn. ſp.* 159.
Siphonanthus ſalicis folio, flore flaveſcente. *Amm. ruth.* 1736. *p.* 214. *t.* 15.
Habitat in India.

IXORA (*coccinea*) foliis ovalibus ſemiamplexicaulibus, floribus faſciculatis. *Linn. ſp.* 159. *Fl. zeyl.* 22.
Jaſminum flore tetrapetalo, Ixora Linnæi, Schetti. *H. mal. Burm. zeyl.* 125. *t.* 57.
Jaſminum indicum lauri folio inodorum umbellatum, floribus coccineis. *Plukn. alm.* 196. *t.* 59. *f.* 2.
Arbor indica lauri amplioribus foliis obtuſis. *Plukn. mant.* 20. *t.* 364. *f.* 1.
Flamma ſylvarum. *Rumph. amb.* 4. *p.* 105. *t.* 46.
Schetti. *Rheed. mal.* 2. *p.* 17. *t.* 13.
Malaice d'jarong. Javanis. Ratambala cingalenſium. *Herm. herb.*
Habitat in variis Indiæ locis.

Fructus, qui proxime ceraſis accedunt, comeduntur ab incolis, & a pavonibus arripiuntur. *Herm. herb.*

IXORA (*alba*) foliis ovatis lanceolatis, floribus faſciculatis. *Linn. ſp.* 160.
Jaſminum indicum lauri folio inodorum umbellatum, floribus albicantibus & ſchetti album. *Plukn. alm.* 196. *t.* 109. *f.* 2.
Jaſminum flore tetrapetalo flavo, Bemſchetti. *H. mal. Burm. zeyl.* 126.
Jaſminum arboreſcens indicum, flore tetrapetalo umbellato, foliis longioribus & anguſtioribus. *Breyn. prod.* 2. *p.* 75.
Bemſchetti *Rheed. mal.* 2. *p.* 19. *t.* 14.
Manaer. Javanis.
Habitat in India.

Differt foliis latioribus obtuſis ut & acuminatis.

PA-

13

T. 13.



1. SPERMACOCE *ocymoides*.
2. KNOXIA *zeylanica*.
3. PAVETTA *indica*.



1. *SPERMACOCE ocymoides.*
2. *KNOXIA zeylanica.*
3. *PAVETTA indica.*

PAVETTA (*indica*). *Linn. ſp.* 160. *Tab.* 13.
Sambucus humilis zeylanica Pawatha zeylanenſibus. *Burm. zeyl.* 209. *f.* 3.
Sambucus antidyſenterica zeylanica humilis. *Herm. muſ. zeyl.* 3.
Arbor malabarienſium, fructu lentiſci. *Bauh. pin.* 399.
Pavate arbor, foliis mali aurei. *J. Bauh. hiſt.* 2. *p.* 102. *Plukn. phyt.* 283. *t.* 147. *f.* 1. foliis alternis.
Pavate. *Raj. hiſt.* 1581.
Pavetta ſive malleomothe. *Rheed. mal.* 5. *p.* 19. *t.* 10.
Flamma ſilvarum peregrina. *Rumph. amb.* 4. *p.* 106. *t.* 47.
Flos chinenſis, quod Jaſminum javanicum latifolium. *D. Kleinhof.*
β Cambong ſantel mera dicta Javanis, quæ latifolia magnitudine duplo majore differt a præcedenti.
Habitat in India.

EXACUM (*ſeſſile*) floribus ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 163. *Fl. zeyl.* 61.
Centaurium zeylanicum minus. *Burm. zeyl.* 57.
Centaurium minus aureum, floſculis numeroſis æthiopicum. *Plukn. alm.* 57. *t.* 275. *f.* 3.
Habitat in Aſia & Africa.

EXACUM (*pedunculatum*) frondibus pedunculatis. *Linn. ſp.* 163.
Lyſimachia caule ter tripartito. *Burm. zeyl.* 146. *t.* 63. *f.* 2.
Lychnis indica Gentianæ folio febrifuga. *Petiv. muſ. no* 657.
Centaurium minus hypericoides, flore luteo, lini capitulis. *Plukn. mant.* 43. *t.* 343. *f.* 3.
Habitat in India.

PLANTAGO (*aſiatica*) foliis ovatis glabris, ſcapo angulato, ſpica floſculis diſtinctis. *Linn. ſp.* 163. ubi deſcr.
Plantago rotundifolia quinquenervia *D. Pryon*, quæ foliis integerrimis & denticulatis.
Habitat in Java & China.

PLANTAGO (*indica*) caule ramoſo herbaceo, foliis integerrimis reflexis, capitulis folioſis. *Linn. ſp.* 167. ubi deſcr.
Habitat in India & Ægypto.

CISSUS (*vitiginea*) foliis cordatis ſubquinquelobis tomentoſis. *Linn. ſp.* 170. *Fl. zeyl.* 60.
Vitis maderaſpatana, fructu azureo, folio ſubrotundo & anguloſo. *Petiv. muſ. n.* 696.

Arbuſcula baccifera circumplicatilis, folio ſubtus lanato, fructu racemoſo fervidiore odoro. *Plukn. mant.* 27. *t.* 337. *f.* 2.
Funis crepitans. *Rumph. amb.* 5. *p.* 416. *t.* 164.
Schunambu-valli. *Rheed. mal.* 7. *p.* 21. *t.* 11.
Ghalberya. *Burm. zeyl.* 105. Galing Galing Javanis.
Habitat in India.

CISSUS (*acida*) foliis ternatis oblongis carnoſis inciſis. *Linn. ſp.* 170.
Sicyos trifoliata. *Linn. ſp.* 1. *p.* 1013.
Iſiola triphylla ſcandens & claviculata, foliis craſſis ſerratis. *Brown. jam.* 147.
Bryonia alba triphylla geniculata, foliis craſſis acidis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 233. *t.* 142. *f.* 6.
Bryonioides trifoliatum indicum, foliis ſucculentis craſſis & crenatis. *Plukn. alm.* 71. *t.* 152. *f.* 2.
Narralei incolis Coromandeli.
Habitat in India utraque.

FAGARA (*Piperita*) foliolis crenatis. *Linn. ſp.* 172.
Piper Japonicum ſio & ſanſio. *Kæmph. amoen.* 892. *t.* 893.
Habitat in Japonia.

TOMEX (*tomentoſa*). *Linn. ſp.* 172. *Fl. zeyl.* 59. ubi deſcr.
Arbor malabarica, Illa dicta, cujus cortice Indi veſcuntur, defectu foliorum Beteles. *Burm. zeyl.* 26.
Habitat in Zeylona & Malabara.

PTELEA (*viſcoſa*) foliis ſimplicibus. *Linn. ſp.* 173.
Triopteris erecta fruticoſa, foliis oblongis acuminatis, ramulis gracilibus. *Brown. jam.* 191. *t.* 18. *f.* 1.
Dodonæa. *Linn. H. cliff.* 144. *Fl. zeyl.* 141. *Roy. lugdb.* 206. *Jacquin. amer.* 19.
Carpinus viſcoſa, ſalicis folio integro oblongo. *Burm. zeyl.* 55. *t.* 23.
Caryophyllaſter littoreus. *Rumph. amb.* 4. *p.* 110. *t.* 50.
Arbuſcula viſcoſa, Eleagni foliis læte virentibus, americana tricoccos. *Plukn. phyt.* 43. *t.* 141. *f.* 1.
Aceri ſ. Paliuro affinis, anguſto oblongo liguſtri folio, flore tetrapetalo herbaceo. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 27. *t.* 162. *f.* 3. *Raj. dendr.* 94.
Staphylodendron, foliis lauri anguſtis. *Plum. ic. t.* 247. *p.* 245.
Habitat in locis arenoſis utriusque Indiæ.

LUDWIGHIA (*alternifolia*) foliis alternis lanceolatis. *Linn. ſp.* 173.
Ludwighia capſulis ſubrotundis. *Linn. H. cliff.* 491. *Roy. lugdb.* 252. *n.* 1. *Gron. virg.* 17.

Ly-

14

T. 14.



1. OLDENLANDIA tenuifolia.
2. BORAGO zeylanica.
3. CAPRARIA uniflora.



1. *OLDENLANDIA tenuifolia.*
2. *BORAGO zeylanica.*
3. *CAPRARIA uniflora.*

Lyſimachia non pappoſa, flore luteo majore, ſiliqua caryophyloide minore ex virginia. *Plukn. alm.* 235. *t.* 203. *f.* 2.
Frutex ſaligneis foliis, caule purpureo, capſularis. *Plukn. amalth.* 99. *t.* 412. *f.* 1.
Panu incolis.
Habitat in utraque India.

LUDWIGHIA (*perennis*) foliis oppoſitis lanceolatis, capſulis pedunculatis. *Linn. ſp.* 173. *Fl. zeyl.* 66.
Lyſimachiæ ſpecies, fructu caryophylloideo. *Burm. zeyl.* 146.
Carambu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 95. t. 49. foliis alternis.
Seroeni ayer kitsjil Javanis.
Habitat in variis Indiæ locis.

LUDWIGHIA (*trifolia*) foliis ternis ovato-lanceolatis, floribus terminalibus pedunculatis.
Doedoek Javanis.

Rad. fibroſa. *Caul.* herbaceus ſpithameus erectus ſtriatus lævis. *fol.* oppoſita petiolata terna, ex quorum alis *pedunc* terminales pollicares, ubi *bracteæ* ovatæ. *Flores* propriis pedicellis inſtructi, gemelli.

OLDENLANDIA (*tenuifolia*) pedunculis unifloris alternis, foliis linearibus, pedunculo longioribus. *Tab.* 14. *f.* 1.
Alſine indica tenuifolia, floſculis ſolitariis albicantibus. D. *Fryon.*
Parpadagam. *Rheed. mal.* 10. *p.* 69. *t.* 35.
Habitat in Java.

Caules ſpithamei procumbentes. *Fol.* oppoſita linearia, pedunculis duplo longiora. *Pedunc.* axillares alterni ſolitarii breviſſimi uniflori. *Fl.* albicantes.

OLDENLANDIA (*biflora*) pedunculis bifloris, petiolo longioribus, foliis lanceolatis. *Linn. ſp.* 174. *Fl. zeyl.* 68.
Antirrhinum humile anguſtifolium, floſculo gemello, ex alis foliorum producto. *Burm. zeyl.* 22. *t.* 11.
Antirrhinum indicum purpureum puſillum. *Herm. zeyl.* 47.
Alſine folio oblongo. D. *Kleinhof.*
Alſine zeylanica. *D. Garzin.* quæ magnitudine & foliis latioribus differt.
Habitat in India, præſertim in Zeylona.

OLDENLANDIA (*umbellata*) umbellis nudis lateralibus alternis, foliis linearibus. *Linn. ſp.* 174. *Fl. zeyl.* 67.
Rubeola zeylanica, Elarathmil dicta. *Burm. zeyl.* 208.
Lyſimachiæ adfinis ſaturejæ foliis maderaſpatenſis, capſulis in ſummitate fere umbellatis. *Plukn. alm.* 236. *t.* 119. *f.* 4.

Rubeola maritima indica molluginis folio, cinghalenſibus Ratmul, id eſt radix rubra, aliis Tſeija, & a Baldeo in deſcr. *Malab.* Eſſaye vocatur. *Hermann. herb.*

Habitat in India.

Rad. fibroſa extus alba intus ruberrima. *Caul.* palmares procumbentes dichotomi. *Fol.* ſubquaterna lineari-lanceolata. *Pedunc.* terminales & axillares alterni umbellati; *pedicellis* ex ſingula umbella 5. v. 6 bifloris.

Radix notiſſima eſt pictoribus indicis ad ingenda lintea. *Herm. herb.*

Tab. 15. *f.* 1. OLDENLANDIA (*paniculata*) pedunculis terminalibus paniculatis, foliis ovali lanceolatis. *Linn. ſp. app.* 1667. ubi deſcr. 1762.

Tjeru-tsjonganam pullu. *Rheed. mal.* 10. *p.* 51. *t.* 26. at cor. quinquefida, folia terna?

Habitat in India.

Caul. pedales, erectiuſculi. *Fol.* oppoſita ſubpetiolata ovali-lanceolata pollicaria. *Pedunc.* terminales dichotomi biflori.

Tab. 15. *f.* 2. OLDENLANDIA (*repens*) caule repente, foliis obovatis petiolatis, axillaribus floſculis.

Alſine ſpergula Indiæ orientalis, cauliculis piloſis, calyce ſpinulis aureis pro ſtaminibus referto, ad ortum foliorum ſingulatim ſeſſili. *Plukn. amalth.* 10. *t.* 356. *f.* 5.

Neladsjira. *Rheed. mal.* 10. *p.* 61. *t.* 31.

Amat loca paludoſa Coromandeli, ubi Nier madalei dicitur.

Rad. annua fibroſa. *Caul.* palmaris procumbens teres ruber, ramis divergentibus. *Fol.* oppoſita petiolata obovata glabra plana. *Pedunc.* ex omni axilla ſolitarii breviſſimi uniflori, qui in horto malabarico terminales.

AMMANNIA (*ramoſior*) foliis ſubpetiolatis, caule ramoſo. *Linn. ſp.* 175.

Samolus maderaſpatanus floridus, verticillis plurimis denſe ſtipatis. *herb. Petiv.* cujus manu notatur: Lapathum anthoxanthi ſummis ramulis aliquatenus accedens Indiæ orientalis. Kalureeve malabarorum. *Plukn. mant.* 112. *&* *alm.* 205. *act. philoſ.* 591. *n.* 264. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 551.

Lapathum aquaticum luteoli folio. *Boccon. muſ. t.* 104.

Blitum anguſtifolium verticillatum. *Boccon. muſ. t.* 80.

Convenit deſcriptio a *Cl. Linnæo* in *ſpec.* data, niſi quod caules virides, calyces pedicellati numeroſi verticillati, optimeque quadrat cum illa *Boccone* figura. *t.* 104.

Tab. 15. *f.* 3 & 4. AMMANNIA (*baccifera*) foliis ſubpetiolatis, capſulis calyce majoribus coloratis. *Linn. ſp* 175. ubi deſcr.

Anonymos linariæ folio orientalis, Gallii lutei flore, herba capſularis verticillata. *Plukn. alm.* 33. *t.* 136. *f.* 2.

Cor-



1. OLDENLANDIA *paniculata*.
2. ——————— *repens*.
3. & 4. AMMANNIA *baccifera*.
5. COMETES *surattensis*.



1. OLDENLANDIA *paniculata*.
2. ———————— *repens*.
3. & 4. AMMANNIA *baccifera*.
5. COMETES *surattensis*.

Cornelia verticillata. *Arduin. ſp.* 2. *p.* 9. *t.* 1. quæ major.

β *Fig.* 3. eadem. ſpecies producta ex ſolo macriori, omnesque, quæ in Java & Coromandel collectæ fuere, magnitudinem harum iconum non ſuperant.

ISNARDIA (*paluſtris*). *Linn. ſp.* 176.
Dantia paluſtris. *Petit. gen.* 49. *t.* 49.
Dantia foliis ſubovatis pediculatis, floribus in foliorum alis ſeſſilibus. *Guett. ſtamp.* 2. *p.* 115.
Ocymophyllum. *Buxb. act.* 4 *p.* 277. *t.* 27.
Glaux major paluſtris, flore herbaceo. *Boccon. muſ.* 105. *t.* 84. *f.* 2. *Moris. præl.* 268. *Raj. hiſt.* 1102. *ſuppl.* 635.
Alſine paluſtris rotundifolia repens, foliis portulacæ pinguibus. *Lind. alſat.* 114. *t.* 2.
Oldenlandia aquatica, foliis obovatis oppoſitis, floribus ſingularibus ad alas. *Brown. jam.* 146.
Creſcit in Java, variisque regionibus.

TRAPA (*natans*) *Linn. ſp.* 175.
Trapa petiolis foliorum natantium ventricoſis. *Linn. H. cliff.* 483.
Tribulus malabaricus aquaticus, foliis ſerratis. *Plukn. alm.* 374.
Tribulus aquaticus major indicus, caulibus geniculatis, foliis amplis numeroſis, in roſæ figuram congregatis. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 619.
Tribulus aquaticus *Bauh. pin.* 194. *Camer.* 715.
Panover tsjierana. *Rheed. mal.* 11. *p.* 65. *t.* 33.
In Aſiæ ſtagnis coenoſis habitat.

COMETES (*ſurattenſis*)
Clinopodium parvum ſinicum, hirſutis majoranæ foliis coronatum. *Plukn. amalth.* 61 *t.* 380. *f.* 4. quod floribus ſeſſilibus differt. *Tab.* 15. *f.* 5.
Planta ſurattenſis & malabarica, Trifolii Lagopi capitulis. *Garzin. herb.*

Caul. pedales teretes. *Fol.* oppoſita ovalia cum acumine. *Pedunc.* bini terminales & axillares ſubalterni. *Involucrum* tetraphyllum foliolis oblongis hiſpidiſſimis triflorum *floſculis* ſeſſilibus: cujusvis floſculi *Petala* quatuor oblonga æqualia obtuſe erectiuſcula. *Stam. filamenta* quatuor membranacea ſetacea longitudine corollæ, *Antheræ* ſubrotundæ parvæ. *Piſt. germen* oblongum. *ſtylus* capillaris longitudine ſtaminum. *Stigma* trifidum.

ELÆAGNUS (*latifolia*) foliis ovatis. *Linn. ſp.* 177. *Fl. zeyl.* 58. *Roy. lugdb.* 250 *no.* 2.
Elæachnus foliis rotundis maculatis. *Burm. zeyl.* 92. *t.* 39. *f.* 2.
Olea ſylveſtris zeylanica, argenteo folio. *Plukn. alm.* 269.
Zizyphus zeylanica argentea, ſpinis carens. *Herm. prodr.* 386.
Zizyphus zeylanica argentea, mali cotonei folio. *Raj. deudr.* 44.

β Eleag-

β Elæagnus foliis oblongis acuminatis maculatis. *Burm. zeyl.* 92. *t.* 39. *f.* 1.
Habitat in Zeylona.

SALVADORA (*perſica*). *Linn. ſp.* 178. *Garzin. act. angl.* 1749. *n.* 491.
Rivina paniculata. *Linn. ſyſt.* 10. *p.* 899.
Habitat in India, ad ſinum Perſicum.

TETRAGYNIA.

ILEX (*aſiatica*) foliis lato-lanceolatis obtuſis integerrimis. *Linn. ſp.* 11.
Habitat in Aſia.

COLDENIA (*procumbens*). *Linn.* 182. *Fl. zeyl.* 69.
Teucrii facie bisnagarica tetracoccus roſtrata. *Plukn. alm.* 363. *t.* 64. *f.* 6. *Raj. ſuppl.* 281. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 423. *Raj. ſuppl.* 281.
Alchimillæ vel percepier affinis zeylanica procumbens, chamæcyſſi foliis & facie, flosculis purpureis. *Burm. zeyl.* 10.
Planta zeylanica percepier Lobelio ſimilis, Hanſape cinghalenſium id eſt pes anſerinus. *Herm. herb.*
Seroupaddie incolis.
Habitat in Zeylona Java & Coromandeli.

HELIOTROPIUM (*indicum*) foliis cordato-ovatis acutis ſcabriusculis, ſpicis ſolitariis, fructibus bifidis. *Linn. ſp.* 187. *Fl. zeyl.* 70. *Roy. lugdb.* 405. *n.* 2.
Heliotropium americanum cæruleum, foliis hormini. *Plukn. phyt.* 182. *t.* 245. *f.* 4. *Dod. mem.* 83. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 190.
Heliotropium indicum Hormini foliis latioribus. *Burm. zeyl.* 120. anguſtioribus. *Herm. lugdb.* 307. *Sloan. jam.* 98.
Bena-patsja. *Rheed. mal.* 10. *p.* 95. *t.* 48.
Creſcit in India utraque.
Varietates hujus ſunt floribus albis, ut & foliis anguſtioribus.

HELIOTROPIUM (*orientale*) foliis linearibus glabris aveniis, floribus ſparſis lateralibus. *Linn. ſp.* 188. ubi deſcript.
Habitat in Java.

Tab. 16. *f.* 1. HELIOTROPIUM (*europæum*) foliis ovatis integerrimis tomentoſis rugoſis, ſpicis conjugatis. *Linn. ſp.* 187. *Roy. lugdb.* 404. *n.* 1.
Heliotropium humifuſum, flore minimo, ſemine magno. *Tourn. itiner.* 1. *p.* 85.
Heliotropium majus Dioſcoridis. *Bauh. pin.* 253.
Heliotropium malabaricum incanum. *D. Garzin.*
Habitat in Malabara & Europa.
Planta malabarica cujus exactiſſimam figuram produco, pro varietate potius habenda, nec diſtinctaſatis pro nova ſpecie, albo tomento & lanugine obducta.


HE-

46

T. 16.



1. HELIOTROPIUM *malabaricum*.
2. ———————— *zeylanicum*.
3. EVOLVULUS *tridentatus*.



1. HELIOTROPIUM *malabaricum*.
2. ——————— *zeylanicum*.
3. EVOLVULUS *tridentatus*.

HELIOTROPIUM (*curaſſavicum*) foliis lanceolato-linearibus glabris ave- *Tab.* 16.
niis, ſpicis conjugatis. *Linn. ſp.* 188. *Roy. lugdb.* 405. *n.* 3. *f.* 2.
Heliotropium indicum procumbens glaucophyllum, floribus albis. *Plukn. alm.* 182. *t.* 36. *f.* 3.
Heliotropium curaſſavicum, foliis lini umbilicati. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 452. *ſ.* 11. *t.* 31. *f.* 12.
Heliotropium americanum procumbens, facie lini umbilicati. *Herm. par.* 183. *t.* 183.
Heliotropium maritimum minus, folio glauco, flore albo. *Sloan. hiſt.* 1. *p.* 213. *t.* 31. *f.* 12.
β Heliotropium zeylanicum anguſtifolium in Tutukorin. *Garzin.* e cujus *zeylanicum.*
herbario hanc varietatem produco.
Habitat in Indiis.

Rami lignoſi ſtriati, *fol.* ſparſa in ſummo alterna erecta ſeſſilia oblonga ſcabra. *ſpicæ* dichotomæ longiſſimæ filiformes. *flores* ſolitarii ſeſſiles tubuloſi cernui.

HELIOTROPIUM (*fruticoſum*) foliis lineari-lanceolatis piloſis, ſpicis ſolitariis ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 187.
Heliotropium fruticoſum hirſutum, foliis lanceolatis minoribus, ſpicis ſingularibus terminalibus. *Brown. jam.* 151.
Heliotropium minus lithoſpermi foliis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 214. t. 132. *f.* 4.
Heliotropium perſicum incanum, floribus variegatis. *Garzin.* e cujus *herbario* *Tab.* 19.
figuram deſumſi. *f.* 1.

Frutex pilis ex albo ſplendentibus obductus. *Fol.* lineari-lanceolata plicata ſeſſilia recurvata. *ſpicæ* terminales plerumque tres reflexæ. *flores* variegati cernui. *perſicum.*

BORAGO (*indica*) foliis ramificationum oppoſitis amplexicaulibus, calycynis foliolis ſagittatis. *Linn ſp.* 197. *Roy. lugdb.* 403. *n.* 2.
Boraginoides anguſtifolia, flore pallescente cæruleo. *Boerh. lugdb.* 1. *t.* 188. *Burm. zeyl.* 48.
Cynogloſſoides folio caulem amplexante. *Iſnard. act. par.* 1718. *p.* 325. *t.* 10.
Anchuſæ degeneris facie, Indiæ orientalis herba, quadricapſularis. *Plukn. alm.* 30. *t.* 76. *f.* 3.
Habitat in India Orientali.

BORAGO (*zeylanica*) foliis ramificationum oppoſitis, florum alternis, *Tab.* 14.
oblongis, pedunculis terminalibus unifloris, calycibus protuberantibus. *f.* 2.
Borago zeylanica maxima, floribus ex cæruleo albicantibus. *Burm. zeyl.* 48.
Borraginoides zeylanicum. *Herb. Garzin.*
Habitat in Zeylona.

Caul. herbacei erecti ſcabri, ſetis & punctis albis hiſpidi ramificationibus axillaribus. *Fol.* ad ramos oppoſita, ad flores ſubalterna, erecta ſubpetiolata lanceolato-ovata integerrima, ſuperficie ſuperiori verrucis pilisque albis rugoſa inferiori nitida, bipollicaria. *Pedunc.* axillares terminales. *Cal.* perſiſtens ad fundum tuberculatus piloſus. *Semina* globoſa.

CYCLAMEN (*indicum*) corollæ limbo nutante. *Linn. ſp.* 207. *Fl. zeyl.* 401.
Cyclaminis ſpecies, urula zeylonenſibus. *Burm. zeyl.* 84.
Habitat in Zeylona.

MENIANTHES (*indica*) foliis cordatis ſubcrenatis, petiolis floriferis, corollis interne piloſis. *Linn. ſp.* 207. *Fl. zeyl.* 72.
Nymphæa ceramica. *Rumph. amb.* 6. *p.* 173. *t.* 72. *f.* 3.
Nymphoides indica, flore albo fimbriato. *Tourn. inſt.* 154.
Nymphæa malabarica minor, folio rotundiore, flore albo pentapetalo intus villoſo. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 513.
Nymphæa aquatica minor indica, floribus albis pentapetalis, filamentis intus denſis obſitis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 631.
Nymphæa indica ſubrotundo folio minor, flore albo fimbriato. *Plukn. alm.* 267.
Nedel-ambel. *Rheed. mal.* 11. *p.* 55. *t.* 28.
Habitat in Indiæ foſſis.

HOTTONIA (*indica*) pedunculis axillaribus unifloris. *Linn. ſp.* 208.
Hottonia flore ſolitario, ex florum alis producto. *Burm. zeyl.* 121. *t.* 55. *f.* 1.
Gratiola malabarica, foliis ſtellatim dentatis. *Petiv. gazoph. t.* 54. *f.* 11.
Tſiudan-tſiera. *Rheed. mal.* 12. *p.* 71. *t.* 36.
Habitat in Zeylona & Malabara.

OPHIORRHIZA (*Mungos*) foliis lanceolato-ovatis. *Linn. ſp.* 213. *Fl. zeyl.* 402.
Radix muſtelæ. *Rumph. amb. auct.* 7. *p.* 29. *t.* 16.
Habitat in India.

AZALEA (*indica*) floribus ſubſolitariis, calycibus piloſis. *Linn. ſp.* 214. foliis ovatis.
Chamærhodendron exoticum, ampliſſimis floribus liliaceis. *Breyn. prodr.* 1. *p.* 24.
Ciſtus indicus, ſedi alpini foliis, floribus amplis. *Herm. lugdb.* 152. *t.* 153. *Raj. hiſt.* 1895.
Frutex Japonicus, folio oblongo rugoſo, flore rubro. *D. Kleinhof.*
Tſutſuſi. *Kæmpf. amœn.* 845. *t.* 846.
Habitat in India.

AZA-

AZALEA (*roſmarinifolia*) foliis quaternis lanceolatis, floribus ſolitariis. *Tab.* 3. *f.* 3.
Jaſminum Japonicum, ſive Tſutſuſi Japan, Roſmarini folio. *D. Kleinhof.*
Habitat in Japonia, colitur in Java, ubi perpetuo floret.

Frutex. *Rami* ſimplices ſcabri ex foliorum cicatricibus cortice inæquali, craſſitie pennæ columbinæ minoris. *Folia* Roſmarini inſtar, quaterna vel ex eodem centro plura lineari-lanceolata, marginibus reflexis reclinata, perſiſtentia, ſuperne villoſa linea longitudinali notata, inferne ex griſeo tomentoſa, caulem terminantia, ad exortum pilis ferrugineo-rubris. *Pedunc.* ad apices ramulorum, e centro foliorum circumſtantium, terminalis ſolitarius uniflorus pollicaris, pilis ferrugineis lanatus. *Cal.* e ferrugineo-ruber. *Cor.* flava profunde quinquefida, laciniis ovalibus ſemipollicaribus. *Stam. filam.* corolla breviora. *Anth.* didymæ.

PLUMBAGO (*zeylanica*) foliis petiolatis ovatis glabris, caule filiformi. *Linn. ſp.* 215. *Fl. zeyl.* 73. *Roy. lugdb.* 417. *n.* 2.
Lychnis indica ſpicata, ocymaſtri foliis, fructibus lappaceis oblongis, radice urente. *Comm. hort.* 2. *p.* 169. *t.* 85.
Plumbago zeylanica, folio ſplendente, flore lacteo. *Burm. zeyl.* 195.
Tumba-codiveli. *Rheed. mal.* 10. *p.* 15. *t.* 8.
Habitat in India.

PLUMBAGO (*roſea*) foliis petiolatis ovatis glabris, caule geniculis gibboſis. *Linn. ſp.* 215.
Plumbago zeylanica, folio ſplendente ocymaſtri, flore rubro. *Burm. zeyl.* 195.
Radix veſicatoria. *Rumph. amb.* 5. *p.* 453. *t.* 168.
Schetti codiveli. *Rheed. mal.* 10. *p.* 17. *t.* 9. *Raj. ſuppl.* 550.
Don patma Javanis. *D. Pryon.*
Habitat in India.

Fol. in quibusdam ſpeciminibus undulata denticulata, nec *geniculi* caulis in omnibus apparent, qui in aliis pollicares, in aliis longitudine digiti medii a ſe invicem diſtant, *cortex* niger.

CONVOLVULUS (*medium*) foliis linearibus haſtato-acuminatis, auriculis dentatis, pedunculis ſubunifloris, calycibus ſagittatis, caule volubili. *Linn. ſp.* 218. ubi deſcr.
Convolvulus javanenſis. *herb. Garzin.*
Tala neli. *Rheed. mal.* 11. *p.* 113. *t.* 55. *Burm. zeyl.* 73.
Cankong. Javanis. *D. Kleinhof.*
Habitat in India.

Semper uniflori in noſtris ſpeciminibus.

CONVOLVULUS (*hederaceus*) foliis cordatis integris trilobisque, corollis indiviſis, fructibus erectis. *Linn. ſp.* 219.
Convolvulus flore purpureo, calyce punctato. *Dill. elth.* 99. *t.* 83. *f.* 96.

Convolvulus annuus, foliis cordatis, ramis trilobis, calyce tuberculato villoſo. *Linn. H. cliff.* 67

Convolvulus hederaceus javanicus, flore ſanguineo. *D. Kleinhof.*

Habitat in Aſia, Africa, America.

CONVOLVULUS (*obſcurus*) foliis cordatis indiviſis, caule ſubpubeſcente, pedunculis incraſſatis unifloris, calycibus glabris. *Linn. ſp* 220. ubi deſcr.

Convolvulus flore minore lacteo, fundo atro rubente. *Dill. elth.* 98. *t.* 83. *f.* 95. *Burm. zeyl.* 74.

Ooyet kitsjil. Javanis.

Creſcit in variis Indiæ locis, variatque magnitudine florum.

CONVOLVULUS (*Batatas*) foliis cordatis haſtatis quinque nerviis, caule repente hiſpido tuberifero. *Linn. ſp.* 220. *Roy. lugdb.* 427. *n.* 4.

Convolvulus radice tuberoſa eſculenta. *Catesb. car.* 2. *p.* 60. *t.* 60.

Convolvulus indicus orientalis inhame ſ. Batatas. *Moris. hiſt.* 2. *p.* 11. *ſ.* 1. *t.* 3. *f.* 4. *Swert. flor.* 2. *t.* 35.

Convolvulus indicus vulgo Patates dictus. *Raj. hiſt.* 728.

Convolvulus indicus, anguloſis foliis, radice tuberoſa eduli. *Plukn. alm.* 114.

Batatta. *Rumph. amb.* 5. *p.* 367. *t.* 130. *Bauh. pin.* 91. ubi alba & rubra exhibentur.

Kappa-kelengu. *Rheed. mal.* 7. *p.* 95 *t.* 50.

Habitat in India utraque, ubi tubera eduliis inſerviunt.

CONVOLVULUS (*malabaricus*) foliis cordatis glabris, caule perenni villoſo. *Linn. ſp.* 221.

Convolvulus foliis cordatis acuminatis, caule arboreo ſcandente. *Roy. lugdb.* 429. *n.* 15.

Convolvulus malabaricus, floribus piloſis ſtellam habentibus variegatis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 376.

Convolvulus magnus, flore albo. *D. Kleinhof.*

Kattu-kelengu. *Rheed. mal.* 11. *p.* 105. *t.* 51.

Habitat in Java & Malabara.

Tab. 17. CONVOLVULUS (*mollis*) foliis ovalibus pubeſcentibus nervoſis, caule perenni volubili glabro, calycibus piloſis.

Convolvulus folio molli oblongo ſubtus albicante, oyet dictus *D. Kleinhof.* malaice Rompot paket.

Habitat in Java.

Caul. volubilis teres glaber in quibusdam ſtriatus. *Fol.* ovalia ſæpius cum acumine nitida; ſuperficie ſuperiori rubra inferiori ex albo-ſericea, nervoſa, (*nervis* plerumque duode-

cim



CONVOLVULUS *mollis*.



CONVOLVULUS mollis.



1. CONVOLVULUS *vitifolius*.
2. JPOMŒA *ſagittæfolia*.

cim parallelis). *Pedunc.* axillares ſubtriflori, petiolis breviores. *Cal.* piloſus albus breviſſimus *Cor.* tubus longitudine calycis contractus (quaſi pedicellatus) limbus patens purpuraſcens externe ex albo piloſus. *Stam.* longitudine tubi *Peric.* capſ. calyce perſiſtente incluſa, ſubrotunda lanuginoſa dehiſcens per maturitatem bifida, *Semina* quatuor hinc convexa inde angulata, propria membrana ſeu arilla incluſa.

CONVOLVULUS (*peltatus*) foliis peltatis, pedunculis multifloris. *Linn. ſp.* 221.
Convolvulus lævis indicus major. *Rumph. amb.* 5. *p.* 428. *t.* 157.
Habitat in Amboina.

CONVOLVULUS (*Turpethum*) foliis cordatis angulatis, caule membranaceo quadrangulari, pedunculis multifloris. *Linn. ſp.* 221. *Fl. zeyl.* 74.
Convolvulus indicus alatus maximus, foliis ibiſco nonnihil ſimilibus anguloſis. *Herm. lugdb.* 177. *t.* 178.
Convolvulus indicus, ampliſſimo ſubrotundo folio, caule alato Turbith Garziæ putatus. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 373.
Turbith officinarum Garziæ atque Acoſtæ. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 101.
Turpethum repens, folio altheæ vel indicum. *Bauh. pin.* 149.
Habitat in Zeylona.

CONVOLVULUS (*paniculatus*) foliis palmatis, lobis ſeptem ovatis acutis integerrimis, pedunculis paniculatis. *Linn. ſp.* 223.
Convolvulus indicus, foliis in lacinias aliquot diviſis, floribus ampliſſimis in communi pediculo pluribus. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 374.
Paſſiflora ſpuria bryonoides malabarenſis, folio trifido & quinquefido. *Plukn. alm.* 283.
Flos paſſionis ſpurius malabaricus, folio quinque fido, fructu rotundo. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 65.
Pal-modecca. *Rheed. mal.* 11. *p.* 101. *t.* 49.
β Convolvulus indicus maximus capreolatus tuberoſus, foliis profunde inciſis ſeu tripartitis. *Herm. muſ. zeyl.* 63. *Burm. zeyl.* 72.
Modecca. *Rheed. mal.* 8. *p.* 39. *t.* 20.

Differunt tantum lobis foliorum trilobis et quinquelobis, quod ſæpius in hocce genere locum habet. vid. *Plukn. l. c. Rheed.* 11. *p.* 101. *t.* 49. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 144.

CONVOLVULUS (*vitifolius*) foliis palmatis quinquelobis glabris dentatis, caule piloſo. *Tab.* 18. *f.* 1.
Convolvulo ſimilis Bryoniæ albæ foliis villoſis: ex India orientali. *Plukn. phyt.* 115. *t.* 25. *f.* 3.
Convolvulus vitis folio javanicus. *D. Garzin.*
Ginda pura utan. Javanis.

Caul. volubilis villoſus, *Fol.* petiolata palmata quinqueloba dentata plana, ſuperficie inferiori ex albo pallida. *Pedunc.* axillares ſolitarii, longitudine petiolorum, piloſi bifidi; pedicellis erectis multifloris. *Cal.* piloſus. *Cor.* campanulata, magnitudine ut in tab. depicta, coloris aurantii. *Stam fil.* 5. brevia filiformia, *anth.* ſagittatæ. *Piſt.* germ. ovatum ſuperum. *Stylus* filiformis. *Stigm.* duo globoſa verrucoſa.

Tab. 19. *f.* 2. CONVOLVULUS (*angularis*) caule volubili, foliis cordatis quinquangularibus tomentoſis, pedunculis trifloris.

Convolvulus folio anguloſo, pilis obducto, flore oblongo purpureo. *D. Pryon.*

Caul. lignoſi volubiles piloſi. *Fol.* ſubſeſſilia cordata quinquangularia, angulis obtuſioribus, integerrima, pilis ex rubro ſplendentibus ſcabra. *Pedunc.* axillares longitudine foliorum triflori aliquando uniflori. *Cal.* piloſus. *Cor.* campanulata, calyce triplo longior, aurantii coloris. Ao. 1757. D. v. Santen ſub nomine boar-maſſi ex Java miſit ſpecimen, ab hac non niſi magnitudine differens, foliis glabris petiolatis, corollis capſulisque ſeminalibus duplo majoribus.

CONVOLVULUS (*verticillatus*) foliis cordatis oblongis nudis, pedunculis umbellatis bifidis multifloris. *Linn. ſp.* 220. ubi deſcr.

Convolvulus minor ſcandens, floribus pluribus alaribus, calycibus glabris, foliis oblongo-cordatis. *Brown. jam.* 153.

Convolvulus floribus faciculatim congeſtis. *D. Pryon.*

Quamoclit purpurea ſolanifolia minor. *Plum. ic.* 49. *f.* 2.

Habitat in India utraque.

Differt planta javanica, *fol.* latioribus magis acuminatis, *pedunc.* longioribus, qui raro trifidi.

CONVOLVULUS (*umbellatus*) foliis cordatis, pedunculis umbellatis, caule volubili. *Linn. ſp.* 221.

Convolvulus americanus vulgaris folio, capſulis triquetris numeroſis. *Plukn. alm.* 114. *t.* 167. *f.* 1.

Convolvulus. luteus polyanthos. *Plum amer.* 88. *t.* 102. *ic. t.* 89. *f.* 2.

Convolvulus polyanthos, folio ſubrotundo, flore luteo. *Sloan. jam.* 52.

Convolvulus folio lato, flore luteo. D. *Pryon.*

Creſcit in utraque India.

Javanica planta melius convenit cum *Plum.* quam *Plukn.* figura. *Fol.* cordata profunde inciſa cum acumine. *Pedunc.* in aliis axillares in aliis ſpeciminibus terminales ſecundi, *floribus* erectiuſculis.

Tab. 21. *f.* 1. CONVOLVULUS (*gemellus*) caule volubili, foliis cordatis glabris, pedunculis bifloris.

β Convolvulus folio nigricante acuminato, flore luteo. *D. Kleinhof.*

Habitat in Java, unde plura ejuſdem formæ ſpecimina abſque floribus transmiſſa fuere.

Caul.



1. HELIOTROPIUM persicum.
2. CONVOLVULUS angularis.
3. ——— sericeus.
4. ——— spinosus.



1. HELIOTROPIUM *persicum*.
2. CONVOLVULUS *angularis*.
3. ———— *sericeus*.
4. ———— *spinosus*.

Caul. volubiles glaberrimi ſimpliciſſimi. *Fol.* cordata acuminata integerrima glaberrima. *Pedunc.* axillares ſolitarii, foliis longiores biflori. *Cal.* obtuſiuſculus. *Cor.* albicans. Varietatem a *D. Kleinhof* accepimus foliis latioribus, floribus luteis.

CONVOLVULUS (*biflorus*) foliis cordatis pubeſcentibus, pedunculis geminis, corollis lobis trifidis. *Linn. ſp.* 1668. ubi deſcr.
Habitat in China.

CONVOLVULUS (*uniflorus*) caule volubili, foliis lanceolatis, pedunculis unifloris, bracteis duabus ovatis. *Tab.* 21. *f.* 2.
Convolvulus folio oblongo, ſemine inter foliola duo hirſuta abſcondito. *D. Pryon.*
Habitat in Java.

Fol. vix petiolata lineari-lanceolata. *Pedunc.* breves uniflori. *Bracteæ* ovatæ. Hujus alter uniflorus inter javanicas enumeratur *foliis* petiolatis cordatis obtuſis, *pedunc.* axillaribus unifloris, *foliis* longioribus, *bracteis* duabus ovatis, multumque cum *Convolvulo ſiculo* convenire videtur.

CONVOLVULUS (*ſericeus*) caule procumbente villoſo, foliis inferioribus lanceolatis ſuperioribus ovatis, calycibus villoſis. *Tab.* 19. *f.* 3.
Convolvulus perſicus argenteus. *Garzin. herb.*
Habitat in Perſia.

Planta tomento ex ferrugineo ſplendente obducta ſerici inſtar. *Caul.* lignoſi villoſi. *Fol.* alterna ſubſeſſilia, inferiora lanceolata, ſuperiora ovata, tomentoſa repanda. *Pedunc.* axillares alterni ſolitarii uniflori, longitudine foliorum cum *calycibus* villoſi. *Cor.* alba,

CONVOLVULUS (*ſpinoſus*) caule erecto ſuffruticoſo, apice ſpinoſo, foliis ellipticis, floribus ſolitariis. *Tab.* 19. *f.* 4.
Convolvulus perſicus ſpinoſus fruteſcens. *Garzin. herb.*
Habitat in Perſia.

Fruticis facies nitida, *Ramulis* plurimis ſparſis, apice ſpinoſis. *Spinæ* ſimplices obliquæ. *Stipula* minima ad ſpinarum & pedunculi exortum. *Pedunc.* terminales ſubalterni ſolitarii patentes uniflori infra calycem inflexi, ubi *Bracteæ* binæ lanceolatæ minimæ. *Cal.* erectus ovatus glaberrimus. *Cor.* tubo brevi, limbo campanulato.

CONVOLVULUS (*repens*) foliis ſagittatis poſtice obtuſis, caule repente, pedunculis unifloris. *Linn. ſp.* 225.
Convolvulus folio ſagittato, flore rubeſcente, malaice Daun cancon. *D. Pryon.*
Convolvulus marinus catharticus, foliis acetoſæ, flore niveo. *Plum. amer.* 89. *t.* 105. cum qua Javanica optime quadrat.
Ballel. *Rheed. mal.* 11. *p.* 107. *t.* 52.
Creſcit in utraque India.

CON-

CONVOLVULUS (*reptans*) foliis haſtato-lanceolatis, auriculis rotundatis, pedunculis ſubbifloris. *Linn. ſp.* 225. ubi deſcr.
Convolvulus zeylanicus, folio ſagittato. *Burm. zeyl.* 73.
Olus vagum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 419. *t.* 155. *f.* 1.
Habitat in Zeylona & Amboina.

CONVOLVULUS (*hirtus*) foliis cordatis ſubhaſtatisque villoſis, caule petiolisque piloſis, pedunculis multifloris. *Linn. ſp.* 226. ubi deſcr.
Convolvulus foliis cordato-haſtatis glabris acuminatis anguſtis rotundatis, caule petiolisque piloſis. *Roy. lugdb.* 429. *n.* 14. *Linn. H. cliff.* 496.
Habitat in India.

CONVOLVULUS (*pes capræ*) foliis bilobis, pedunculis unifloris. *Linn. ſp.* 226. *Fl. zeyl.* 75. *Roy. lugdb.* 428. *n.* 8.
Convolvulus maritimus, ſeu ſoldanella e maderaſpatan, folio in ſummitate ſinuato. *Plukn. phyt.* 114. *t.* 24. *f.* 4. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 371.
Convolvulus maritimus zeylanicus, folio craſſo cordiformi. *Herm. lugdb.* 174. *t.* 175. *Burm. zeyl.* 71.
Convolvulus marinus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 433. *t.* 159. *f.* 1.
Convolvulus javanicus maritimus, folio cordiformi, campoga laut-dictus. *D. Kleinhof.*
Schovanna-adamboe. *Rheed. mal.* 11. *p.* 117. *t.* 57.
Habitat in variis Indiæ plagis et ad littora.

Tab. 20. *f.* 1. CONVOLVULUS (*nervoſus*) foliis cordatis nervoſis, ſubtus tomentoſis, pedunculis umbellatis multifloris.
Convolvulus major, folio ſubrotundo, flore amplo purpureo. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 154. *t.* 98. *f.* 1.
Convolvulus latifolius, foliis ſubtus albis lanuginoſis, ſupra ſaturate-viridibus; Soychi incolis dictus. *D. Outgaerden.*
Habitat Coromandeli.

Planta tomento albo obducta. *Fol.* cordata integerrima acuminata, ſuperficie ſuperiore nigra, inferiore ex ſericeo albicante, tomentoſa palmaria nervoſa, nervis plerumque viginti parallelis alternis cum coſta protuberantibus, ad marginem evaneſcentibus. *Petiol.* angulati ſtriati, uſque ad folii expanſionem incraſſati, tomentoſi. *Floreſcentia* capitulum. *Pedunc.* foliis duplo longiores tomentoſi umbellati; *Pedicellis* breviſſimis. *Cal.* tubus longitudine pedicellorum, laciniis ovatis cum acumine villoſis, *Cor.* magna purpurea extus ſericea, tubo longitudine calycis.

IPOMOEA (*Quamoclit*) foliis pinnatifidis linearibus, floribus ſubſolitariis. *Linn. ſp.* 227. *Fl. zeyl.* 77. *Roy. lugdb.* 430. *n.* 3. *Mill. dict. t.* 214.
Convolvulus pennatus exoticus rarior. *Col. aquat.* 73. *t.* 72. *Moris. hiſt.* 2. *p.* 18. *f.* 1. *t.* 4. *f.* 7.

Con-



1. CONVOLVULUS *nervoſus*.
2. JPOMŒA *hepaticæfolia*.



1. CONVOLVULUS *nervosus.*
2. JPOMŒA *hepaticæfolia.*

Convolvulus exoticus annuus myriophylli foliis, flore ſanguineo. *Plukn. alm.* 117.

Quamoclit foliis tenuiter inciſis et multifidis. *Tourn. inſt.* 176. *Burm zeyl* 197. *Mill. icon. f.* 214.

Quamoclit ſive Jaſminum americanum. *Cluſ. poſth.* 9.

Flos cardinalis. *Rumph. amb* 5. *p.* 421. *t.* 155. *f.* 2.

Jaſminum millefolii folio. *Bauh. pin.* 398.

Tſiura-cranti. *Rheed. mal.* 11. *p.* 123. *t.* 60. malaice Rikes.

Creſcit in plurimis Indiæ locis, & colitur in hortis.

IPOMAEA (*coccinea*) foliis cordatis acuminatis baſi angulatis, pedunculis multifloris. *Linn. ſp.* 228. *Roy. lugdb.* 429 *n.* 1.

Quamoclit americana, folio hederæ, flore coccineo. *Commel. rar.* 21. *t.* 21.

Convolvulus coccineus, flolio anguloſo. *Plum. amer.* 89. *t.* 103. *Raj. ſuppl.* 380.

Pucta rava malaice.

Habitat in utraque India.

IPOMAEA (*campanulata*) foliis cordatis, pedunculis multifloris, perianthio exteriori orbiculari, corollis campanulatis lobatis. *Linn. ſp.* 228.

Convolvulus maritimus zeylanicus et javanicus. *herb. Garzin.*

Convolvulus malabaricus, flore maximo purpuraſcente. *Raj. hiſt.* 3 *p.* 377.

Adamboe. *Rheed. mal.* 11. *p.* 115. *t.* 56.

Habitat in malabara.

IPOMOEA (*bona nox.*) foliis cordatis acutis integerrimis, caule aculeato, floribus ternis, corollis indiviſis. *Linn. ſp.* 228. ubi deſcr.

Convolvulus maximus, caule ſpinulis obtuſis obſito, *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 151. *t.* 96. *f.* 1.

Convolvulus americanus, ſubrotundis foliis, viticulis ſpinoſis. *Plukn. alm.* 115. *t.* 276. *f.* 3.

Ipomæa ſilveſtris, foliis et floribus ampliſſimis, tubis florum ſubteretibus. *Brown. jam.* 155.

Munda-valli. *Rheed. mal.* 11. *p.* 103. *t.* 50. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 375.

Habitat in India utraque.

Javanicæ *Caules* glabri abſque ſpinis, *foliis* minoribus magis acuminatis.

IPOMAEA (*ſolanifolia*) foliis cordatis acutis integerrimis, floribus ſolitariis. *Linn ſp.* 229. *Roy. lugdb.* 430. *n.* 2.

Convolvulus folio cordato glabro. *D Pryon.*

Quamoclit ſolanifolio, flore roſeo. *Plum. ſp.* 3. *ic.* 94. *f.* 1.

Creſcit in utraque India.

Tab. 20. f. 2. IPOMOEA (*hepaticæfolia*) foliis trilobis aggregatis. *Linn. ſp.* 230. *Fl. zeyl.* 79.

Convolvulus indicus villoſus, Hederæ folio tripartito, flore cæruleo. *Herm. lugdb.* 182.

Convolvulus zeylanicus hirſutus, folio Hepaticæ trilobatæ, floribus plurimis in capitulo junctis. *Burm. zeyl.* 73. *Herm. prodr.* 327. *Ray. hiſt.* 3. *p.* 872.

Convolvulus hirſutus, folio tripartito. *D. Pryon.*

Habitat in zeylona et Java.

IPOMAEA (*tamnifolia*) foliis cordatis acuminatis piloſis, floribus aggregatis. *Linn. ſp.* 230.

Volubilis caroliniensis, Tamni folio ſubhirſuto. *Dill. elth.* 428. *t.* 318. *f.* 410.

Convolvulus hirſutus, folio cordiformi. *D. Pryon.*

Habitat in utraque India.

IPOMAEA (*pes tigridis*) foliis palmatis, floribus aggregatis. *Linn. ſp.* 230. *Fl. zeyl.* 79.

Convolvulus zeylanicus villoſus platyphyllos et heptaphyllos minor, Pes tigrinus. *Herm. lugdb.* 187. *act. Bonon.* 11. *p.* 2. *p.* 362. *t.* 23. *f.* 2.

Volubilis zeylanica, Pes tigrinus dicta. *Dill. elth.* 419. *t.* 318. *f.* 411.

Convolvulus zeylanicus hirſutus, foliis Pedis tigridis in modum ſive in quinque profundas lacinias diviſis. *Burm. zeyl.* 70.

Pullu-ſchovadi. *Rheed. mal.* 11. *p.* 121. *t.* 59.

Habitat in variis Indiæ locis, frequens in hortis.

Javanica ſetis albicantibus rugoſa, perſica vero glaberrima.

Tab. 21. f. 3. IPOMOEA (*paniculata*) caule volubili, foliis ovatis acuminatis, pedunculis paniculatis.

Convolvulus ſemine coriandri, Oyot-kitsjil dictus. *D. Kleinhof.*

β Oyot folio rugoſo, fructu trigono. *D. Kleinhof*, quæ differt foliis cordatis obtuſis rugoſis.

Habitat in Java.

Caul. volubiles. *Fol.* ovata cum acumine ariſtato glaberrima, *petiolis* tenuiſſimis. *Pedunc.* incraſſati, pedicellis ſubumbellatis.

Tab. 18. f. 1. IPOMAEA (*ſagittæfolia*) foliis haſtatis, pedunculis bifloris.

Convolvulus javanicus. *Garzin. herb.*

Habitat in Java.

Caul. in noſtro ſpecimine tenerrimi albicantes volubiles. *Fol.* haſtato-ſagittata lobis acuminatis, ſuperiori lanceolato longiſſimo, glaberrima lucida. *Pedunc.* incraſſati biflori, *pedicellis* corolla brevioribus. *Cor.* lutea, tubo pollicari, limbo breviſſimo planiuſculo.

NAU-



1. CONVOLVULUS *gemellus*.
2. ———— *uniflorus*.
3. JPOMŒA *paniculata*.

T. 21*.



1. PORANA *volubilis*.
2. APLUDA *aristata*.
3. ISCHŒMUM *aristatum*.

P. 51.

T. 21*



1. PORANA *volubilis*.
2. APLUDA *aristata*.
3. ISCHŒMUM *aristatum*.

NAUCLEA (*orientalis*). *Linn. ſp.* 243.
Cephalanthus foliis oppoſitis. *Linn. Fl. zeyl.* 53. *ſp. pl.* 1. *p.* 95.
Platanocephalos citri foliis bijugis, capite majore. *Vaill. act.* 1722. *p* 259.
Arbor indica, fructu aggregato globoſo. *Raj. hiſt.* 1441.
Bancalus. *Rumph. amb.* 3. *p.* 184. *t.* 55.
Katu-tſiaka. *Rheed. mal.* 3. *p.* 29. *t.* 33.
Habitat in India.

RONDELETIA (*aſiatica*) foliis petiolatis oblongis acutis. *Linn. ſp.* 244. *Fl. zeyl.* 80.
Frutex indicus baccifer, floribus umbellatis, fructu rotundo polyſpermo. *Raj. hiſt.* 1494.
Cupi. *Rheed. mal.* 2. *p.* 37. *t.* 23.
Caraknaſi Foela Aros. Javanis.
Habitat in Malabara & Zeylona.

VALLARIS (*pergulanus*).
Flos pergulanus, Pele Tsjedangan. *Rumph.* 5. *l.* 7. *c.* 28. *p.* 51.
Carack Naſſi malaice javanis.
Habitat in Java.

Frutex, cujus florendi modus multum cum *Rumph. f.* 2. *t.* 29. *tom.* 5. convenit, licet major. *Fol.* oppoſita petiolata ovata integerrima lævia. *Pedunculi* alterni dichotomi. *Floreſcentia* umbellaris. *Cal. perianth.* quinque partitum parvum, foliolis linearibus acutis. *Cor.* monopetala hypocrateriformis, *tubus* cylindricus vix calyce longior, *limbus* planus rotatus lobis quinque ovatis. *Stam. filamenta* quinque ſubulata tubum terminantia, *anth.* ſagittatæ cum veſicula a tergo. *Piſt. germ.* ovatum. *Stylus* cylindricus longitudine ſtaminum. *Stigma* craſſiuſculum obtuſum.

SAMOLUS (*aſiaticus*). *Linn. ſp.* 243.
Samolus africanus, folio rotundiore. *Walth. hort.* 162. *t.* 23.
Habitat in Aſia, Africa, Europa.

PORANA (*volubilis*).
Frutex volubilis ſilveſtris, flore albo racemoſo. *D. Kleinhof.*
Habitat in Java.

Frutex caule glabro. *Folia* alterna petiolata cordata integerrima acuminata lævia. *Floreſcentia* terminalis. *Panicula* magna patula. *Cal. perianth.* pentaphyllum, foliolis oblongis obtuſis corolla dimidio brevioribus. *Cor.* monopetala campanulata ſemiquinquefida, laciniis ovatis æqualibus. *Stam. filam.* quinque capillaria, longitudine corollæ. *Anth.* ſubrotundæ. *Piſt. germen* ſubrotundum. *Stylus* capillaris ſemibifidus, longitudine corollæ. *Stigmata* capitata.

PSYCHOTRIA (*aſiatica*) ſtipulis emarginatis, foliis lanceolato-ovatis. *Linn. ſp.* 245.
Pſychotrophum fruticoſum, foliis amplioribus ovatis, ſtipulis rigidis interpoſitis. *Brown. jam.* 160. *t.* 17. *f.* 2.
Habitat in India orientali & Jamaica.

PSYCHOTRIA (*herbacea*) caule repente, foliis cordatis petiolatis. *Linn. ſp.* 245.
Pſychotrophum herbaceum repens ſylvaticum, foliis ſubrotundo-cordatis oppoſitis, floribus paucioribus alaribus, laciniis corollæ erecto-patentibus. *Brown. jam.* 161.
Jaſminum inodorum repens, violæ foliis, fructu puniceo. *Barr. æqu.* 63.
Violæ folio, baccifera repens, flore albo pentaphyllode, fructu rubro diſpermo. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 243.
Violæ folio, centaurei minoris flore candido, baccifera, dipyrena. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 358.
Pyrolæ affinis malabarica, foliis ſubrotundis baccas ferens. *Plukn. amalth.* 179.
Periclymeno accedens planta Indiæ, foliis periclymeni rotundioribus, fructu bipyreno. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 535.
Karinta-kali. *Rheed. mal.* 10. *p.* 41. *t.* 21.
Habitat in Indiæ utriusque umbroſis roridis.

COFFÆA (*arabica*) floribus quinquefidis diſpermis. *Linn. ſp.* 245. *Roy. lugdb.* 259. *Linn. amoen.* 6. ubi elegans icon & deſcriptio.
Jaſminum arabicum, lauri folio, cujus ſemen apud nos coffe dicitur. *Juſſ. act.* 1713. *p.* 388. *t.* 7.
Jaſminum arabicum Caſtaneæ folio, flore albo odoratiſſimo. *Till. piſ.* 87. *t.* 32.
Euonymo affinis ægyptica, fructu baccis lauri ſimili. *Bauh. pin.* 498. *Bon. alp. ægypt.* 36. *t.* 36. *Plukn. alm.* 69. *t.* 272. *f.* 1.
Creſcit in utraque India, Æthiopia, & Arabia felici.
β Coffy-laut Javanis. *D. Kleinhof.*

Hæc ſilveſtris, cujus Folia tantum recepimus, differt foliis obtuſioribus ſeſqui majoribus nec acuminatis, reperiturque tantum in inſulis.

MORINDA (*umbellata*) erecta, foliis lanceolato-ovatis, pedunculis confertis. *Linn. ſp.* 250. *Fl. zeyl.* 81.
Bancudus anguſtifolia. *Rumph. amb.* 3. *p.* 157. *t.* 98.
Habitat in India.

MORINDA (*citrifolia*) arborea, pedunculis ſolitariis. *Linn. ſp.* 250. *Fl. zeyl.* 82.
Morinda malabarica ampliſſimo citri folio. *Vaill. act. pariſ.* 1722. *p.* 202.
Bancudus latifolia. *Rumph. amb.* 3. *p.* 158. *t.* 99.
Arbor conifera, mecondri Javanenſium. *Bont. jav. p.* 97.
Coda-pilava. *Rheed. mal.* 1. *p.* 97. *t.* 52.
Habitat in India.

MUS-

MUSSAENDA (*frondoſa*) *Linn. ſp.* 251. *Fl. zeyl.* 84.
Muſſænda zeylanica, flore rubro, folio ex florum thyrſo prodeunte albo. *Burm. zeyl.* 165. *t.* 76.
Folium principiſſæ. *Rumph. amb.* 4. *p.* 111. *t.* 51.
Arbor indica, floribus in faſciculos diſpoſitis, e quorum medio emergit folium ſingulare flavum. *D. Pryon.*
Belilla. *Rheed. mal.* 2. *p.* 27. *t.* 18.
Habitat in India.

MIRABILIS (*jalapa*) floribus congeſtis terminalibus erectis. *Linn. ſp.* 252. *Fl. zeyl.* 85.
Nyctage. *Roy. lugdb.* 417.
Jalappa flore parvo. *Tourn. inſt.* 130. *Burm. zeyl.* 124.
Mirabilis marvoljo boniæ wactu kitsjil. *Rumph. amb.* 5. *p.* 253. *t.* 89.
Admirabilis peruana, flore albo. *Cluſ. rar. hiſt.* 5. *p.* 87. *t.* 89.
Solanum mexicanum, flore magno. *Bauh. pin.* 168.
Creſcit in utraque India.

MIRABILIS (*dichotoma*) floribus ſeſſilibus axillaribus erectis ſolitariis. *Linn. ſp.* 252.
Admirabilis peruana, jasmini roſa. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 90. *f.* 90.
Jalappa officinarum. *Mart. cent.* 1. *t.* 1.
Habitat in Indiis.

DATURA (*ferox*) pericarpiis ſpinoſis erectis ovatis, ſpinis ſupremis maximis convergentibus. *Linn. ſp.* 255.
Datura cocchinenſis ſpinoſiſſima. *Zanon. hiſt.* 1. *p.* 76.
Stramonium ſive datura ferox, pomis craſſioribus, aculeis robuſtioribus. *Herm. lugdb.* 583. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 607. *ſ.* 15. *t.* 2. *f.* 4.
Habitat in China.

DATURA (*metel*) pericarpiis ſpinoſis nutantibus globoſis, foliis cordatis ſubintegris pubeſcentibus. *Linn. ſp.* 256. *Fl. zeyl.* 86. *Roy. lugdb.* 422.
Datura alba. *Rumph. amb.* 5. *p.* 242. *t.* 87.
Stramonium zeylanicum. *Burm. zeyl.* 221.
Solanum pomo ſpinoſo rotundo, flore violaceo ſimplici. *Tourn. inſt.* 118.
Solanum pomo ſpinoſo rotundo, longo flore. *Bauh. pin.* 168.
Hummatu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 47. *t.* 28.
Habitat in India & Africa.

DATURA (*feſtuoſa*) pericarpiis tuberculatis nutantibus globoſis, foliis lævibus. *Linn. ſp.* 256.
Datura rubra. *Rumph. amb.* 5. *p.* 242. *t.* 87. *f.* 2.

Datura flore purpureo duplicato. *D. Kleinhof.*
Solanum fœtidum, fructu ſpinoſo rotundo, ſemine pallido. *Bauh. pin.* 168.
Nux metella. *Cam. epit.* 175.
Habitat in India & Ægypto.

β Varietatem hujus ex ſeminibus javanicis Ao. 1763. habuimus, *caule* obtuſangulo purpuraſcente maculis nigris. *Fol.* latioribus glaberrimis verrucoſis ſurſum deliquium patientibus. *Corolla* flava, *pericarpiis* nutantibus globoſis, *aculeis* brevibus tuberculatis.

NICOTIANA (*fruticoſa*) foliis lanceolatis ſubpetiolatis amplexicaulibus, floribus acutis, caule fruticoſo. *Linn. ſp.* 258.
Nicotiana foliis lineari-lanceolatis acuminatis ſemiamplexicaulibus, caule fruticoſo. *Mill. icon.* 184. *f.* 1.
Nicotiana. *Burm. zeyl.* 169.
Nicotiana major ſive tabacum majus. *D. Pryon.*
Creſcit in Java, China & ad Caput *B. Spei.*

Javanica ſpecimina differunt foliis omnibus ovato-lanceolatis, in quibuſdam petiolatis, neutiquam amplexicaulibus nec decurrentibus, panicula laxa.

PHYSALIS (*flexuoſa*) caule fruticoſo, ramis flexuoſis, floribus confertis. *Linn. ſp.* 261. ubi deſcr.
Baccifera indica, floribus ad foliorum exortum, fructu ſulcato decapyreno. *Raj. hiſt.* 1332.
Alkekengi ſomniferum, cydoniæ folio, flore & fructu rubris. *Burm. zeyl.* 10.
Peevetti. *Rheed. mal.* 4. *p.* 113. *t.* 55.
Habitat in India.

PHYSALIS (*angulata*) ramoſiſſima, ramis angulatis glabris, foliis ovatis dentatis. *Linn. ſp.* 262. *Fl. zeyl.* 97. *Roy. lugdb.* 427.
Solanum veſicarium indicum erectum, folio lævi, annuum. *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 13. *t.* 3. *f.* 22.
Halicacabum ſive ſolanum indicum. *Bauh. pin.* 166. *Camer. hort.* 70. *t.* 17.
β Alkekengi indicum glabrum capſici folio. *Dill. elth.* 12. *t.* 11. *f.* 11. *Burm. zeyl.* 10.
Habitat in utraque India.

PHYSALIS (*minima*) ramoſiſſima, pedunculis fructiferis, folio villoſo longioribus. *Linn. ſp.* 263. *Roy. lugdb.* 427.
Solanum veſicarium indicum minimum. *Herm. lugdb.* 569. *t.* 571.
Alkekengi indicum minimum, fructu vireſcente. *Tourn. inſt.* 151. *Burm. zeyl.* 11.
Solanum veſicarium zeylanicum minimum. *Amm. H. Boſian.* 33.
Pee-inota-inodien. *Rheed. mal.* 10. *p.* 140. *t.* 71.
Creſcit in incultis Malabariæ & Zeylonæ locis.

PHY-



1. **SOLANUM** *guinense*.
2. ——— *trilobatum*.
3. ——— *trifoliatum*.



1. SOLANUM *guinenſe*.
2. ———— *trilobatum*.
3. ———— *trifoliatum*.

PHYSALIS (*pubeſcens*) ramoſiſſima, foliis villoſo-viſcoſis, floribus penduiis. *Linn. ſp.* 262. ubi deſcr.
Alkekengi virginianum, fructu luteo. *Fewill. peruv.* 3. *p.* 5. *t.* 1.
Solanum veſicarium virginianum procumbens annuum, folio lanuginoſo. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 527. *ſ.* 13. *t.* 3. *f.* 24.
Inota-inodien. *Rheed. mal.* 10. *p.* 139. *t.* 70. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 358.
Habitat in India utraque & Virginia.

PHYSALIS (*pruinoſa*) ramoſiſſima, foliis villoſis, pedunculis ſtrictis. *Linn. ſp.* 263.
Alkekengi indicum glabrum chenopodii folio. *Dill. elth.* 12. *t.* 12. *f.* 12.
Habitat in Indiis.

SOLANUM (*verbaſcifolium*) caule inermi fruticoſo, foliis ovatis tomentoſis integerrimis, umbellis compoſitis. *Linn. ſp.* 263.
Solanum maxime tomentoſum, ſpinis carens, virginianum. *Plukn. alm.* 351. *t.* 316. *f.* 1.
Solanum arboreſcens verbaſci folio. *Plum ſpec.* 4.
Habitat in utraque India.

Ramulum hujusce plantæ Ao. 1759. ex Java accepimus optime cum *Linnæi* deſcriptione & *Pluknetii* figura convenientem. *Rami* lignoſi teretes ſtriati, craſſitie pennæ cygninæ, ſcabri medulloſi. *Fol.* ovata palmaria integerrima cinereo-tomentoſa. *Pedunc.* ſtriati, *Cal.* tomentoſi albicantes.

SOLANUM (*guinenſe*) caule inermi fruticoſo, foliis ovatis integerrimis, pedunculis lateralibus filiformibus. *Linn. ſp.* 263. *Roy. lugdb.* 424. *n.* 7.
Habitat in India utraque.

SOLANUM (*Lycoperſicum*) caule inermi herbaceo, foliis pinnatis incifis, racemis ſimplicibus. *Linn. ſp.* 265. *Roy. lugdb.* 423. *n.* 2.
Solanum pomiferum, fructu rotundo ſtriato molli. *Baub. pin.* 167. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 521. *ſ.* 13. *t.* 1. *f.* 7.
Lycoperſicon fructu ceraſi rubro. *Tourn. inſt.* 150.
Pomum amoris. *Rumph.* 5. *p.* 410. *t.* 154. *f.* 1.
Solanum hirundinariæ folio, malaice Trong Bali. *D. Pryon.*
Habitat in utraque India.

SOLANUM (*nigrum*) caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, umbellis nutantibus. *Linn. ſp.* 266. *Roy. lugdb.* 423. *n.* 3.
Solanum officinarum. *Bauh. pin.* 166.
Nelen-tsjunda. *Rheed. mal.* 10. *p.* 105. *t.* 73.

Ubique terrarum licet creſcat hoc nigrum, mire tamen variat, illudque ex Indiis allatum ſæpe ludit foliis ovatis integerrimis, atque repandis, cujus varietates apud *Dillen.* in *H. elt.* 366. *t.* 274 & 275. videri poſſunt.

SO-

SOLANUM (*Melongena*) caule inermi herbaceo, foliis ovatis tomentoſis integris, calycibus aculeatis, fructu pendulo. *Linn. ſp.* 266. *Fl. zeyl.* 93. *Roy. lugdb.* 426. *n.* 17.
Solanum pomiferum, fructu oblongo. *Bauh. pin.* 167.
Solanum fructu ovi gallinacei forma & magnitudine. Javanice Trong copack. *D. Pryon.*
Melongena fructu oblongo. *Tourn. inſt.* 152. *Burm. zeyl.* 157.
Trongum hortenſe. *Rumph. amb.* 5. *p.* 238. *t.* 85.
Nila barudena. *Rheed. mal.* 10. *p.* 147. *t.* 74.
Differt fructu & foliatura, amat loca humida, creſcit in Aſia, Africa, America.

SOLANUM (*ferox*) caule aculeato herbaceo, foliis cordatis angulatis tomentoſis aculeatis, baccis hirtis, calyce obtectis. *Linn. ſp.* 267. ubi deſcr.
Solanum ſpinoſum pomiferum, foliis cardui ſive acanthi ſpinoſi. *D. Pryon.*
Ana-ſchunda. *Rheed. mal.* 2. *p.* 65. *t.* 35.
Habitat in Malabaria, Java.

SOLANUM (*mammoſum*) caule aculeato herbaceo, foliis cordatis angulato-lobatis utrimque villoſis aculeatis. *Linn. ſp.* 267.
Solanum barbadenſe ſpinoſum annuum, fructu aureo rotundiore pyri parvi inverſi forma & magnitudine. *Plukn. alm.* 350. *t.* 226. *f.* 1. *Merian. ſurin.* 27. *t.* 27.
Solanum indicum ſpinoſum maximum villoſum totum, fructibus croceis. *Herm. muſ. zeyl.* 25 *Burm. zeyl.* 218.
Solanum pomiferum ſpinoſum, foliis maximis anguloſis lanuginoſis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 353.
Habitat in utraque India.

SOLANUM (*indicum*) caule aculeato fruticoſo, foliis cuneiformibus angulatis ſubvilloſis integerrimis, aculeis utrinque rectis. *Linn. ſp.* 268. *Fl. zeyl.* 94. *Roy. lugdb.* 424. *n.* 10.
Solanum indicum ſpinoſum, flore Borraginis. *Dill elth.* 362. *t.* 270. *f.* 349.
Solanum fruteſcens villoſum, foliis undulatis mollibus ſubtus incanis, ſpinis flaveſcentibus armatum. *Burm. zeyl.* 220. *t.* 102.
Solanum indicum fruteſcens ſpinoſum, borraginis flore, fructu croceo rotundo minimo. *Herm. muſ. zeyl.* 65. & *herb.*
Solanum indicum ſpinoſum, fructibus croceis malaice Trong utan. *D. Pryon.*
Scheru-ſchunda. *Rheed. mal.* 2. *p.* 67. *t.* 36.
β Solanum incanum chinenſe minus ſpinoſum, floribus parvis fere umbellatis. *Plukn. phyt.* 351. *t.* 62. *f.* 1.
Habitat in utraque India.

SO-

SOLANUM (*Jurattenſe*) caule aculeato herbaceo, foliis oblongis pinnatifido-laciniatis utrinque ſpinis flaveſcentibus.
Solanum americanum laciniatum ſpinoſiſſimum *Dill. elth.* 360. *t.* 267. *f.* 346.
Solanum annuum nigricans virginianum ſpinoſiſſimum late ſe ſpargens, flore cæruleo glabrum. *Plukn. phyt.* 351. *t.* 62 *f.* 3.
Planta ſpinoſiſſima virginiana Borraginis flore. *Raj. hiſt.* 674. *& app.* 1876.

Bina hujus ſpecimina in inſula Zuratta collegit D. *Garzin.*, quorum alterum optime cum citatis figuris convenit, alterum differt foliatura minori, ſpinis rarioribus brevioribus, quadratque cum *Plukn.* figura 6. Solanum americanum perenne ſubincanum, fructu pyriformi longiore, ſpinis plurimis armatum.

SOLANUM (*ſodomæum*) caule aculeato fruticoſo, foliis obovatis pinnatifido-ſinuatis obtuſis ſparſe aculeatis nudis, calycibus aculeatis. *Linn. ſp.* 268. *Fl. zeyl.* 95. *Roy. lugdb.* 424. *n.* 8.
Solanum ſpinoſum, profunde laciniatis foliis ſubtus tomentoſis. *Plukn. alm.* 351. *t.* 316 *f.* 4.
Solanum pomiferum miferum fruteſcens africanum ſpinoſum nigricans, Borraginis flore, foliis profunde laciniatis. *Herm. lugdb.* 573. *t.* 575. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 521. *ſ.* 13. *t.* 1. *f.* 15.
Solanum indicum, pomum de hiericho dictum, Borraginis flore, foliis profunde laciniatis. *Burm. zeyl.* 219.
Habitat in Zeylona & Africa.

SOLANUM (*trilobatum*) caule aculeato fruticoſo, foliis cuneiformibus ſubtrilobis glabris obtuſis inermibus. *Linn. ſp.* 270. ubi deſcr. *Tab.* 22. *f.* 2.
Solanum ſpinoſum jamaicenſe glabrum, foliis parvis minus profunde laciniatis. *Plukn. alm.* 351. *t.* 316. *f.* 5.
Solanum fruteſcens, foliis undulatis, ſpinis flaveſcentibus armatis, fructu rubro rotundo. *D. Pryon*, a quo ſæpius ex Java miſſum.
Habitat in utraque India.

SOLANUM (*trifoliatum*) caule aculeato fruticoſo, foliis ternatis ovatis integerrimis. *Tab.* 22. *f.* 3.
Habitat in Coromandel. *D. Outgaerden.*

Caul. lignoſi glaberrimi, *ſpinis* incurvatis rarioribus. *Fol.* alterna petiolata ternata ovata glaberrima nuda.

CAPSICUM (*annuum*) caule herbaceo, pedunculis ſolitariis. *Linn. ſp.* 270. *Fl. zeyl.* 92. *Roy. lugdb.* 426. *n.* 1.
Capſicum ſiliquis longis propendentibus. *Tourn. inſt.* 152. *t.* 66.
Piper indicum vulgatiſſimum. *Bauh. pin* 102.

H Pi-

Piper hiſpanicum ſiliquoſum rotundis ſiliquis. *D. Pryon.*
Capo-molago. *Rheed. mal.* 2. *p.* 109. *t.* 56.
Habitat in utraque India.

CAPSICUM (*fruteſcens*) caule fruticoſo, pedunculis geminis. *Linn. ſp.* 271.
Capſicum fruteſcens. *Linn. H. cliff.* 59.
Capſicum indicum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 247. *t.* 88. *f.* 1. 3. 4. *Burm. zeyl.* 53.
Vallia-capo-molago. *Rheed. mal.* 9. *p.* 65. *t.* 35.
Habitat in Indiis.

STRYCHNOS (*nux vomica*) foliis ovatis, caule inermi. *Linn. ſp.* 271. *Fl. zeyl.* 91.
Strychnos foliis quinque nerviis. *Wacch. ultr.* 32.
Solanum arboreum indicum maximum, foliis oenopliæ ſeu Napeæ majoris, fructu rotundo duro rubro, ſemine orbiculari compreſſo maximo. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 97.
Nux vomica officinarum. *Bauh. pin.* 511. *Raj. hiſt.* 1814. *Burm. zeyl.* 171.
Colubrini ligni tertii genus in malabar. *Bauh. pin.* 301.
Caniram. *Rheed. mal.* 1. *p.* 67. *t.* 37.
Habitat in India.

STRYCHNOS (*colubrina*) foliis ovatis acutis, cirrhis ſimplicibus. *Ln. ſp.* 271.
Strychnos foliis trinerviis ovatis binatis. *Wacch. ultr.* 32.
Clematis indica ſpinoſa, foliis luteis. *Bauh. pin.* 301.
Fructus orbicularis major fuſcus ſtriatus. *Bauh. pin.* 405.
Solanum arboreſcens indicum, foliis Napeæ majoribus magis mucronatis, fructu rotundo duro. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 98.
Modira-caniram. *Rheed. mal.* 8. *p.* 47. *t.* 24. *Raj. hiſt.* 1661.
Habitat in India.

CHIRONIA (*trinervia*) herbacea, calycinis foliolis membranaceo-carinatis. *Linn. ſp.* 272. *Fl. zeyl.* 90.
Lyſimachia folio ſinuato acuminato trinervio, flore cæruleo amplo, calyce carinato alato. *Burm. zeyl.* 145. *t.* 67.
Gentiana juncea, floribus cæruleis amplis, ghinitilla cingalenſibus. *Herm. herb.*
Habitat in Zeylona.

Radix hujus parva fibroſa, & tota cum planta amariſſima. *Herm. herb.*

CORDIA (*Myxa*) foliis ovatis tomentoſis, corymbis lateralibus, calycibus decemſtriatis. *Linn. ſp.* 273.

Se-

Sebeſtena domeſtica ſive Myxa. *Commel. H. amſt.* 1. *p.* 139. *t.* 72.
Prunus ſebeſtena, longiore folio, maderaſpatana. *Plukn. alm.* 306. *t.* 217. *f.* 3.
Sebeſtena ſylveſtris & domeſtica. *Bauh. pin.* 446. *Alp. ægypt.* 30.
Vidi-maram. *Rheed. mal.* 4. *p.* 77. *t.* 37.
Arbor Caſedel Javanis, ſub quo nomine ex Java.
Habitat in Java & Malabaria.

CORDIA (*ſebeſtena*) foliis oblongo-ovatis repandis ſcabris. *Linn. ſp.* 247. ubi deſcr.
Cordia nucis juglandis folio. *Plum. ic.* 105. *gen.* 13.
Sebeſtena ſcabra, flore miniato criſpo. *Dill. elth.* 341. *t.* 255. *f.* 331.
Caryophyllus ſpurius inodorus, folio ſubrotundo ſcabro, flore racemoſo hexapetaloideo coccineo. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 20. *t.* 164. *Catesb. rar.* 2. *p.* 91. *t.* 91. *Raj. ſuppl.* 86.
Novella nigra. *Rumph. amb.* 2. *p.* 226. *t.* 75.
Habitat in utraque India.

EHRETIA (*Bourreria*) foliis ovatis integerrimis lævibus, floribus ſubcorymboſis, calycibus glabris. *Linn. ſp.* 275. ubi deſcr.
Bourreria arborea, foliis ovatis alternis, racemis rarioribus terminalibus. *Brown. jam.* 168. *t.* 15. *f.* 2.
Meſpilus americana laurifolia glabra, fructu rubro mucaginoſo. *Comm. H. amſt.* 1. *p.* 153. *t.* 79.
Pittoniæ ſimilis laureolæ foliis, floribus albis, baccis rubris. *Catesb. car.* 2. *p.* 79. *t.* 79.
Jaſminum periclymeni folio, flore albo, fructu flavo rotundo tetrapyreno. *Sloan. hiſt.* 2. *p.* 96. *t.* 204. *f.* 1. *Raj. dendr.* 63.
Habitat in India utraque.

LYCIUM (*barbarum*) foliis lanceolatis craſſiuſculis, calycibus bifidis. *Linn. ſp.* 277. ubi deſcr.
Jaſminoides aculeatum humile, halimi minoris folio, fructu per maturitatem flaveſcente. *Mich. gen.* 224. *t.* 105. *f.* 1.
Jaſminoides ſinenſe halimi folio longiore & anguſtiore. *Duham. arb.* 1. *p.* 306. *t.* 121. *f.* 4.
Habitat in Java & China.

SIDEROXYLON (*ſpinoſum*) ſpinoſum, foliis perennantibus. *Linn. ſp.* 279.
Lycii ſimilis frutex indicus. *Comm. H. amſt.* 1. *p.* 161. *t.* 83.
Lycium maderaſpatanum, bijugis & gracilioribus ſpinis horridum. *Plukn. alm.* 235. *t.* 202. *f.* 2.

Ebenus jamaicenſis arbuſcula, Buxi foliis, ſpinoſa. *Plukn. alm.* 132. *t.* 89. *f.* 1.
Couro-moelli. *Rheed. mal.* 5. *p.* 77. *t.* 39.
Habitat in utraque India.

RHAMNUS (*lineatus*) inermis, floribus hermaphroditis, foliis ovatis lineatis repandis ſubtus reticulatis. *Linn. ſp.* 281.
Rhamnus lineata. *Osbek. it.* 219. *t.* 7.
Habitat in Zeylona & China.

RHAMNUS (*myrtinus*) inermis, foliis oblongo-ovatis integerrimis ſubtus lucidis.
Nierpoula incolis.
Habitat Coromandeli.

RHAMNUS (*Napæa*) aculeis ſubgeminatis recurvis, pedunculis corymboſis, floribus ſemidigynis, foliis ſerratis utrimque lævibus. *Linn. ſp.* 282. *Fl. zeyl.* 87.
Jujuba indica ſpinoſa, folio & fructu longiore. *Plukn. alm.* 199. *t.* 216. *f.* 6. *Burm. zeyl.* 132.
Prunus zeylanica ſpinoſa, folio longiore. *Herm. par. bat.* 367.
Vidara littorea. *Rumph. amb.* 2. *p.* 119. *t.* 37.
Mallam-taddali. *Rheed. mal.* 4. *p.* 83. *t.* 40.
Habitat in Zeylona & Amboina.

RHAMNUS (*Jujuba*) aculeis ſolitariis recurvis, pedunculis aggregatis, floribus ſemidigynis, foliis retuſis ſubtus tomentoſis. *Linn. ſp.* 282. *Fl. zeyl.* 89.
Jujuba indica ſpinoſa, folio & fructu rotundo. *Plukn. alm.* 199. *Burm. zeyl.* 132.
Jujuba malabarenſis. *Garzin. herb.*
Prunus zeylanica ſpinoſa, foliis & fructibus rotundis. *Herm. lugdb. app.* 69. *zeyl.* 12.
Malus indica. *Rumph. amb.* 2. *p.* 117. *t.* 36.
Perim-toddali. *Rheed. mal.* 4. *p.* 85. *t.* 41.
Habitat in variis Indiæ locis.

RHAMNUS (*oenoplia*) aculeis ſolitariis recurvis, pedunculis aggregatis ſubſeſſilibus, foliis ſemicordatis ſubtus tomentoſis. *Linn. ſp.* 282. *Fl. zeyl.* 88.
Jujuba aculeata, nervoſis foliis infra ſericeis flavis. *Burm. zeyl.* 131. *t.* 61.
Ju-

Jujuba indica ſpinoſa, foliis majoribus ſubtus lanuginoſis & incanis. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 74.
Daun calidabat. Javanis.
Habitat in Zeylona.

RHAMNUS (*nummularia*) aculeis ſolitariis geminiſque recurvis, pedunculis corymboſis, foliis ovatis integerrimis.
Rhamnus perſica. *herb. Garzin.*
Jujuba ſeu zizyphus zeylanica rotundifolia minor, crenatis foliis ſubtus lanuginoſis. *Plukn. alm.* 199. *t.* 197. *f.* 2. *Burm. zeyl.* 132.
Jujuba aculeata, foliis parvis nervoſis lanuginoſis, floribus luteis minimis in minutiſſimum faſciculum congeſtis. Doery-geretan. Javanis. *D. Pryon.*
Prunus zeylanica ſpinoſa, folio rotundiore minore. *H. Beaum.* 35. *Herm. prodr.* 367.
Habitat in Zeylona & Java.

RHAMNUS (*vitis idæa*) ſpinulis ſimplicibus, pedunculis ſolitariis unifloris, foliis ovatis acuminatis integerrimis.
Rhamnus zeylanica, folio ſubrotundo glabro, caulibus hirſutis, ſpinis exiguis, ad foliorum ortum exaſperatis, floſculo ſpadiceo, bacca nigra. *Burm. zeyl.* 198. *t.* 88.
Acaciæ forte cognatus e maderaſpatan, frutex vitis idææ bengalenſis foliis & ramulis alternis, ad foliorum ortum ſpinis exiguis exaſperatus. *Plukn. phyt.* 4. *t.* 122. *f.* 4.
Frutex indicus baccifer, vitis ideæ ſecundæ Cluſii foliis. *Breyn. cent.* 8. *t.* 4.
Boa maſſi Javanis.
Habitat in Zeylona & Java.

RHAMNUS (*heterogeneus*) aculeis geminis, ſimplici & recurvo, pedunculis ſolitariis unifloris, foliis ovatis ſerrulatis trinerviis lucidis.
Jujubæ ſimilis arbor orientalis, inæqualibus ſpinis aureis conjugatis, ex cortice candidiſſimo prorumpentibus, armata. *Plukn. alm.* 198. *t.* 312. *f.* 4.
Jujuba perſica. *herb. Garzin.*
Habitat in India orientali & Perſia.

Rami albiſſimi glaberrimi, *foliis* ovatis acuminatis ſerratis; *aculeorum* altero recurvato, altero erectiuſculo, videturque quoad deſcriptionem convenire cum Rhamno Loto, niſi in figura Schavii folia adeo obtuſa & aculei ſimplices. Plures inſuper ex Indiis afferuntur Rhamni ſpecies, quæ foliatura maxime diſtincta, ob defectum tamen fructificationis determinari nequeunt.

CEANOTHUS (*aſiaticus*) foliis ovatis enerviis. *Linn. ſp.* 284. *Fl. zeyl.* 98.
Groſſularia ſpinis vidua, baccis in racemo congeſtis ſpadiceis, foliis crenatis ovato-acuminatis. *Burm. zeyl.* 111. *t.* 48.
Groſſularia zeylanica, baccis majoribus nigris. *Herm. muſ. zeyl.* 11. & 26.
Spirææ Theophraſti ſimilis frutex indicus latiore folio. *Plukn. alm.* 350. *t.* 63. *f.* 2.
Tinda-parva. *Rheed. mal.* 1. *p.* 87. *t.* 48.
Habitat in India.

MANGIFERA (*indica*). *Linn. ſp.* 290. arbor. *Linn. Fl. zeyl.* 471. *Bont. jav.* 95. *Burm. zeyl.* 152.
Manga domeſtica. *Rumph. amb.* 1. *p.* 93. *t.* 25.
Manga indica, fructu magno reniformi. *Raj. hiſt.* 1550. *Boym. fl. ſinenſ. H. f. H.*
Perſicæ ſimilis, putamine villoſo. *Bauh. pin.* 440.
Mao ſ. Mau. *Rheed. mal.* 4. *p.* 1. *t.* 1. & 2.
Habitat in India.

Tab. 23. EMBELIA (*Ribes*).
Ribeſioides. *Linn. fl. zeyl.* 403. ubi deſcr.
Groſſularia zeylanica major Ghæſembilla zeylanenſibus. *Burm. zeyl.* 112.
Groſſularia baccis albis, pediculis floriferis in ſummo caule, & ex alis foliorum exeuntibus. *Raj. dendr.* 3. *p.* 27.
Ghæſæmbilla. *Herm. zeyl.* 36. Æmbilla cingalenſium 11. ſive Groſſularia indica major, ex cujus fructibus Rob de Ribes conficitur, viribus Europæo æquale. *Herm. herbar.*
Habitat in Zeylona.

Planta noſtra glaberrima, nec ſpinoſa, uti *Æmbilla* Rhamnicaſtrum. *Fl. zeyl. no.* 410. deſcribitur.

VITIS (*vinifera*) foliis lobatis ſinuatis nudis. *Linn. ſp.* 293.
Vitis vinifera. *Bauh. pin.* 299.
In temperatioribus Indiæ locis quoque invenitur.

VITIS (*indica*) foliis cordatis dentatis, ſubtus villoſis, cirrhis racemiferis. *Linn. ſp.* 293. *Fl. zeyl.* 99.
Vitis ſylveſtris indica, acinis rotundis, folio integro. *Raj. dendr.* 67.
Vitis folio cucurbitæ ſive non ſinuato. *Burm. zeyl.* 230.
Scembra valli. *Rheed. mal.* 7. *p.* 11. *t.* 6.
Habitat in India.

VI-



EMBELIA *ribes*.



1. VITIS *trifolia*.
2. STAPHYLEA *indica*.



1. *VITIS* *trifolia*.
2. *STAPHYLEA* *indica*.

VITIS (*trifolia*) foliis ternatis, foliolis ſubrotundis ſerratis. *Linn. ſp.* 293.
Vitis foliis ternis ſubrotundis ſerratis. *Raj. dendr.* 68.
Folium cauſſonis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 450. *t.* 166. *f.* 2.
Kareta tsjori-valli. *Rheed. mal.* 7. *p.* 85. *t.* 45.
Habitat in India.

β Galing galing malaice, ſub quo nomine ex Java miſſa, proxime huic accedit; forte ad Ciſſos cum citatis figuris pertineret, quorum flores quadrifidi. *Tab.* 24. *f.* 1.

ACHYRANTHES (*ſanguinolenta*) caule erecto ſimpliciſſimo, ſpicis brachiatis lævibus. *Linn. ſp.* 294. ubi deſcr.
Verbena rubra. *Rumph. amb.* 7. *p.* 60. *t.* 27. *f.* 2.
Cendor Javanis.
Habitat in Java & Amboina.

ACHYRANTHES (*muricata*) caule patulo, floribus ſpicatis remotis ovatis, calycibus ſquarroſo-patulis, foliis alternis. *Linn. ſp.* 295. ubi deſcr.
Blitum fruteſcens. *Rumph. amb.* 5. *p.* 235. *t.* 83. *f.* 2.
Habitat in India.

ACHYRANTHES (*indica aſpera*) caule erecto, calycibus reflexis, ſpicæ appreſſis. *Linn. ſp.* 295. *Fl. zeyl.* 105. *Roy. lugdb.* 418.
Amaranthus ſpicatus zeylanicus, foliis obtuſis, Amarantho ſiculo Boccone ſimilis. *Burm. zeyl.* 16. *t.* 5. *f.* 3.
Amaranthus ſpicatus, Dictamni cretici folio, maderaſpatenſis. *Plukn. alm.* 26. *t.* 10. *f.* 4. *Mill. dict. t.* 11. *f.* 2.
Verbena indica ſpicata, foliis obtuſis. *Herm. muſ. zeyl.* 1.
Cadelari. *Rheed. mal.* 10. *p.* 155. *t.* 78.
Habitat in Malabaria & Zeylona.

Ex magnitudine & inæqualitate Foliorum formari plures varietates ab hac ſpecie poſſent.

ACHYRANTHES (*lappacea*) caule patulo, ſpicis interruptis, floſculis ternis; lateralibus utrinque faſciculo ſetarum uncinato. *Linn. ſp.* 295. ubi deſcr.
Achyranthes floribus externe lanatis interrupte ſpicatis. *Linn. fl. zeyl.* 103.
Blitum ſcandens, fructu lappaceo. *Burm. zeyl.* 47. *t.* 18. *f.* 1.
Verbena indica ſarmentoſa ſcandens, ſpica comoſa, fructibus lappaceis. *Herm. muſ. zeyl.* 47.
Centaurium ciliare minus, circææ foliis firmioribus, floribus ſpicatis. *Plukn. alm.* 93. *t.* 82. *f.* 2.
Wellia-codivelli. *Rheed. mal.* 10. *p.* 117. *t.* 59.
Habitat in India.

ACHY-

ACHYRANTHES (*proſtata*) caulibus proſtratis, ſpicis oblongis floſculis binatis, utrimque faſciculo ſetarum uncinato. *Linn. ſp.* 296. ubi deſcr.
Auris canina fœmina. *Rumph. amb.* 6. *p.* 26. *t.* 11.
Verbena indica. *Bont. jav.* 150. *t.* 1 0.
Scheru-cadelari. *Rheed. mal.* 10. *p.* 157. *t.* 79.
Habitat in India.

ACHYRANTHES (*lanata*) caule proſtrato, ſpicis ovatis lateralibus, calycibus tomentoſis. *Linn. ſp.* 296. *Fl. zeyl.* 104. *Mill. dict. t.* 11. *f.* 1.
Chenopodium incanum racemoſum, folio majore minori oppoſito. *Burm. zeyl.* 60. *t.* 26. *f.* 1.
Amaranthus indicus verticillatus albus, foliis lanugine incanis. *Plukn. alm.* 27. *t.* 75. *f.* 8.
Atriplex indica tomentoſa incana, majoranæ venetæ foliis. *Herm. zeyl.* 2.
Scherubala. *Rheed. mal.* 10. *p.* 57. *t.* 29.
Habitat in India.

Binæ hujus occurrunt varietates magnitudine differentes, quarum major *caule* erecto, *ſpicis* erectis ramoſis plurimis Cundang Caſſi & Fo le Kotte Javanis, minor *caule* proſtrato, *ſpicis* ſubſolitariis breviſſimis ſimplicibus, quæ frequens in hortis per ſemina propagatur.

ACHYRANTHES (*corymboſa*) foliis oppoſitis linearibus, paniculis dichotomis. *Linn. ſp.* 296. *Fl. zeyl.* 100.
Paronychia foliis ad genicula confertis acutis, floribus umbellatis. *Burm. zeyl.* 184. *t.* 65. *f.* 2.
Amaranthus folio tenuiſſimo incano mollugini æmulante. *Boccon. muſ.* 44. *t.* 39.
Amaranthus zeylanicus umbellatus, folio laricis, umbella fere candida. *Herm. muſ. zeyl.* 29.
Elichryſo affinis herba indica polygonoides ramoſior, foliis caulinis nodos ambientibus. *Plukn. alm.* 134. *t.* 86. *f.* 6.
Habitat in Zeylona.

CELOSIA (*argentea*) foliis lanceolatis, ſtipulis ſubfalcatis, pedunculis angulatis, ſpicis ſcarioſis. *Linn. ſp.* 296. *Roy. lugdb.* 419. *n.* 2.
Amaranthus indicus anguſtifolius, ſpica rigida alba. *Burm. zeyl.* 18.
Tjera-belluttæ-adeca marij n. *Rheed. mal.* 10. *p.* 77. *t.* 39.
β Celoſia (*margaritacea*) foliis ovatis, pedunculis angulatis, ſpicis ſcarioſis. *Linn. ſp.* 297.
Amaranthus ſimplici panicula. *Bauh. pin.* 121.
Amaranthus ſpica albeſcente habitiore. *Mart. cent.* 7. *t.* 7.
Bellutta adeca-marijen. *Rheed. mal.* 10. *p.* 75. *t.* 38.
Habitant in Java & China.


Var. β differt foliis & ſpicis ovatis ex rubro albeſcentibus majoribus.

CE-



1. CELOSIA *pyramidalis*
2. SARACA *arboreſcens*
3. PROSOPIS *ſpicata*

T. 25.



CELOSIA (*criſtata*) foliis lanceolatis ovatis recurvis ſubundatis, pedunculis angulatis, ſpicis oblongis criſtatis. *Linn. ſp.* 297.
Amaranthus major, paniculis ſurrectis flaveſcentibus. *Herm. lugdb.* 30.
Amaranthus panicula conglomerata. *Bauh. pin.* 121.
Amaranthus criſtatus. *D. Pryon.*
Habitat in India.

CELOSIA (*caſtrenſis*) foliis lanceolato-ovatis lineatis acuminatiſſimis, ſtipulis falcatis, ſpicis criſtatis. *Linn. ſp.* 297.
Amaranthus vulgaris. *Rumph. amb.* 5. *p.* 236. *t.* 84.
Amaranthus minor, ſpica ſingulari, lunatis circum caulem foliis. *Barr. rar.* 471. *t.* 1195. *Bocc. muſ.* 2. *p.* 77. *t.* 66.
Amaranthus criſtatus, Folla galo incolis dictus. *D. Pryon.*
Habitat in Indiis.

CELOSIA (*coccinea*) foliis ovatis ſtrictis inauriculatis, caule ſulcato, ſpicis multiplicibus criſtatis. *Linn. ſp.* 297.
Amaranthus panicula ſpecioſa criſtata. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 969.
Amaranthus panicula incurva. *Bauh. pin.* 121.
Habitat in India.

Plures hujus varietates depinguntur apud *Weinmann* in Opere Botan. *t.* 84. 85. 92. 96.

CELOSIA (*pyramidalis*) foliis inferioribus lanceolatis undulatis, ſuperioribus linearibus, ſpicis pyramidalibus. *Tab.* 25. *f.* 1.

Ex Java per ſemina allata noſtro in horto ante aliquot annos floruit caule orgyali, quam tunc temporis cum aliis pro tertio tomo H. Amſt. inſculptam hiſce addere placuit.

CELOSIA (*paniculata*) foliis oblongo-ovatis, caule aſſurgente, ſpicis terminalibus alternis remotis. *Linn. ſp.* 298. ubi deſcr.
Blitum album majus ſcandens. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 142. *t.* 91. *f.* 2.
Celoſia major ſarmentoſa aſſurgens, foliis majoribus ovatis. *Brown. jam.* 179.
Creſcit in utraque India.

Planta javanica melius refert Amaranthum fruticoſum erectum. *Sloan. t.* 91. *f.* 1. videturque *f.* 2. Rivina octandra juxta *Plum.* iconem.

CELOSIA (*lanata*) foliis lanceolatis tomentoſis obtuſis, ſpicis confertis, ſtaminibus lanatis. *Linn. ſp.* 298. *Fl. zeyl.* 102.
Amaranthi ſpecies, folio halimi maritimi noſtratis. *Burm. zeyl.* 18.
Habitat in Zeylona.

CELOSIA (*nodiflora*) foliis cuneiformibus acutiuſculis, ſpicis globoſis lateralibus. *Linn. ſp.* 298. *Fl. zeyl.* 101.
Amaranthoides indicum nodiflorum, capitulis ex albo vireſcentibus. *Burm. zeyl.* 16. *t.* 5. *f.* 2.
Amaranthoides indicum globoſum, ad caulium nodos floridum, foliis ſolitariis ſummo apice barbatis. *Plukn. alm.* 72. *t.* 133. *f.* 2.
Amaranthus indicus, flore globoſo herbaceo. *Herm. muſ. zeyl.* 33.
Habitat in Zeylona.

ILLECEBRUM (*verticillatum*) floribus verticillatis nudis, caulibus procumbentibus. *Linn. ſp.* 298. *Roy. lugdb.* 214. *n.* 1.
Paronychia ſerpyllifolia paluſtris. *Vaill. paris.* 157. *t.* 15. *f.* 1.
Polygala repens nivea. *Bauh. pin.* 215.
Tranſmiſſa ex Java.

ILLECEBRUM (*Achyranthes*) caulibus repentibus piloſis, foliis ovatis mucronatis, oppoſito minore, capitulis ſubgloboſis ſubſpinoſis. *Linn. ſp.* 299.
Achyranthes repens. *Linn. ſp.* 1. *p.* 205. foliis bliti pallidi. *Dill. elth.* 8. *t.* 7. *f.* 7.
Blitum anguſtifolium, malaice Pannone. *D. Pryon.*
Habitat in Indiis & Turcomannia.

ILLECEBRUM (*ſeſſile*) caulibus repentibus glabris, foliis lanceolatis ſubſeſſilibus, capitulis oblongis glabris. *Linn. ſp.* 300.
Gomphræna ſeſſilis. *Linn. fl. zeyl.* 116.
Amaranthus humilis, foliis oppoſitis, floſculis ex alis glomeratis. *Burm. zeyl.* 17. *t.* 4. *f.* 2.
Polygonum indicum minus, floſculis glomeratis albis. *Herm. muſ. zeyl.* 14.
Amaranthoides maderaſpatana, foliis anguſtis ex adverſo binis, floribus ad nodos verticillatis. *Plukn. phyt.* 27. *t.* 132. *f.* 6. & *t.* 133. *f.* 1.
Coluppa. *Rheed. mal.* 10. *p.* 21. *t.* 11.
Habitat in India.

Mire variat. *caule* erectiuſculo, magnitudine foliorum & totius plantæ, *foliis* ovatis, lanceolatis, oblongis, ellipticis, ſeſſilibus, petiolatis. *Capitulis* ſolitariis & compoſitis, uti in multis ſpeciminibus ex Java receptis apparet.

CERBERA (*Manghas*) foliis lanceolatis, nervis transverſalibus. *Linn. ſp.* 303. ubi deſcr. *Fl. zeyl.* 106.
Manghas lacteſcens, foliis Nerii craſſis venoſis, Jaſmini flore, fructu Perſici ſimili venenato. *Burm. zeyl.* 150. *t.* 70. *f.* 1.
Manghas ſylveſtris lacteſcens, fructu venenato. *Herm. muſ. zeyl.* 49.
Manghas ſylveſtris lacteſcens venenata, Jaſmini flore & odore. *Herm. prod.* 351. *Plukn. alm.* 241.

Ar-

Arbor lactaria. *Rumph. amb.* 2. *p.* 243. *t.* 81.
Odollam. *Rheed. mal.* 1. *p.* 71. *t.* 39.
Mangas cuini Javanis.
Habitat in India.

VINCA (*roſea*) caule ſuffruteſcente erecto, floribus geminis ſeſſilibus, foliis oblongis, petiolis baſi bidentatis. *Linn. ſp.* 305. ubi deſcr.
Vinca foliis oblongo-ovatis integerrimis, tubo floris longiſſimo, caule ramoſo fruticoſo. *Mill. dict. t.* 186.
Frutex japonicus, flore pallide purpuraſcente. *D. Kleinhof.*
Folla mallega Javanis.
Habitat in Java & Japona.

GARDENIA (*florida*). *Linn. ſp.* 303. ubi notam vide. *Ellis. act. angl. vol.* 51. *p.* 392. *t.* 23.
Jaſminum foliis lanceolatis oppoſitis integerrimis, calycibus acutioribus. *Mill. ic. t.* 180.
Cotsjopiri. *Rumph. amb.* 7. *p.* 26. *t.* 14. *f.* 2.
Habitat in India & cap. Bonæ Spei.

NERIUM (*oleander*) foliis lineari-lanceolatis ternis. *Linn. ſp.* 308. *Fl. zeyl.* 108. *Roy. lugdb.* 412
Nerium floribus rubeſcentibus. *Baub. pin.* 464.
Nerium anguſtifolium indicum, flore rubro odorato ſimplici. *Herm. muſ. zeyl.* 34. *lugdb.* 447. *t.* 448.
Nerium anguſtifolium, flore rubente odorato roſeo. *Burm. zeyl.* 166. & zeylanicum 167.
Belutta aureli. *Rheed. mal.* 9. *p.* 3. *t.* 2. & 1.
Sidawaya Javanis.
Habitat in tota India.

Frequens in hortis: luxuriat floribus plenis, foliis latioribus.
β Arbor Japonenſis Thymelææ facie, ſidawava incolis dicta. *D. Kleinhof* quæ differt foliis linearibus confertis lucidis.

NERIUM (*divaricatum*) foliis lanceolato-ovatis, ramis divaricatis. *Linn. ſp.* 306. *Fl. zeyl.* 109.
Apocynum zeylanicum indicum fruteſcens, Nerii flore candidiſſimo. *Herm. par.* 40. *zeyl.* 47.
Apocynum indicum ſylveſtre inodorum ſiliquoſum, ſeminibus pappoſis, floribus albis amplis. *Burm. zeyl. p.* 25.
Habitat in Zeylona.

NERIUM (*antidyſentericum*) foliis ovatis acuminatis petiolatis. *Linn. ſp.* 306. *Fl. zeyl.* 107.
Nerium indicum, ſiliquis anguſtis erectis longis geminis. *Burm. zeyl.* 167. *t.* 77.
Apocynum erectum malabaricum fruteſcens, Jaſmini flore candido. *Herm. par.* 44.
Apocynum arboreum laurifolium, ſiliquis Nerii maderaſpatenſis. *Plukn. alm.* 35.
Codaga-pala. *Rheed. mal.* 1. *p.* 85. *t.* 47.
Habitat in India.

NERIUM (*zeylanicum*) foliis lanceolatis oppoſitis, ramis rectis. *Linn. ſp.* 306.
Apocynum arboreſcens, Nerii flore, minus. *Burm. zeyl.* 23. *t.* 12. *f.* 2.
Nerium lacteſcens, Myrti laureæ folio rugoſo, zeylanicum. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 86.
Habitat in Zeylona.

PLUMIERIA (*obtuſa*) foliis lanceolatis petiolatis obtuſis. *Linn. ſp.* 307.
Plumieria flore niveo, foliis brevioribus obtuſis. *Catesb. car.* 2. *p.* 93. *t.* 93. *Plum. ic.* 232.
Flos convolutus. *Rumph. amb.* 4. *p.* 85. *t.* 38.
Habitat in Amboina & America.

Tab. 26. ECHITES (*caudata*) pedunculis dichotomis, floribus filamentoſis, foliis ovato-oblongis acuminatis, caule volubili.
Frutex volubilis, flagellis ſeſe figens aliis rebus, comonga ſeu mangoenong incolis dicta. *D. Kleinhof.*
Habitat in Javæ locis altioribus.

Caul. volubilis ſtriatus. *Fol* ſubpetiolata ovato-oblonga integerrima acuminata glaberrima. *Pedunc.* in noſtro ſpecimine axillares dichotomi. *Cal.* parvus ſegmentis quinque acuminatis, coſta productiore. *Cor.* tubus brevis, limbus ventricoſus, apice filamentis quinque corolla longioribus. *Stam.* quinque. *Stylus* unicus.

ECHITES (*trifida*) pedunculis trifidis multifloris, foliis ovato-oblongis acuminatis. *Linn. ſp.* 308. *Jacq. amer.* 13. *t.* 24.
Katje piring. Javanis.
Habitat in Indiis.

Tab. 27. *f.* 1. ECHITES (*adglutinata*) pedunculis racemoſis, foliis ovatis emarginatis cum acumine. *Jacq. amer.* 31. *t.* 23.
Habitat in Indiis.

Varietatem hujus delineari curavi pedunculis oppoſitis axillaribus, foliis ovalibus integerrimis.

ECHI-

26

T. xii.



ECHITES *caudata*.



ECHITES *caudata*.



1. ECHITES *adglutinata*.
2. ASCLEPIAS *cordata*.



1. ECHITES agglutinata.
2. ASCLEPIAS cordata.



1. ECHITES *nummularia*.
2. QUISQUALIS *glabra*.

ECHITES (*ſpinoſa*) caule erecto ſpinoſo, foliis ovatis obtuſis, pedunculis umbellatis.

Lycium malabaricum, ſubrotundis Pyrolæ denſioribus foliis, floribus Jasmini, aculeis rectis validiſſimis ex adverſo binis armatum. *Plukn. phyt.* 235. *t.* 305. *f.* 4.

Carandas. *Rumph. amb.* 7. *p.* 57. *t.* 25.

Frutex ſpinoſus viginti pedes altus & ramoſus, fructus gerens inſtar ceraſi, qui adhibetur in hortis ad ſepes. *D. Kleinhof.*

Habitat in India.

Deficiunt ſæpe ſpinæ in ramis tenerioribus, ut ex ſpeciminibus miſſis apparet, quæ in aliis ad ramulorum divaricationes oppoſitæ ſunt.

ECHITES (*nummularia*) foliis cordatis acuminatis, pedunculis bifloris. *Tab.* 28. *f.* 1.

Apocynum indicum minus nummulariæ foliis. *Breyn. ephem. germ. an.* 4. & 5. *p.* 136. *obſ.* 138. *t.* 138. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 611. *ſ.* 15. *t.* 3. *f.* 62.

Apocynum nummulariæ foliis. *Garzin. herb.*

β Apocynum ſcandens americanum nummulariæ foliis. *Plukn. phyt.* 37. *t.* 137. *f.* 4.

Habitat in India.

Caul. erectiuſculus lignoſus. *Pedunc.* axillares in medio bifidi, biflori, quibus differre videtur a citatis figuris.

TABERNÆMONTANA (*citrifolia*) foliis oppoſitis ovatis, floribus lateralibus glomerato-umbellatis. *Linn. ſp.* 308.

Tabernæmontana citri foliis undulatis. *Plum. ic.* 246. *f.* 248.

Codaga-pala. *Rheed. mal.* 1. *p.* 85. *t.* 47.

Apocynum malabaricum arboreſcens, foliis quinis in orbem congeſtis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 534.

Habitat in utraque India.

TABERNÆMONTANA (*alternifolia*) foliis alternis, caule arboreſcente. *Linn. ſp.* 308.

Nerium lacteſcens malabaricum maximum pentaphyllum polyanthemum, flore minimo racemoſo odorato viridi-albicante, ſiliquis propendentibus longiſſimis. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 86.

Lignum ſcholare. *Rumph. amb.* 2. *p.* 246. *t.* 82.

Curutu-pala. *Rheed. mal.* 1. *p.* 83. *t.* 46.

Habitat in Malabaria & Amboina.

CEROPEGIA (*candelabrum*) umbellis pendulis, floribus erectis. *Linn. ſp.* 309.

Apocynum indicum ſcandens, floribus multis, in communis pediculi ſummitate coronæ forma diſpoſitis, reflexis, ſiliquis longis anguſtis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 545.

Niota-nioden-valli. *Rheed. mal.* 9. *p.* 27. *t.* 16.

Habitat in Malabara.

CEROPEGIA (*biflora*) pedunculis bifloris. *Linn. ſp.* 309. *Fl. zeyl.* 110. ubi deſcr.
Habitat in Zeylona.

D I G Y N I A.

PERIPLOCA (*indica*) ſpicis imbricatis. *Linn. ſp.* 309. foliis ovatis acutis glabris. *Linn. Fl. zeyl.* 113.
Apocynum caule volubili perenni. *Roy. lugdb.* 412. *n.* 5.
Periploca foliis anguſtis acutis glabris. *Burm. zeyl.* 187. *t.* 83. *f.* 1.
Apocyni genus ſcandens ex India orientali. *Plukn. mant.* 17. *t.* 359. *f.* 2.
Habitat in Zeylona.

PERIPLOCA (*tenuifolia*) foliis lineari-lanceolatis. *Linn. ſp.* 310.
Periploca malabarica, folio anguſtiſſimo. *Petiv. herbar.*
Cynanchum radice glanduloſa, foliis anguſtis ſinuatis, floribus urceolatis miniatis. *Burm. afr* 36. *t.* 15. & 16. *f.* 1.
Apocynum fruteſcens ſtrictiſſimis rigidis & prælongis foliis, bullatis floribus. *Plukn. mant.* 17. *t.* 335. *f.* 5.
Naru-nindi. *Rheed. mal.* 10. *p.* 67. *t.* 34. cujus folia longiora & acutiora.
Habitat in Indiis & ad C. B. Spei.

Inter plures indicas hanc cum Parente communicavit *D. Ruyſch* ex *Herbar. Petiv.*

PERIPLOCA (*dubia*) caule volubili, foliis ovatis acuminatis venoſis glabris.
Pæpe-ſajor. Javanis. *D. Kleinhof.*
Katu-pal-valli. *Rheed. mal.* 9. *p.* 15. *t.* 11.
Habitat in Java & Malabara.

CYNANCHUM (*indicum*) caule volubili herbaceo, foliis ovatis acuminatis, pedunculis axillaribus umbellatis.
Aſclepias javanica & zeylanica. *Garzin. herb.*
Narin-talie. Javanis. *D. Outgaerden* e Coromandel.

CYNANCHUM (*erectum*) caule erecto divaricato, foliis cordatis glabris. *Linn. ſp.* 311.
Apocynum ſcandens, ſcammoneæ monſpeliacæ foliis, curaſſavicum. *Plukn. phyt.* 37. *t.* 137. *f.* 2.
Apocynum 1 latifolium. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 124. *f.* 124.
Convolvulus lacteſcens ſine tenaculis. Outamanie incolis. *D. Outgaerden.*
Habitat quoque in Indiis.

APO-

APOCYNUM (*fruteſcens*) caule erecto fruteſcente, foliis lanceolatis ovalibus, corollis acutis, fauce villoſis. *Linn ſp.* 312. *Roy. lugdb.* 412. *n.* 3.
Apocynum floribus faſciculatis. *Burm. zeyl.* 23. *t.* 12. *f.* 1.
Apocynum zeylanicum fruticoſum mite. *Herm. muſ. zeyl.* 71.
Habitat in Zeylona.

APOCYNUM (*reticulatum*) caule volubili perenni, foliis ovatis venoſis. *Linn. ſp.* 312. *Roy. lugdb.* 412. *n.* 4.
Aſclepias javanica latifolia. *Garzin. herb.*
Habitat in India.

APOCYNUM (*vincæfolium*) caule erectiuſculo perenni, foliis ovatis oblongis, pedunculis bifloris lateralibus.
Aſclepias javanica anguſtifolia. *Garzin. herb.*
Apocynum erectum virginianum ramoſum, caule ſubrubente, eſulæ raræ foliis, ſiliquis tenuiſſimis. *Plukn. alm.* 35. *t.* 260. *f.* 14. ſiliquis binis Nerii. *f.* 3.

Caul. volubiles lignoſi rubri. *Fol.* ovato-oblonga pollicaria glabra ſubtus ferruginea obtuſa cum acumine. *Pedunc.* ex ramis ſolitarii biflori. *Pericarp.* lineare oblongum univalve unibiculare.

APOCYNUM (*fætidum*) caule volubili perenni, foliis ovato-lanceolatis, pedunculis axillaribus racemoſis.
Convolvulus fætidus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 436. *t.* 160.
Planta flagelloſa, foliis fætidis, Coentat Daun, ob ſingularem foliorum fætorem incolis dicta. *D. Kleinhof.*
Habitat in India.

Differunt ſpecimina javanica a figura *Rumphii* foliis latioribus ovatis, pedunculis duplo longioribus racemoſis multifloris.

ASCLEPIAS (*gigantea*) foliis amplexicaulibus oblongo ovalibus. *Linn. ſp.* 312. *Fl. zeyl.* 312
Apocynum erectum majus latifolium indicum. *Plukn. alm.* 35. *t.* 175. *f.* 3.
Apocynum indicum maximum, floribus amplis janthinis obſoletis. *Burm. zeyl.* 24.
Apocynum erectum majus latifolium indicum, flore concavo amplo carneo. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 43.
Beidel oſſar. *Alp. ægypt.* 85. *t.* 86.
Ericu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 53. *t.* 31. *ſeb. theſ.* 1. *p.* 41. *t.* 26. *f.* 1.
Pingar-utan Javanis.
Habitat in India & Ægypto.

AS-

ASCLEPIAS (*lactifera*) foliis ovatis, caule erecto, umbellis proliferis breviſſimis. *Linn. ſp.* 314.
Aſclepias caule erecto ſimplici herbaceo, foliis ovatis acuminatis, corymbis compoſitis, longitudine petiolorum. *Linn. Fl. zeyl.* 111.
Apocynum indicum aſclepiadis facie eſculentum. *Burm. zeyl.* 24.
Capuſilan kitsjil Javanis. *D. Kleinhof.*
Habitat in Zeylona & Java.

Tab. 27. f. 2. ASCLEPIAS (*cordata*) foliis cordatis acuminatis, floribus terminalibus.
Malatti Tonquin Javanis. *D. Kleinhof.*
Habitat in Java.
Caul. lignoſi erecti. *Fol.* oppoſita petiolata cordata acuminata. *Pedunc.* terminales multiflori. *Cor.* purpurea.

CHENOPODIUM (*urbicum*) foliis triangularibus ſubdentatis, racemis confertis ſtrictiſſimis cauli approximatis longiſſimis. *Linn. ſp.* 318.
Chenopodium latifolium minus ramoſum, petiolis longiſſimis, ex foliorum alis confertim naſcentibus. *Buxb. hall.* 69. *t.* 1.
Tranſmiſſum ex Java.

CHENOPODIUM (*ſcoparia*) foliis lineari-lanceolatis planis integerrimis. *Linn. ſp.* 321. *Roy. lugdb.* 220. *no.* 11.
Linaria ſcoparia. *Bauh. pin.* 212.
Habitat in Græcia, Japonia, China.

HERNIARIA (*lenticulata*) quæ Polygonum lenticulatum. *Linn. ſp.* 317. caule ſubfruticoſo, foliis alternis ſeſſilibus ovato-lanceolatis piloſis.
Polygonum minus tenuifolium. *Bauh. pin.* 281.
Camphorata fruteſcens, foliis latis & anguſtis. *Buxb. cent.* 1. *p.* 18. *t.* 28. *f.* 2.
Polygonum maritimum longius radicatum noſtras, ſerpylli folio craſſo nitente. *Plukn. alm.* 302. *t.* 53. *f.* 3. *Petiv. herb.* 10. *f.* 6. melius cum ſicco ſpecimine conveniret *f.* 3. *Raj. angl.* 3. *p.* 161.
Abſinthium ſylveſtre, foliis minutiſſimis, Oupialie. *D. Outgaerden.*
Creſcit quoque Coromandeli.

GOMPHRÆNA (*globoſa*) caule erecto, foliis ovato-lanceolatis, capitulis ſolitariis, pedunculis diphyllis. *Linn. ſp.* 326. *Fl. zeyl.* 115. *Roy. lugdb.* 418. *n.* 1.
Amarantho affinis Indiæ orientalis, floribus conglomeratis, ocymaſtri folio. *Breyn. cent.* 109. *t.* 51. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 85. *t.* 45.
Amaranthoides lychnidis folio, capitulis purpureis. *Burm. zeyl.* 15. *Tourn. inſt.* 654. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 99.
Flos globoſus. *Rumph. amb.* 5. *t.* 100. *f.* 2. *p.* 289.
Wadapu. *Rheed. mal.* 10. *p.* 73. *t.* 37. Kampang canting. Javanis.
Habitat in India.
Differt floribus albis, rubris, purpuraſcentibus.

GOM-

GOMPHRÆNA (*hiſpida*) caule erecto, capitulis diphyllis, foliis crenatis. *Linn. ſp.* 326.
Anomala indica nepethæ foliis, ſtæchados arabicæ capitulis, ex ſinu foliorum prodeuntibus. *Plukn. amalth.* 15.
Min-angani. *Rheed. mal.* 9. *p.* 141. *t.* 72.
Habitat in Malabaria.

NAMA (*zeylanica*) caule erecto glabro, foliis linearibus, floribus racemoſis. *Linn. ſp.* 327. *Fl. zeyl.* 117. *t.* 2.
Alſine veronicæ affinis, gratiolæ foliis, maderaſpatana. *Plukn. alm.* 22. *t.* 130. *f.* 2.
Anagallis zeylanica aquatica, foliis longis alternis. *Burm. zeyl.* 19.
Planta ſemine nodoſo. *D. Kleinhof.*
Habitat in India.

STERIS (*aquatica*). *Tab.* 39. *f.* 3.
Atalerrie incolis.
Habitat Coromandeli in locis aquoſis.

Planta herbacea, facie capſici, ramoſiſſima lævis, ramis albicantibus teretibus. *Fol.* alterna petiolata ovali-oblonga lævia integerrima acutiuſcula; *pedunc.* nunc oppoſitifolii nunc axillares, nunc terminales ſubdiviſi aut uniflori. *Cal.* perianth. monophyllum quinquedentatum: laciniis oblongis acutis perſiſtentibus. *Cor.* monopetala rotata quinquepartita patens, calyce paullo longior, cærulea, magnitudine capſici. *Stam.* filam. quinque ſubulata, longitudine calycis, erecta. *Anth.* ſagittatæ. *Piſt. germen* ſubrotundum. *Styli* duo filiformes, longitudine calycis. *Stigmata* obtuſa.

GENTIANA (*verticillata*) corollis quinquefidis infundibuliformibus, floribus verticillatis, caule ſimpliciſſimo.
Centaurium minus, ad alas floridum. *Plum. ſpec.* 3. *ic.* 81. *f.* 2.
Vallaguri. *D. Outgaerden.*

Planta Coromandeli lecta differt a *Plum.* figura magnitudine. *Caul.* ſimpliciſſimus procumbens lignoſus palmaris. *Fol.* lanceolata vaginantia. *Flor* verticillati ſeſſiles in ſingula axilla quinquefidi, ad cujus baſin ſquama nectarii. *Piſt. germ.* unicum. *Capſula* ſemibilocularis.

GENTIANA (*apylla*) corollis quinquefidis hypocrateriformibus, caule aphyllo. *Linn. ſp.* 334. *Jacq. amer. hiſt.* 57. *t.* 60. *f.* 2.
Boenga Tsjakar bebet. Javanis. *D. Kleinhof.*
Habitat in India utraque.

PHYLLIS (*indica*) ſtipulis integerrimis. *Roy. lugdb.* 92. *n.* 2. *Linn. ſp.* 336.
Habitat in India.

HYDROCOTYLE (*aſiatica*) foliis reniformibus æqualiter crenatis. *Linn. ſp.* 338 *Fl. zeyl.* 118 *Roy. lugdb* 94. *n.* 2.
Valerianella zeylanica paluſtris repens Hederæ terreſtris folio. *Herm. par.* 238. *t.* 238.
Hydrocotyle zeylanica, aſari folio. *Tourn. inſt.* 328. *Burm. zeyl.* 122.
Aſarina zeylanica minor. *Herm. prodr.* 315
Ranunculo affinis umbelliferis accedens, folio chelidonii minoris, zeylanica minor. *Plukn. alm.* 314. *t.* 106. *f.* 5.
Cotyledon aquaticum acris indica, pediculo ad marginem folii ſito. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 635.
Pes equinus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 455. *t.* 169. *f.* 1.
Codagam. *Rheed. mal.* 10. *p.* 91. *t.* 46.
Habitat in India.

Varietatem recepimus ſub nomine Theckini javanis, magnitudine triplo minori ab hacce differentem.

HYDROCOTYLE (*chinenſis*) foliis linearibus, umbellis multifloris. *Linn. ſp.* 339.
Habitat in China.

FERULA (*Aſſa fœtida*) foliis alternatim ſinuatis obtuſis. *Linn. ſp.* 356.
Aſſa fœtida diſgunenſis umbellifera, liguſtico affinis. *Kæmpf. amoen.* 535. *t.* 536.
Habitat in Japonia & China.

Tab. 29. SIUM (*Ninſi*) foliis ſerratis pinnatis ramoſis ternatis. *Linn. ſp.* 361.
Siſarum montanum coræenſe, radice non tuberoſa. *Kæmpf amoen.* 817. *t.* 818.
Habitat in Japonia & China.

Inter umbelliferas, quæ pauciſſimæ in Indiis occurrunt, hujus Ninzi pulcherrima invenitur icon, quæ, in Japonia depicta fere eadem ac Kæmpferi figura, ab ampliſſimo viro Botanices cultore peritiſſimo Nicolao Witſenio cum aliis Japonenſibus antea parenti fuit donata, cumque nullibi præſtantiſſimæ & ob eximiam virtutem adeo decantatæ hujus radicis tam accurata proſtet figura, hiſce tabulam ſubjungere cenſui, quam pro alio inedito opere deſtinaverat Parens.

TRIGYNIA.

RHUS (*javanicum*) foliis pinnatis ovatis acuminatis ſerratis ſubtus tomentoſis. *Linn. ſp.* 380.
Habitat in Java & China.

RHUS (*vernix*) foliis pinnatis integerrimis, petiolo integro æquali. *Linn. ſp.* 380. *Roy. lugdb.* 244. *n.* 2.
Toxicodendron foliis alatis, fructu rhomboide. *Dill. elth.* 390. *t.* 292. *f.* 277.
Arbor americana, alatis foliis, ſucco lacteo venenata. *Plukn. alm.* 45. *t.* 145. *f.* 1.
Site ſeu ſitz-dſiu *Kæmph. amoen.* 791. *t.* 792.
Vernix Japan. *D. Kleinhof.*
Habitat in Japonia.

RHUS



1. SIUM *ninsi*.
2. CLAUSENA *excavata*.

C. Sinner Lion sculps.

RHUS (*cominia*) foliis ternatis, foliolis petiolatis ovatis remotiſſime ſerratis ſubtus tomentoſis. *Linn. ſp.* 381.
Baccifera indica trifolia, fructu rotundo monopyreno. *Sloan hiſt. jam.* 2. *p.* 100. *t.* 208. *f.* 1.
Ceraſo adfinis baccifera indica trifolia, fructu rotundo monopyreno, pediculo longo. *Plukn. alm.* 94. *Ray. hiſt.* 1593.
Malago maram. *Rheed. mal.* 5. *p.* 49. *t.* 25.
Habitat in utraque India.

RHUS (*Cobbe*) foliis ternatis, foliolis ovatis acuminatis ſerratis, pedunculis tomentoſis. *Linn. ſp.* 382.
Rhois trifoliatæ frutex ſalwaccenſis, floribus juliformibus. *Petiv. muſ.* 678.
Frutex trifolius ſpicatus, producens baccas nigras. *Burm. zeyl.* 101.
Kobbe. *Linn. Fl. zeyl* 441. *Herm. muſ. zeyl.* 24.
Bajam Lohor Javanis. *D. Pryon.*
Habitat in Zeylona.

SAMBUCUS (*canadenſis*) cymis quinquepartitis, foliis ſub-bipinnatis, caule fruteſcente. *Linn. ſp.* 385.
Belutta tjori-valli. *Rheed. mal.* 7. *p.* 19. *t.* 10.
Cajoe Tola Javanis *D. Kleinhof.*
Habitat in Java & Canada.

Binas ex India recepimus ſtirpes, quæ externa forma cum hoc genere convenire videbantur, attamen ex fructificatione imperfecta rite determinari nequeunt, conveniuntque cum *Rheed. mal* 5. *p.* 5. *t.* 3. quæ ſub nomine *Roſaja* ſive *Sambucus indica* transmittitur, quæ ſub nomine *Canary* ſive *Sambucus indica* affertur, depicta videtur a *Rumph. amb.* 2. *p.* 150. *t.* 47.

STAPHYLEA? (*indica*) foliis bipinnatis, infimis ternatis, ſummis quinis, foliolis oblongis dentatis, cymis tripartitis. *Tab.* 24. *f.* 2.
Frutex baccifer aquoſus malabaricus, floribus umbellatis pentapetalis, fructu nigricante polyſpermo, malaice Cayu ayer lacki lacki, javanice Gigirang. *D. Pryon.*
Habitat in Indiis.

Caul. fruticoſus glaber articulatus, ramis diffuſis. *Fol.* bipinnata, foliolis oblongis acuminatis dentatis. *Fructificatio* lateralis, ubi *caulis* in folium erumpit. *Cyma* tripartita. *Cal. per.* pentaphyllum, foliolis ovatis inæqualibus. *Cor.* petala quinque oblonga, calyce longiora. *Stam.* filam. quinque capillaria, longitudine calycis, ad cujus baſin glandulæ duæ nectariferæ oblongæ protuberantes. *Antheræ* haſtatæ. *Piſt. germen* ſubrotundum. *Styli* tres inferne coaliti. *Stigm.* tria furcata. *Peric. capſula* ſexlocularis, ſulcis 6 longitudinaliter exarata ſuperne globoſa inferne planiuſcula, ſingulo loculo ſemen continens.

CORRIGIOLA (*litoralis?*) caule faſciculis florum terminato. *Linn. ſp.* 388. *Roy. lugdb.* 420.
Thymifolia montana. *D. Kleinhof*, a quo ex Java tranſmiſſa.

PHARNACEUM (*Cerviana*) pedunculis ſubumbellatis lateralibus æquantibus folia linearia. *Linn. ſp.* 388.
Cerviana. *Minuart. monogr.* 1.
Alſine ſaxifraga Indiæ orientalis, foliis circa caulem radiatis, flore herbido & muſcoſo. *Plukn. mant.* 9. *t.* 332. *f.* 11.
Spergula purpurea minima. *Buxb. cent.* 3. *p.* 33. *t.* 62. *f.* 2.
Patpaddagam. *D. Outgaerden* e Coromandel.
Habitat in India.

BASELLA (*rubra*) foliis planis, pedunculis ſimplicibus. *Linn. ſp.* 390.
Baſella. *Rheed. mal.* 7. *p.* 45. *t.* 24. *Linn. Fl. zeyl.* 119. *Burm. zeyl.* 44. ubi vide ſynonyma.
Gandola rubra. *Rumph. amb.* 5. *p.* 417.
Habitat in India.

BASELLA (*alba*) foliis ovatis undatis, pedunculis ſimplicibus, folio longioribus. *Linn. ſp.* 390.
Gandola alba. *Rumph. amb.* 5. *p.* 417. *t.* 154. *f.* 2.
Mirabili peruvianæ affinis tinctoria Betæ folio ſcandens. *Plukn. alm.* 252. *t.* 63. *f.* 1.
Habitat in Amboina, China.

BASELLA (*lucida*) foliis ſubcordatis, pedunculis confertis ramoſis. *Linn. ſp.* 391.
Habitat in India.

Omnes in hortis vulgares, ultimaque inprimis diverſa floribus pluribus circa caulem collectis, diſtinctiſſima a prioribus colore lucido rubro.

Tab. 39. *f.* 4. BASELLA (*japonica*) foliis rhombeo ovatis, pedunculis ſimplicibus ſubdichotomis.
Gundola japonica parvifolia. *D. Kleinhof.*
Habitat in Japonia.

Planta reliquis triplo minor. *Fol.* ut in *Chenopodio vulvaria. Pedunc.* ſemipollicares uniflori, raro dichotomi.

TETRAGYNIA.

EVOLVULUS (*gangeticus*) foliis cordatis obtuſis mucronatis petiolatis villoſis, caule diffuſo, pedunculis unifloris. *Linn. ſp.* 391.
Habitat in India.

EVOL-

T. 30.



1. *EVOLVULUS emarginatus.*
2. ———— *hederaceus.*
3. *POLYGONUM chinense.*



1. EVOLVULUS emarginatus.
2. ——— hederaceus.
3. POLYGONUM chinense.

EVOLVULUS (*emarginatus*) foliis cordatis emarginatis repandis, floribus ſolitariis. *Tab.* 30. *f.* 1.
Paſchaga-utan kitsjil Javanis. *D. Kleinhof.*
Habitat in India.

Caul. repentes radicantes glaberrimi. *Fol* alterna emarginata. *Fl.* axillares uniflori. *Capſ.* glaberrimæ.

EVOLVULUS (*hederaceus*) foliis cordatis repandis, pedunculis ſubtrifloris. *Tab.* 30. *f.* 2.
Convolvulus flore parvo luteo. *D. Pryon.* malaice Rabaſſa.
Habitat in Java

Caul volubiles. *Folia* inferiora cordata acuminata ſuperiora obtuſa. *Ped.* inferiores uniflori ſuperiores triflori. *Peric. capſul.* ſubgloboſæ glaberrimæ.

EVOLVULUS (*alſinoides*) foliis obcordatis obtuſis petiolatis piloſis, caule diffuſo, pedunculis trifloris. *Linn. ſp.* 392. *Fl. zeyl.* 76.
Convolvulus indicus minor Alſines folio, flore rubicundo purpureo. *Raj. hiſt. app.* 37.
Convolvuli minimi ſpecies Biſnagarica hirſuta, Alſines folio. *Plukn alm.* 116. *t.* 9. *f.* 1.
Alſine hirta minor, foliis alternis, floribus ſolitariis. *Burm. zeyl.* 11. *t.* 6. *f.* 1. & *t.* 9. *f.* 1.
Alſine zeylanica repens, auriculæ muris folio, floribus cæruleis, ſiliquis parvis turgidis. *Herm. muſ. zeyl.* 11.
Myoſotis foliis ſubrotundis, herba Indiæ orientalis. *Plukn. ſalm.* 258. *t.* 205 *f.* 7.
Viſtnu-clandi. *Rheed. mal.* 11. *p.* 131. *t.* 64.
Woeſt Naganthi. *D. Outgaerden* e Coromandel, quæ optime convenit cum *Plukn.* figura.
Creſcit in variis Indiæ locis.

EVOLVULUS (*tridentatus*) foliis lineari-cuneiformibus tricuſpidatis, baſi dilatata dentatis, pedunculis unifloris. *Linn. ſp.* 392. *Tab.* 16. *f.* 3.
Convolvulus minimus procumbens, acetoſellæ foliis, barbulis ad imum quaternis; ſummo apice tricuſpidatis. *Plukn. mant.* 117. *t.* 167. *f.* 5.
Convolvulus indicus minor, folio anguſto oblongo ſummitate velut abſciſſa, flore ex albo flaveſcente, *Raj. hiſt* 3. *p.* 374.
Convolvulus zeylanicus tenuifolius gracilis. *Burm. zeyl.* 72.
Sendera-Clandi. *Rheed. mal.* 11. *p.* 133. *t.* 65.
β Convolvulus indicus barbatus minor, foliorum apicibus lunulatis. *Plukn. alm.* 117. *t.* 276. *f.* 5.
Habitat in India.

ARALIA (*chinenſis*) caule petioliſque aculeatis, foliolis inermibus villoſis. *Linn. ſp.* 393. *ubi deſcr.*
Frutex aquoſus mas. *Rumph. amb.* 4. *p.* 102. *t.* 44.
Frutex baccifer malabaricus, floribus umbellatis, fructu nigricante polyſpermo. *Raj. hiſt.* 1635.
Caju Ajer, Lacki Lacki malaice; Gigirang javanis. D. *Pryon.*
β Gangiran murra. D. *Pryon.*
Frutex aquoſus fæmina. *Rumph. amb.* 4. *p.* 103. *t.* 45.
Habitat in Java & China.

Differunt foliis latioribus, fructu majore abſque aculeis, uti aliæ binæ, quæ *Gangiran puti* & *murra* vocantur foliorum inciſuris tantum variare videntur.

ALDROVANDA (*veſiculoſa*) *Linn. ſp.* 402. *Mont. act. Bonon.* 2. *p.* 3. *p.* 404. *t.* 12.
Lenticula paluſtris indica, foliis ſubrotundis binis capillamentis ad imis barbatis. *Plukn. alm.* 211. *t.* 41. *f.* 6.
Habitat in Indiæ & Italiæ paludibus.

DROSERA (*rotundifolia*) ſcapis radicatis, foliis orbiculatis. *Linn. ſp.* 402. *Fl. zeyl.* 120. *Roy. lugdb.* 417.
Ros ſolis foliis circa radicem in orbem diſpoſitis. *Burm. zeyl.* 207. *t.* 94. *f.* 2.
Ros ſolis zeylanica, foliis rotundis in orbem expanſis villoſis. *Herm. muſ. zeyl.* 18.
Ros ſolis folio rotundo. *Bauh. pin.* 357.
Habitat in Aſiæ, Americæ & Europæ locis humidis.

DROSERA (*indica*) caule ramoſo folioſo, foliis linearibus. *Linn. ſp.* 403. *Fl. zeyl.* 121.
Ros ſolis ramoſus, caule folioſo. *Burm. zeyl.* 207. *t.* 94. *f.* 1.
Ros ſolis zeylanicus ramoſus, foliolis roridis pennatis. *Herm. muſ. zeyl.* 63.
Acara-puda. *Rheed. mal.* 10. *p.* 239. *t.* 20.
Habitat in India.

CRASSULA? (*ſcutellaria*) foliis alternis reniformibus concavis obſolete ſerratis, ſerraturis ſpinoſis.
Scuttellaria prima. *Rumph. amb.* 4. *p.* 75. *t.* 30.
Scutellaria foliis cochleariformibus & ad ambitum ſpinulis armatum, abſque flore & fructu. mal. Daun papeda. Daun manca. D. *Pryon.*
Tranſmiſſa ex Java.

BRO-

BROMELIA (*Ananas*) foliis ciliato-ſpinoſis mucronatis, ſpica comoſa. *Linn. ſp.* 408 *Roy. lugdb.* 24. *n.* 1.
Ananas acoſta. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 109. *t.* 57.
Ananaſſa. *Rumph. amb.* 5. *p.* 227. *t.* 81. *Boym. fl. ſinens. G. F. G.*
Ananas aculeatus, fructu ovato, carne albida. *Trew. cent. t.* 2.
Carduus braſiliana, foliis aloes. *Bauh. pin.* 384.
Kapa-tſiakka. *Rheed. mal.* 11. *p.* 1. *t.* 1. 2.
Creſcit in utriſque Indiis.

BROMELIA (*ſylveſtris*) foliis margine dorſoque aculeatis, caule fulcrato ſpinoſo. *Linn. Fl. zeyl.* 131.
Ananas ſylveſtris arboreſcens. *Burm. zeyl.* 20.
Ananas ſylveſtris folio aloes, fructu cupreſſino. *J. Bauh. hiſt.* 3. *p.* 96.
Palmæ adfinis arbor conifera, longiſſimo folio, tribus ordinibus ſpinarum munito. *Plukn. alm.* 277.
Frutex indicus, fructu aggregato conoide, kaida dictus. *Raj. hiſt.* 1442.
Pandanus verus, *Rumph. amb.* 4. *p.* 139. *t.* 74.
Kauda-taddi *Rheed. mal.* 2. *p.* 1. *t.* 1.
Habitat in India.

BURMANNIA (*diſticha*) ſpica gemina. *Linn. ſp.* 411. *Fl. zeyl.* 128. *Roy. lugdb.* 25. *Burm. zeyl.* 50. *t.* 20. *f.* 1.
Ephemerum zeylanicum, foliis gramineis, flore cæruleo. *Hartogh. herb.*
Hyacinthus zeylanicus paludoſus, floſculis trigonis cæruleis, tribus foliolis luteſcentibus ſtellatim in ſummo coronatis. *Herm. mus. zeyl.* 7.
Planta zeylanica aquatica, lato & brevi gramineo folio. *Raj. ſuppl.* 559.
Habitat in zeylona.

TRADESCANTIA. (*malabarica*) erecta lævis, pedunculis ſolitariis longiſſimis. *Linn. ſp.* 412.
Ephemerum tripetalon non repens malabaricum, porraceis foliis, purpuro-cæruleum. *Moris hiſt.* 3. *p.* 606.
Ephemeri ſeu phalangii virginiani ſpecies, floribus ſparſis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 564.
Tali pullu. *Rheed. mal.* 9. *p.* 123. *t.* 63.
Habitat in Malabaria.

PONTEDERIA (*ovata*) foliis ovatis, floribus capitatis. *Linn. ſp.* 412.
Plantaginis aquaticæ foliis, floribus glomeratis. *Plukn. alm.* 299.
Cannæ indicæ foliis, floribus uncorum modo, e ſinubus pediculorum foliorum erupentibus. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 573.
Narukila. *Rheed. mal.* 11. *p.* 67. *t.* 34.
Habitat in malabariæ aquoſis.

PON-

PONTEDERIA (*vaginalis*) foliis ovatis, floribus ſpicatis.
Plantaginis aquaticæ foliis indiana, ſpica ex utriculo caulis erumpente. *Plukn. alm.* 299. *t.* 215. *f.* 4.
Carim-gola. *Rheed. mal.* 11. *p.* 91. *t.* 44.

PONTEDERIA (*cordata*) foliis cordatis, floribus ſpicatis. *Linn. ſpec.* 412. *H. cliff.* 133. *Roy. lugdb.* 37. *Gron. virg.* 37.
Gladiolus lacuſtris virginianus cæruleus ſagittariæ folio. *Pet. gaz.* 2. *t.* 1. *f.* 12.
Sagittariæ ſimilis planta paluſtris virginiana, ſpica florum cærulea. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 618. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* 8.
Plantagini aquaticæ accedens foliorum auriculis amplioribus retuſis, floribus cæruleis Hyacinthi ſpicatis. *Plukn. mant.* 152. *t.* 349. *f.* 11.
Habitat in Indiæ paludibus.

PONTEDERIA (*haſtata*) foliis haſtatis, floribus umbellatis. *Linn. ſp.* 412. *Fl. zeyl.* 129.
Sagittaria zeylanica, foliis ex medio caulis prodeuntibus. *Burm. zeyl.* 208.
Sagittariæ quodammodo ſimilis planta madaraſpatana, floribus medio caule quaſi ex utriculo prodeuntibus. *Plukn. alm.* 326. *t.* 220. *f.* 3. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 618. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* 7.
Hexapetala tricapſularis indica, foliis nervoſis, floribus e ſinu pediculi foliorum juncorum modo erumpentibus. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 661.
Nymphæa ſagittæ foliis. D. *Kleinhof.* quæ cum citatis figuris convenit, planta javanica plures quam viginti profert flores.
Habitat in India.

PANCRATIUM (*zeylanicum*) ſpatha uniflora, petalis reflexis. *Linn. ſp.* 407. *Fl. zeyl.* 126.
Narciſſus zeylanicus, flore albo hexagono odorato. *Herm. lugdb* 693. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 75. *t.* 38. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 179. *f.* 7.
Lilio Narciſſus indicus, flore albo hexagono. *Plukn. alm.* 220. *Burm. zeyl.* 142.
Lilium indicum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 161. *t.* 70. *f.* 2.
Catulli-pola? *Rheed. mal.* 11. *p.* 79. *t.* 40.
Habitat in India.

PANCRATIUM (*amboinenſe*) ſpatha multiflora, foliis ovatis nervoſis petiolatis. *Linn. ſp.* 419.
Narciſſus amboinenſis, folio latiſſimo ſubrotundo. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 77. *t.* 39. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 238. *f.* 17.
Allium amboinenſe, folio rotundo. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 553.
β Pancratium foliis ovatis acuminatis petiolatis, floribus minoribus candidis fragrantibus. *Trew. decur. t.* 28.
Cepa ſylveſtris. *Rumph. amb.* 6. *t.* 70. *f.* 1.
Habitat in Amboina.

CRI-

CRINUM (*latifolium*) foliis ovatis lanceolatis acuminatis ſeſſilibus planis. *Linn. ſp.* 419.
Lilio Narciſſus indicus maximus. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 553.
Sjovanna-poli tali. *Rheed. mal.* 11. *p.* 77. *t.* 39. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 91. *f.* 12.
Habitat in Indiæ locis arenoſis ad ripas aquarum.

CRINUM (*aſiaticum*) foliis carinatis. *Linn. ſp.* 419. *Fl. zeyl.* 127. *Mill. dict. t.* 110.
Lilium zeylanicum bulbiferum & umbelliferum. *Herm. lugdb.* 682. *t.* 683. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 182. *f.* 10.
Lilio Narciſſus maximus zeylanicus, floribus albis umbellatis. *Plukn.* 219. *Burm. zeyl.* 142.
Lilio Narciſſus indicus, malaice Daun-bacon. *D. Pryon.*
Radix toxicaria. *Rumph. amb.* 6. *p.* 155. *t.* 69.
β Belutta pola-taly. *Rheed. mal* 11. *p.* 75. *t.* 38.
Creſcit in variis Indiæ locis ad ripas fluviorum.

Ex *capſulis* trigonis *ſemina* anguloſa, in bulbos excreſcentia, prodeunt, quod in multis africanarum plantarum bulbiferis, *Ixiis*, *Siſyrinchiis*, *Liliis* & *Alliis*, obſervatur.

AMARYLLIS (*ſamienſis*) ſpatha multiflora, corollis revolutis, genitalibus erectis. *Linn. ſp.* 421. *Roy. lugdb.* 36. *n.* 4.
Narciſſus japonicus rutilo flore. *Corn. canad.* 157. *t.* 158. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 23. *f.* 14. *Seb. muſ.* 1. *t.* 17. *f.* 3. *Ehret. ſelect. t.* 9. *f.* 3.
Seki-ſan. *Kæmph. jap.* 872.
Habitat in Japonia & Cap. B. Spei.

AMARYLLIS (*zeylanica*) ſpatha multiflora, corollis campanulatis æqualibus, genitalibus declinatis, ſcapo tereti ancipiti. *Linn. ſp.* 421. *Roy. lugdb.* 36. *n.* 5.
Lilio Narciſſus zeylanicus latifolius, flore niveo, externe linea purpurea ſtriato. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 73. *t.* 37. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 181. *f.* 9. *Burm. zeyl.* 142. *Amman. char. pl.* 485.
Tulipa javana. *Rumph. amb.* 5. *p.* 306. *t.* 105.
Habitat in Zeylona & Amboina.

AMARYLLIS (*orientalis*) ſpatha multiflora, corollis inæqualibus, foliis linguæ formibus. *Linn. ſp.* 422. *Roy. lugdb.* 37. *n.* 9.
Lilio Narciſſus indicus maximus ſphæricus, floribus plurimis rubris liliaceis. *Moris. hiſt.* 2. *p.* 568. *ſ.* 4. *t.* 10. *f.* 35.
Narciſſus indicus orientalis. *Sweert. floril.* 31. *f.* 1.
Brunswighia. *Heiſt. monogr.* ubi icon & deſcr.
Habitat in India.

ALLIUM (*magicum*) caule planifolio umbellifero, ramulo bulbifero, ſtaminibus ſimplicibus. *Linn. ſp.* 424. *Roy. lugdb.* 39. *n.* 4.
Allium foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis, ex ala bulbiferum. *Hall. all.* 19.
Moli latifolium liliflorum. *Bauh pin.* 75.
Moli indicum, flore purpureo. *Swert. flor.* 61.
Habitat in India.

GLORIOSA (*ſuperba*). *Linn. ſp.* 437. *Fl. zeyl.* 122. *Roy. lugdb.* 29.
Methonica malabarorum. Nienghala zeylanenſium. *Herm. lugdb.* 688. *t.* 689. *Plukn. alm.* 249. *t.* 116. *f.* 3.
Methonica glorioſa, foliis capreolatis, floribus fimbriatis reflexis. *Burm. zeyl.* 158.
Lilium zeylanicum ſuperbum. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 69. *t.* 35. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 178. *f.* 3.
Mendoni. *Rheed. mal.* 7. *p.* 107. *t.* 57.
Junglang. Javanis.
Habitat in Malabaria & Zeylona.
Radix pauca quantitate aſſumta lethalis eſt. *Herm. herb.*

LEONTICE (*Leontopetaloides*) foliis ſimplicibus tripartito multifidis, corollis monopetalis calyculatis. *Linn. ſp.* 448.
Leontopetaloides. *Amman. act.* 8. *p.* 211. *t.* 113.
Habitat in India.

ASPARAGUS (*falcatus*) aculeis ſolitariis, foliis enſiformibus falcatis. *Linn. ſp.* 449. *Fl. zeyl.* 123.
Aſparagus foliis falcatis, ex uno puncto numeroſis. *Burm. zeyl.* 36. *t.* 13. *f.* 2.
Corruda guinenſis, foliis aduncis. *Petiv. muſ. n.* 169.
Habitat in Zeylona.

ASPARAGUS (*aſiaticus*) aculeis ſolitariis, caule erecto, ramis filiformibus, foliis faſciculatis. *Linn. ſp.* 449. *Roy. lugdb.* 28. *n.* 2.
Aſparagus aculeatus minor ſarmentoſus e maderaſpatan. *Plukn. alm.* 54. *t.* 15. *f.* 4.
Habitat in India.

ASPARAGUS (*ſarmentoſus*) foliis ſolitariis lineari-lanceolatis, caule flexuoſo, aculeis recurvis. *Linn. ſp.* 450. *Fl. zeyl.* 124.
Aſparagus aculeatus zeylanicus maximus ſarmentoſus. *Herm. lugdb.* 62. *t.* 63. *Burm. zeyl.* 37. *Raj. hiſt.* 1877.
Corruda zeylanica Pæoniæ radiculis. *Petiv. act. Lond. vol.* 22. *n.* 267.
Schadaveli kelangu. *Rheed. mal.* 10. *p.* 19. *t.* 10.
Habitat in Zeylona.

AS-

ASPARAGUS (*graminifolius*) foliis linearibus ſtriatis, ſcapo racemoſo. *Linn. ſp.* 450. ubi deſcr.
Habitat in Aſia.

ASPARAGUS (*terminalis*) inermis, foliis alternis lanceolatis petiolatis, racemo terminali compoſito. *Linn. ſp.* 450. ubi deſcr.
Terminalis. *Rumph. amb.* 4. *p.* 79. *t.* 34.
Habitat in Amboina.

ASPARAGUS (*Draco*) candice ſimplici, foliis enſiformibus mucronatis ſubcarnoſis imbricatis patentibus. *Linn. ſp.* 451.
Cordyline foliis inermibus imbricatis patentibus. *Roy. lugdb.* 22. *n.* 1.
Palma foliis longiſſimis pendulis, absque pedunculis e candice glabro enatis. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 169.
Draco arbor. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 1. *Bauh. pin.* 503.
Habitat in India & inſulis Canarienſibus.

POLIANTHES (*tuberoſa*). *Linn. ſp.* 453. floribus alternis. *Fl. zeyl.* 225.
Hyacinthus indicus tuberoſus, flore Narciſſi. *Bauh. pin.* 47. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 39. *f.* 4. *Burm. zeyl.* 122. *Swert. flor. t.* 14. radice tuberoſa. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 176.
Amica nocturna. *Rumph. amb.* 5. *p.* 285. *t.* 98.
Hyacinthus tuberoſus noctu olens, flore Narciſſi malaice ſoudal-malan. *D. Pryon.*
Habitat in Java & Zeylona.

ALETRIS (*Hyacinthoides*) acaulis, foliis lanceolatis carnoſis, floribus geminatis. *Linn. ſp.* 456.
Aloe foliis lanceolatis planis rectis radicalibus. *Linn. Fl. zeyl.* 130.
Katu-kapel. *Rheed. mal.* 11. *p.* 83. *t.* 42.
α Aloe (*zeylanica*) pumila, foliis variegatis. *Commel. H. Amſt.* 2. *p.* 41. *t.* 21. *Plukn. alm.* 19. *t.* 256. *f.* 5.
Aloe foliis exterioribus lanceolatis planis erectis radicalibus, interioribus longiſſimis ſubulatis arcuatis. *Roy. lugdb.* 23. *n.* 7.
Aloe zeylanica pumila, foliis variegatis. *Burm. zeyl.* 11.
β Aloe (*guinenſis*) radice geniculata, foliis e viridi & atro undulatim variegatis. *Commel. H. Amſt.* 2. *p.* 39. *t.* 20. *præl.* 84. *t.* 33.
Habitat in Zeylona & Guinea.

ALOE (*vera*) foliis ſpinoſis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis, floribus pedunculatis cernuis corymboſis. *Linn. ſp.* 458. *Roy. lugdb.* 22. *n.* 3.
Aloe vera vulgaris. *Munting. ic.* 96. *Bauh. pin.* 386.
Kadanaku ſ. Catevala. *Rheed. mal.* 11. *p.* 7. *t.* 3.
Creſcit in campis aridis & ſaxoſis utriusque Indiæ.

AGAVE (*vivipara*) foliis dentatis, ſtaminibus corollam æquantibus. *Linn. ſp.* 461.
Aloe americana polygona. *Comm. præl.* 65. *t.* 15.
Aloe americana. *Rumph. amb.* 5. *p.* 273. *t.* 94.
β Aloe americana ſobolifera. *Herm. lugdb.* 16. *t.* 17.
Habitat in utraque India.

HEMEROCALLIS. (*fulva*) corollis fulvis. *Linn. ſp.* 462.
Lilio Aſphodelus puniceus. *Clus. hiſt.* 1. *p.* 137.
Lilium rubrum, Aſphodeli radice. *Bauh. pin.* 80.
Habitat in China.

ACORUS (*verus*) aſiaticus, radice tenuiore. *Linn. ſp.* 463. *Fl. zeyl.* 132. *Herm. lugdb.* 9. *Burm. zeyl.* 6.
Acorum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 178. *t.* 72. *f.* 1.
Calamus aromaticus. *Garzias. in 4to. p.* 288. ubi icon.
Vaembu. *Rheed. mal.* 11. *p.* 99. *t.* 48.
Habitat in locis aquoſis Indiæ ad ripas.

CALAMUS (*Rotang*) *ſp.* 463. *Fl. zeyl.* 468.
Arundo zeylanica ſpinoſiſſima major, fructibus rotundis ſcabris acidis. *Burm. zeyl.* 36.
Arundo nucifera. Rotang dicta, fructu ſpadicei coloris, ſtriis purpureis venuſte teſſulato. *Plukn. alm.* 53. *t.* 106. *f.* 1. & 2. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 615.
Arundo Rotang dicta. *Piſ. mant.* 188.
Fructus Cannæ de Benghala. *Bauh. pin.* 405.
Tſjeru tſjurel. *Rheed. mal.* 12. *p.* 121. *t.* 64. & 65.
Palmjuncus Calapparius. *Rumph. amb.* 5. *p.* 88. *t.* 51. *ad* 58. ubi varietates, quæ a *Linn.* recenſentur.
Habitat in Indiis.

LORANTHUS (*ſcurrula*) pedunculis unifloris congeſtis, foliis obovatis. *Linn. ſp.* 472. ubi deſcr.
Viſcum vitici innaſcens. *Petiv. gaz. t.* 63. *f.* 8. *Camell. luz.* 3. *n.* 36.
Habitat in China.

LORANTHUS (*loniceroides*) floribus aggregato capitatis. *Linn. ſp.* 473.
Lonicera pedunculis multifloris, involucris pentaphyllis, foliis ovato-lanceolatis petiolatis *Linn. Fl. zeyl.* 83. *ſp.* 1. *p.* 175.
Viſcus fructibus oblongis rubicundis, floribus oblongis tubuloſis. *Burm. zeyl.* 229.
Periclymenum ſurrectum, perſicæ foliis, maderaſpatanum. *Plukn alm.* 287. *t.* 212. *f.* 5.
Periclymenum indicum arboribus innaſcens, florum faſciculis in brevibus pediculis ad caulium nodos. *Raj. dendr.* 32.
Iti-canni. *Rheed mal.* 7. *p.* 55. *t.* 29.
Paraſitica luxuriat ex arboribus in Indiæ ſylvis.

SA-

SARACA (*arboreſcens*). *Tab.* 25. *f.* 2.
Habitat in Java.

Caul. arboreus glaber. *Fol.* alterna ſine impari, foliola oblonga petiolata. *Paniculæ ſpicis* alternis, *bracteis* ovato-lanceolatis oppoſitis binis & binis. *Cal.* nullus. *Cor.* monopetala infundibuliformis, *faux* margine elevato *limbo* quadripartito *laciniis* ovatis patentibus: ſuperiore remotiore. *Stam. filam.* ſex (utroque latere tria) margini receptaculi inſidentia ſubulata declinata, *antheræ* calcaneo inſtructæ an polliniferæ? *Piſt. germen* longitudine ſtaminum oblongum compreſſum, *Stylus* ſubulatus declinatus longitudine germinis, *Stigma* obtuſum. *Per.* ? *Sem.* ?

DIGYNIA.

ORYZA (*ſativa*). *Linn. ſp.* 475. *Roy. lugdb.* 58. *Catesb. car.* 1. *p.* 14. *t.* 14.
Colitur in Indiæ locis aquoſis, ubi alba rubra & variegata occurrunt, quæ pro varietatibus habendæ.

TRIGYNIA.

FLAGELLARIA (*indica*). *Linn. ſp.* 475. *Fl. zeyl.* 133.
Lithoſpermum indicum arundinaceum, foliis gramineis in capreolos deſinentibus. *Herm. muſ. zeyl.* 30.
Canna indica florida baccifera, fructu umbilicato monopyreno, floribus racemoſis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 373.
Lacryma Jobi gramineis foliis, in capreolos deſinentibus. *Burm. zeyl.* 138.
Frutex indicus ſcandens, foliis Mendonii inſtar in capreolos deſinentibus, fructu parvo coronato. *Plukn. amalth.* 101.
Palmjuncus lævis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 120. *t.* 59. *f.* 2.
Pamboe valli. *Rheed. mal.* 7. *p.* 99. *t.* 53.
Rotting korwaer. Javanis.
Habitat in Indiæ variis locis.

RUMEX (*veſicarius*) floribus hermaphroditis geminatis, valvularum alis omnibus maximis membranaceis reflexis, foliis indiviſis. *Linn. ſp.* 479. *Roy. lugdb.* 230. *n.* 6.
Acetoſa veſicaria utriusque Indiæ annua. *Plukn. alm.* 8.
Acetoſa americana, foliis longiſſimis pediculis donatis. *Moris. hiſt.* 2. *p.* 583. *ſ.* 5. *t.* 28. *f.* 7. *Bauh. pin.* 114. *prodr.* 54.
Oxalis africana. *J. Bauh. hiſt.* 2. *p.* 992.
Acetoſa ſeu lapathum acetoſum, folio ſubrotundo. *D. Pryon* 1759 ex Java miſit.
Habitat in Aſia, Africa, America.

ÆSCULUS (*Pavia*) floribus octandris. *Linn. ſp.* 488.
Pavia. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 260. *t.* 260. *H. angl.* 54. *t.* 19. *Trew. ehret. t.* 15. *Mill. ic.* 198. *Duham. arb. p.* 98. *Roy. lugdb.* 463.
Saamouna piſonis, ſ. ſiliquifera braſilienſis arbor, digitatis foliis ſerratis, floribus Teucrii purpureis. *Plukn. alm.* 326. *t.* 56. *f.* 4.
Habitat in Braſilia, frequens in hortis europæis.

SAURURUS (*cernuus*) foliis profunde cordatis ovato-lanceolatis, amentis ſolitariis recurvis. *Linn. ſp.* 489. *Gron. virg.* 40. *Roy. lugdb.* 8. *n.* 2.
Serpentaria repens, floribus ſtamineis ſpicatis, Bryoniæ nigræ folio ampliore pingui. *Plukn. alm.* 343. *t.* 117. *f.* 4.
Habitat in Virginia & Java.

OCTANDRIA MONOGYNIA.

TROPÆOLUM (*minus*) foliis integris, petalis acuminato ſetaceis. *Linn. ſp.* 490.
Cardamindum minus & vulgare. *Fewill. peruv.* 3. *p.* 14. *t.* 8.
Naſturtium indicum. *Lobel. ic.* 516. *f.* 1 & 2. *Bauh. pin.* 306.
Habitat in India & Peru.

OSBECKIA (*chinenſis*) *Linn. ſp.* 490. ubi deſcr. *Osb. it.* 213. *t.* 2.
Echinophora maderaſpatana, ſideritis non ſerratis nervoſis foliis, fructu capſulari caucalidis æmulo. *Plukn. alm.* 132. *t.* 173. *f.* 4.
Kadali maderaſpatanum minus, capſulis piloſis. *Raj. ſuppl. app.* 236.
Habitat in India.

ALLOPHYLLUS (*zeylanica*). *Linn. ſp.* 496. *Fl. zeyl.* 140.
Habitat in Zeylona.

MIMUSOPS (*Elengi*) foliis alternis remotis. *Linn. ſp.* 497. *Fl. zeyl.* 138.
Flos cuspidum. *Rumph. amb.* 2. *p.* 189. *t.* 63.
Abor zeylanica floribus odoratis, faciem humanam quodammodo referentibus. *Burm. zeyl.* 27.
Arbor kauki Indorum, floribus odoratis. *Breyn. cent.* 20. *t.* 8.
Bonga Tanjoing laut. *Rumph. amb.* 2. *p.* 193. *t.* 64.
Elengi. *Rheed. mal.* 1. *p.* 34. *t.* 20.
Habitat in India.

MIMUSOPS (*kauki*) foliis confertis. *Linn. ſp.* 497. *Fl. zeyl.* 237.
Metroſiderops macaſſarenſis. *Rumph. amb.* 3. *p.* 19. *t.* 8.
Arbor florifera montana. D. *Kleinhof.*
β Arbor longifolia, flore albo. D. *Kleinhof* quæ foliis ovato-lanceolatis.
Habitat in India.

JAM-

JAMBOLIFERA (*pedunculata*) *Linn. ſp.* 497. *Fl. zeyl.* 139.
Jambulones. *Bauh. pin.* 460.
Prunus indica fructu nigro, olivæ magnitudine Jambolonis Acoſtæ. *Burm. zeyl* 197.
Caryophyllus langueſcente vi aromaticus malabaricus, folio & fructu maximo. *Plukn. alm.* 88. *t.* 274. *f.* 2. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 33. folio longiore; ceterum fructificatio eadem.
Jambolones. *Acoſt. libr. arom. p.* 299. in 8. vo.
Jambolana. *Rumph. amb.* 1. *p.* 131. *t.* 42.
Bohom-Jamboulan Javanis.
Habitat in India.

Specimina ex Java recepta differunt magnitudine & foliis ovalibus, cuneiformibus, integerrimis vel apice bifidis, margine cartilagineo.

SANTALUM (*album*). *Linn. ſp.* 497.
Santalum verum. *Breyn. ic.* 19. *t.* 5. *f.* 1.
Sandalum album. *Rumph. amb.* 2. *p.* 42. *t.* 11. *Bauh. pin.* 392.
Habitat in India.

MEMECYLON (*capitellatum*) foliis ovatis, floribus axillaribus capitatis. *Linn. ſp.* 497. *Fl. zeyl.* 136.
Cornus ſylveſtris, foliis croceum colorem tingentibus, floſculis ad foliorum alas globoſis. *Burm. zeyl.* 76. *t.* 30.
Crocus zeylanicus ſylvaticus, ſeu arbor walikaku. *Herm. muſ. zeyl.* 7.
Habitat in zeylonæ locis arenoſis.

Folia ſaporis acido dulcis, coloris crocei, ab incolis in obſoniis loco curcumæ uſurpantur. *Herm. herb.*

MENECYLON (*umbellatum*) foliis ovatis, floribus nudis umbellatis.
Cornus ſylveſtris altera, korakaha dicta. *Burm. zeyl.* 76. *t.* 31.
Crocus zeylanica, arbor ſylveſtris korakaha dicta. *Herm. muſ. zeyl.* 40.
Habitat in Zeylona.

CLAUCENA. (*excavata*).
Habitat in Java.

Frutex. Fol. alterna pinnata: foliola petiolata ovato oblonga vix crenata pubeſcentia plurima. *Racemi* paniculati. *Cal. perianth.* monophyllum quadridentatum planiusculum breve. *Cor.* petala quatuor ſubrotunda ſeſſilia. *Stam. Filam.* octo ſubulata, corolla breviora, inferiori parte dilatata incraſſata intus excavata, germini circumſtantia, nectariumque conſtituentia, *Antheræ* ſubrotundæ verſatiles. *Piſt. Germen* ſubrotundum, *Stylus* cylindraceus, ſtaminibus brevior. *Stigma* ſimplex. *Per.*? *Sem.*?

LAW-

LAWSONIA. (*inermis*) ramis inermibus. *Linn. ſp.* 498. *Fl. zeyl.* 135.
Liguſtrum indicum ſeu Alhenna. *Burm. zeyl.* 142.
Liguſtrum ægyptiacum latifolium. *Bauh. pin.* 476.
Alhenna ſeu Henna Arabum. *Walth. Hort.* 3. *t.* 4. *Shaw. catal. n.* 17.
Cyprus verus antiquorum. *Garzin. herb.*
Cyprus, Henna, Alcanna. *Rauwolf. itin.* 60. *t.* 60.
Liguſtrum ægyptiacum Elhanne. *Alp. ægypt.* 47.
Pontaletſce. *Rheed. mal.* 4. *p.* 117. *t.* 57.
Patjar Tjalong. Javanis
Creſcit per totam Indiam, ubi colitur, tum & in Ægypto, Palæſtina, Perſia.

LAWSONIA (*ſpinoſa*) ramis ſpinoſis. *Linn. ſp.* 498. *Fl. zeyl.* 134.
Rhamnus malabaricus, fructu racemoſo calyculato. *Raj. hiſt.* 1573.
Rhamnus malabaricus, Mail anſchi. *Plukn. alm.* 38. *t.* 220. *f.* 1.
Alcannæ ſpecies zeylanica, Manithondi dicta. *Burm. zeyl.* 9.
Cyprus Alcanna. *Rumph. amb.* 4. *p.* 42. *t.* 17.
Mail anſchi. *Rheed. mal.* 1. *p.* 73. *t.* 40.
Patsjar java & Patsjar-tſina, ſub quibus nominibus ſæpius miſſa fuit a D. *Kleinhof* ex Java.
Habitat in India.

PROTIUM (*Javanicum*).
Tingulong. *Rumph. auct.* 54. *t.* 23. *f.* 1.
Habitat in Java.

Arbor. Folia oppoſita, foliolis pinnatis cum impari quinque vel ſeptem, glabra laurina petiolata. *Racemus* paniculatus multiplex. *Cal. perianth.* monophyllum ſubquadridentatum obtuſum perſiſtens. *Cor.* petala quatuor ſeſſilia ovata acuminata æqualia, *nectarium* ad receptaculi marginem cingens germen inter ſtamina urceoli inſtar. *Stam. filam.* octo ſubulata petalis breviora. *Antheræ* oblongæ quaſi ex quatuor connatæ. *Piſt. germen* ovatum ſuperum. *Stylus* cylindricus longitudine ſtaminum. *Stigma* ſimplex. *Peric. Drupa* unilocularis. *Semen* ſubrotundum.

DAPHNE (*indica*) capitulo terminali pedunculato, foliis oppoſitis oblongo-ovatis glabris. *Linn. ſp.* 511. *Osb. it.* 246. ubi deſcr.
Habitat in China.

BÆCKÆA (*fruteſcens*). *Linn. ſp.* 515. *Osb. it.* 231. *t.* 1. ubi deſcr.
Habitat in China.

DIGYNIA.

Tab. 31. *f.* 5. GALENIA (*aſiatica*) foliis alternis ovato-oblongis.

Caul. arboreus, *ramis* divaricatis glaberrimis lucidis. *Fol* alterna ſubpetiolata ovato oblonga integerrima nitida. *Pedunc.* terminales racemoſi nudi.
Arbor eſt ingens, qua Cameli veſcuntur in Perſia & Arabia: Folia ſaporem habent Naſturtii hortenſis. *Garzin. herb.*

USU-



1. GALENIA? asiatica.
2. POLYGONUM perfoliatum.
3. ZALEJA decandra.



1. GALENIA? asiatica.
2. POLYGONUM perfoliatum.
3. ZALEJA decandra.



1. USUBIS *triphylla*.
2. DAIS *octandra*.

USUBIS (*triphylla*). *Tab.* 32. *f.* 1.
Klinting birou. Javanis. *D. Kleinhof.*
Habitat in Java.

Fol. alterna ternata, foliola petiolata ovato-oblonga repanda nuda. *Racemi* axillares ſimplices. *Flores* plures pedunculati ad ſingula puncta ſparſi. *Cal. perianth.* diphyllum ſubrotundum. *Cor. petala* quatuor ſubrotunda calyce minora ſeſſilia. *Stam. filam.* octo longitudine floris. *Anth.* ſubrotundæ. *Piſt. germina* duo pedicellata compreſſa, flore longiora. *Styli* ſimplices breves. *Stigmata* ſimplicia. *Per.*? *Sem.*?

TRIGYNIA.

POLYGONUM (*ſerratum*) foliis crenatis. *Linn. ſp.* 517.
Polygonum folio oblongo crenato. *Shaw. afr.* 489.
Perſicaria aquatica, foliis ſerratis. *D. Kleinhof.*
Habitat in Java & Mauritania.

POLYGONUM (*barbatum*) floribus hexandris trigynis, ſpicis virgatis, ſtipulis truncatis ſetaceo-ciliatis, foliis lanceolatis. *Linn. ſp.* 518. ubi deſcr.
Perſicaria maderaſpatana longiore folio hirſuta. *Plukn. alm.* 288. *t.* 210. *f.* 7. quæ cum Javanicis ſpeciminibus optime convenit.
Perſicaria procumbens longiſſima anguſtiſſima non maculoſa, ſpica longiori laxiori & graciliore. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 17. *t.* 3. *f.* 1.
Schovanna-nudela-muccu. *Rheed. mal.* 12. *p.* 147. *t.* 77.
Cabur muda. Javanis.
Habitat in Java & Malabaria.

Binæ ex Java afferuntur varietates, una *caule* & *foliis* villoſis e rubro ſericeis latioribus, *ſpicis* brevibus, ut in *Plukn.* fig.; altera *caule* & *foliis* glabris anguſtioribus, *ſpicis* laxis, quæ cum *Sloanei* figura convenire videtur.

POLYGONUM (*orientale*) floribus heptandris digynis, foliis ovatis, caule erecto, ſtipulis hirtis hypocrateriformibus. *Linn. ſp.* 519.
Perſicaria florum ſtaminibus ſex pluribusque, ſtylo duplici. *Roy. lugdb.* 216. *n.* 6.
Perſicaria foliis ovato-lanceolatis acutis, floribus pentandris, caule erecto. *Mill. dict. t.* 201.
Perſicaria orientalis, Nicotianæ folio, calyce florum purpureo. *Comm. rar.* 43. *t.* 43. *Tourn. cor.* 38.
Perſicaria javanica. *herb. Garzin.*
Cabur Cabur javanis.
Habitat in India & Oriente.

Quod in ſuperiore & hic obtinet, quoad *caules* & *folia*, quæ latiſſima ovata lanceolata & acuminata, tomento e rubro ſplendente inprimis ad genicula, diſtinguuntur. *Florum* vero *ſpicæ* incraſſatæ, & compactæ habentur, hinc videtur *H. mal* figura 76 cum hacce Javanica non ſatis convenire, quoad foliaturam; altera varietas Holoſerici inſtar ſplendens *Sompel Boa javanis* differt *caule* craſſiuſculo, *geniculis* breviſſimis, *ſpicis* compactis majoribus; nimis vero affinis pro nova ſpecie videtur.

Tab. 30. *f.* 3. POLYGONUM (*chinenſe*) floribus octandris trigynis, pedunculis ſcabris, foliis ovatis *Linn ſp.* 526.
Fagopyrum ſcandens montanum javanicum. Sitjava. *D. Kleinhof*, qui notat, quod creſcat altitudine octo pedum.
Habitat in Java & China.

Tab. 31. *f.* 2. POLYGONUM (*perfoliatum*) foliis triangularibus, caule aculeato, ſtipulis perfoliato-folioſis patentibus ſubrotundis. *Linn. ſp.* 521. ubi deſcr.
Acetoſa ſpinoſa ſcandens baccifera. *D. Kleinhof*, qui addit, quod creſcat locis montoſis.
Acetoſa foliis triangularibus, floribus ſpicatis. *D. Pryon.*
β Fagotritico ſimilis ſpinoſa minor ſinica, cauliculis erectis. *Plukn. amalth.* 87. *t.* 398. *f.* 1. quæ magnitudine & foliis magis oblongatis tantum differt.
Habitat in India.

POLYGONUM (*Fagopyrum*) foliis cordato-ſagittatis, caule erectiuſculo inermi, ſeminum angulis æqualibus. *Linn. ſp.* 522.
Helxine caule erectiuſculo inermi, foliis cordato-ſagittatis. *Roy. lugdb.* 217. *n.* 2.
Eryſimum cereale, folio hederaceo. *C. Bauh. pin.* 27.
Frumentum ſeracenicum vel Fagotriticum. *D. Pryon.*
Habitat in India.

PAULLINIA (*aſiatica*) foliis ternatis, caule aculeato, cirrhis nullis. *Linn. ſp.* 524. *Fl. zeyl.* 143.
Chamælæa trifolia aculeata, floribus ſpicatis. *Burm. zeyl.* 58. *t.* 24.
Chamælæa trifolia ſpinoſa, ſeu Piper ſylveſtre. *Herm. muſ. zeyl.* 22. *Petiv. muſ. cent.* 8.
Frutex baccifer indicus ſpinoſus trifolius, floribus ſpicatis. *Plukn. alm.* 202. *t.* 95. *f.* 5.
Kaka-toddali. *Rheed. mal.* 5. *p.* 81. *t.* 41.
Habitat in Zeylona & Malabaria.

PAULLINIA (*ſeriana*) foliis ternatis, foliolis ovato-oblongis, petiolis teretiuſculis. *Linn. ſp.* 524.
Seriana ſcandens triphylla & racemoſa. *Plum. gen.* 34. *ic.* 113. *f.* 2.
Caling Galing Javanis. *D. Pryon.*
Habitat in India utraque.

CARDIOSPERMUM (*Halicacabum*) foliis lævibus. *Linn. ſp.* 525. *Fl. zeyl.* 142. *Roy. lugdb.* 464.

Co-

Corindum ampliore folio, fructu majore. *Tourn. inſt.* 431. *Burm. zeyl.* 76. ubi varietates.
Piſum cordatum. *Beſl. eyſt. æſt. ord.* 13. *fol.* 11. *f.* 1.
Piſum veſicarium, fructu nigro, alba macula notato. *Bauh. pin.* 743. *Herm. muſ. zeyl.* 42.
Halicacabum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 60. *t.* 24. *f.* 2.
Halicacabus peregrinus. *Dod. pempt.* 455.
Veſicaria peregrina. *D. Pryon.*
Habitat in Indiis.

Variat magnitudine *foliorum* & *fructuum*, quibus a *Tourn.* diſtinguuntur in *inſt.* 431.

SAPINDUS (*ſaponaria*) foliis impari-pinnatis, caule inermi. *Linn. ſp.* 526. *Roy. lugdb.* 464.
Sapindus foliis oblongis vix petiolatis per coſtam ample alatam. *Brown. jam.* 206.
Saponaria. *Rumph. amb.* 2. *p.* 134.
Prunifera racemoſa, folio alato, coſta media membranulis utrinque exſtantibus donata. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 131.
Nux americana, foliis alatis bifidis. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 183. *t.* 94.
Nuci-prunifera arbor americana, fructu ſaponario orbiculato monococco nigro. *Plukn. alm.* 255. *t.* 217. *f.* 7.
In utraque habitat India.

SAPINDUS (*trifoliata*) foliis ternatis. *Linn. ſp.* 526.
Saponaria arbor trifoliata, ſemine Lupini. *Burm. zeyl.* 209. *Herm. muſ. zeyl.* 69. *H. Beaum.* 37.
Saponaria arbor indica trifolia. *Herm. lugdb.* 536.
Poerinsjii. *Rheed. mal.* 4. *p.* 43. *t.* 19.
Habitat in Malabaria & Zeylona.

ENNEANDRIA MONOGYNIA.

LAURUS (*Cinnamomum*) foliis trinerviis ovato-oblongis, nervis verſus apicem evaneſcentibus. *Linn. ſp.* 528. *Fl. zeyl.* 145.
Cinnamomum foliis ovatis latis frugiferum. *Burm. zeyl.* 62. *t.* 27.
Cinnamomum ſeu canella zeylanica. *Bauh. pin.* 408.
Caſſia cinnamomea. *Herm. lugdb.* 129. *t.* 655.
Habitat in Zeylona.

LAURUS (*Caſſia*) foliis triplinerviis lanceolatis. *Linn ſp.* 528. *Fl. zeyl.* 146.
Cinnamomum perpetuo florens, folio tenuiore acuto. *Burm. zeyl.* 63. *t.* 28.
Canella zeylanica ſylveſtris, odore & ſapore myrrhæ. *Herm. muſ. zeyl.* 6.

Caſſia cinnamomea, Myrthæ odore, folio trinervio ſubtus cæſio. *Plukn. alm.* 89.
Cinnamomum ſ canella malabarica & javanenſis. *Bauh. pin.* 409. *Raj. hiſt.* 1562.
Marua. *Rheed. mal.* 1. *p.* 107. *t.* 57.
Habitat in Malabaria, Zeylona, Java.

LAURUS (*Camphora*) foliis triplinerviis lanceolato-ovatis. *Linn. ſp.* 528.
Laurus camphorifera. *Kæmph. japan.* 770. ubi fig.
Camphora officinarum. *Bauh. pin.* 500
Arbor camphorifera japonica. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 16. *ic.* 16. *t.* 2. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 185. *t.* 95
Camphora japonica *D. Kleinhof*, quæ differt foliis ſubtus lucidis latioribus.
Habitat in Japonia & Java.


LAURUS (*malabatrum*) foliis trinerviis ovato-acuminatis, nervis verſus apicem confluentibus.
Sindoc. *Rumph. amb.* 2. *c.* 23. *p.* 69.
Katou-karua. *Rheed. mal.* 5. *p.* 105. *t.* 53.
Malabathrum malabaricum. *Garcin. herb.*
Habitat in Malabaria & Amboina.

LAURUS (*indica*) foliis venoſis lanceolatis perennantibus planis, ramulis tuberculatis cicatricibus, floribus racemoſis. *Linn. ſp.* 529. *Gron. virg.* 159.
Laurus latifolia indica. *Barr. rar.* 123. *t.* 877.
Laurifolia jamaicenſis baccifera, fructu parvo oblongo ſtriato. *Plukn. alm.* 211. *t.* 304. *f.* 1.
Cinnamomum ſylveſtre americanum. *Seb. theſ.* 2. *p.* 90. *t.* 84. *f.* 6.
Habitat in utraque India.

Plura diverſæ formæ folia in Japonia collecta in Herbario inveniuntur, quæ tamen pro diſtinctione ſpecifica non ſufficiunt, vid. act. natur. cur. vol. 1. Ao. 1727 in append. p. 4. &c.

CASSYTHA (*filiformis*) flagellis filiformibus aphyllis. *Linn. ſp.* 530.
Cuſcuta altera ſeu major. *Petiv. gaz.* 77. *t.* 49. *f.* 12.
Cuſcuta baccifera barbadenſium. *Plukn. alm.* 126. *t.* 172. *f.* 2.
Cuſcuta. *Rumph. amb.* 5. *p.* 491. *t.* 184. *f.* 4.
Cuſcuta indica, ramis folioſa, floſculis hexapetalis, fructu coronato rotundo. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 551.
Acatſia-valli. *Rheed. mal.* 7. *p.* 83. *t.* 44.
Cuſcuta maritima javanica, kankong incolis dicta. *D. Kleinhof.*
Habitat in India.

CAS-



1. CASSYTHA *corniculata*.
2. CASSIA *Senna*.



1. CASSYTHA *corniculata*.
2. CASSIA *Senna*.

CASSYTHA (*corniculata*) ramis lignoſis corniculatis. *Tab.* 33. *f.* 1.
Caſſutha cornea. *Rumph. amb.* 7. *c.* 59. *p.* 52.
Florifera ſine folio ſcandens. *D. Kleinhof.*
Habitat in Java.

Anno 1758 hunc ſtirpem accepimus, externa forma & creſcendi modo Cuſcutamæ mulantem. *Rami* lignoſi craſſitie digiti minimi obtuſanguli aphylli ſulcati nodoſi intorti ac reflexi *aculeis* recurvis, ad quorum exortum *foliola* emarcida lanceolato-linearia, floſculi imperfecti vix viſibiles.

RHEUM (*undulatum*) foliis ſubvilloſis undulatis, petiolis æqualibus. *Linn. ſp.* 531.
Rhabarbarum folio oblongo criſpo undulato, flabellis ſparſis. *Geoffr. mat. med.* 2. *p.* 125. *Rumph. amb.* 6. *p.* 148. *c.* 39.
β Rhabarbarum. *Boym. fl. ſinenſ. S. f. S.*
Affertur ex China.

In figura *Boymii* foliatura valde differt ab omnibus ſpeciebus, quæ in hortis coli ſolebant, ut & ab iis, quæ intra paucos annos ex Ruſſia huc allatæ fuere, hinc eadem incertitudo, quæ huc uſque, & adhucdum manet, ex quanam ſpecie verum & optimum pro medicina Rhabarbarum petendum ſit.

DECANDRIA MONOGYNIA.

SOPHORA (*tomentoſa*) foliis pinnatis, foliolis numeroſis ſubrotundis tomentoſis. *Linn. ſp.* 533. *Fl. zeyl.* 163.
Indigofera foliis tomentoſis. *Linn. H. cliff.* 487.
Colutea zeylanica argentea tota. *Herm. lugdb.* 169. *t.* 171.
Colutea zeylanica maxima ſiliquoſa, tota incana, grano rotundo globoſo. *Burm. zeyl.* 69.
Coronilla zeylanica argentea tota. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 50. *Burm. zeyl.* 77.
Habitat in Zeylona.

SOPHORA (*japonica*) foliis pinnatis, foliolis ovatis glabris, caule arboreo.
Habitat in Japonia.

Arbor foliis Robiniæ Caraganæ. *Folia* pinnata, foliola ovata lævia 7—11, inferiora paullo minora. *Racemi* parvi, *Flores* albi magnitudine florum indigoferæ.

SOPHORA (*heptaphylla*) foliis pinnatis, foliolis ſeptenis glabris. *Linn. ſp.* 533. *Fl. zeyl.* 164.
Anticholerica. *Rumph.* 4. *p.* 60. *t.* 22.
Fruticulus ſinenſis, ſennæ ſylveſtris folio anguſtiore, nodoſa ſiliqua, roſtro longiore donata. *Plukn. amalth.* 18. *t.* 451. *f.* 10.
Habitat in India.

BAUHINIA (*ſcandens*) caule cirrhifero. *Linn. ſp.* 535.
Clematis indica folio bifido, flore fructuque carens, arbores tranſcendens. *Raj. ſuppl.* 328.
Folium linguæ. *Rumph. amb.* 5. *p.* 1. *t.* 1.
Naga-valli. *Rheed. mal.* 8. *p.* 55. *t.* 29.
Habitat in Malabaria, Amboina, Cumana.

BAUHINIA (*variegata*) foliis cordatis, lobis coadunatis obtuſis. *Linn. ſp.* 535.
Bauhinia malabarica. *Garzin herb.*
Siliqua ſylveſtris rotundifolia indica. *Bauh. pin.* 402.
Arbor S. Thomæ. *Zanon. hiſt.* 26. *t.* 15. & 32. *t.* 20. *ed. Bonon.*
Chovanna mandaru. *Rheed. mal.* 1. *p.* 57. *t.* 32.
Habitat in India.

BAUHINIA (*purpurea*) foliis ſubcordatis bipartitis rotundatis ſubtus tomentoſis. *Linn. ſp.* 536.
Mandaru ſecunda ſpecies. *Plukn. alm.* 240.
Chovanna-mandaru. *Rheed. mal.* 1. *p.* 59. *t.* 33.
Habitat in Indiæ arenoſis.

BAUHINIA (*tomentoſa*) foliis cordatis, lobis ſemiorbiculatis tomentoſis. *Linn. ſp.* 536. *Fl. zeyl.* 147. *Roy. lugdb.* 464. *n.* 3.
Bauhinia foliis ſubrotundis, flore flaveſcente ſtriato. *Burm. zeyl.* 44. *t.* 18.
Senna zeylanica, folio ſingulari cordato, flore luteſcente magno. *Hartogh. herb.*
Mandaru maderaspatenſe, foliis firmioribus biſulcis, glabritie ſplendentibus. *Plukn. alm.* 240. *t.* 44. *f.* 6.
Chanſchena-pou. *Rheed. mal.* 1. *p.* 63. *t.* 35.
Habitat in Zeylona & Malabaria.

BAUHINIA (*acuminata*) foliis ovatis, lobis acuminatis ſemiovatis. *Linn. ſp.* 536. *Fl. zeyl.* 148.
Bauhinia foliis oblongo-acutis nervoſis, flore albo. *Burm. zeyl.* 45.
Bauhinia foliis bilobis, ſpicis laxis terminalibus. *Brouwn. jam.* 286.
Sennæ ſpuriæ, ſeu aſphalto affinis arbor ſiliquoſa, foliis bifidis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 51.
Arbor divi Thomæ ſpecies foliis longioribus. *Herm. muſ. zeyl.* 8.
Velutta mandaru. *Rheed. mal.* 1. *p.* 61. *t.* 34. *Raj. hiſt.* 1751.
Habitat in utraque India.

CASSIA (*diphylla*) foliis conjugis, ſtipulis cordato-lanceolatis. *Linn. ſp.* 537. ubi deſcr.
Niella-warei. Incolis.
Habitat in India.

CAS.

CASSIA (*Abſus*) foliis bijugis ſubovatis, glandulis duabus ſubulatis inter infima. *Linn. ſp.* 537. *Fl. zeyl.* 153.
Senna quadrifolia, ſiliqua plana hirſuta, flore aureo ſanguineo. *Burm. zeyl.* 212. *t.* 97.
Senna exigua maderaspatana tetraphylla ſiliquifera glabra, florum pediculis ad exortum foliorum propendentibus. *Plukn. alm.* 341. *t.* 60. *f.* 1.
Loto adfinis ægyptiaca. *Bauh. pin.* 332. ſemine atro ſplendente, ſeu abrus alpini, flore aureo lineolis ſanguineis perfuſo. *Herm. muſ. zeyl.* 41.
Abſus. *Alpin. ægypt.* 97. *c.* 31.
Habitat in India & Ægypto.

CASSIA (*Tagera*) foliis trijugis, glandula petiolari, ſtipulis ciliatis cordatis acuminatis. *Linn. ſp.* 538. ubi deſcr.
Caſſia ſeu ſenna ſpuria tetraphylla arboreſcens, ſiliquis tenuibus longiſſimis pendulis. *Amm. herb.* 603. *n.* 33.
Sena ſpuria orientalis tenuiſſimis ſiliquis tetraphylla. *Plukn. alm.* 342.
Chamæ caſſiæ affinis tetraphylla, ſiliquis tenuiſſimis, ſemine tereti, apicibus obtuſis, quaſi abſciſſis. *Breyn prodr.* 2. *p.* 52.
Tagera. *Rheed. mal.* 2. *p.* 103. *t.* 52. *Raj. hiſt.* 1743.
Catipping. incolis. mal. caltiade.
Habitat in India.

CASSIA (*Tora*) foliis trijugis obovatis, exterioribus majoribus, glandula ſubulata inter inferiora quatuor. *Linn. ſp.* 538. *Fl. zeyl.* 152. *Roy. lugdb.* 468. *Mill. dict. t.* 82.
Caſſia ſiliqua quadrangulari. *Dill. elth.* 72. *t.* 63. *f.* 73.
Senna orientalis hexaphylla Tala zeylonenſibus. *Herm. lugdb.* 557.
Senna orientalis hexaphylla, ſiliquis longis incurvis, Tora Indorum vulgo & Tachara Malabarenſium. *Plukn. alm.* 342.
Senna Javanica fruteſcens. *Garzin. herb.*
Taggarei vel Catjang Tandoe, incolis.
Habitat in India.

CASSIA (*bicapſularis*) foliis trijugis obovatis glabris, interioribus rotundioribus minoribus, glandula interjecta globoſa. *Linn. ſp.* 538. *Roy. lugdb.* 468. *n.* 10.
Caſſia hexaphylla, ſiliqua bicapſulari. *Plum. ſpec.* 18. *t.* 76. *f.* 1.
Habitat in Indiis.

CASSIA (*obtuſifolia*) foliis trijugis ovatis obtuſiuſculis. *Linn. ſp.* 539.
Caſſia fætida, foliis ſennæ italicæ. *Dill. elth.* 71. *t.* 62. *f.* 72.
Caſſia minor herbacea plerumque hexaphylla, folio obtuſo. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 47. *t.* 18. *f.* 5.

Sen-

Senna javanica. *Garzin. herb.*
Gallinaria rotundifolia. *Rumph. amb. 5. p.* 283. *t.* 97. *f.* 2.
Habitat in Indiis.

Tab. 33. *f.* 2. CASSIA (*Senna*) foliis trijugis quadrijugisque ſubovatis, ſiliquis falcatis. *Linn. ſp.* 539. *Roy. lugdb.* 468. *n.* 9.
Senna perſica, ſiliquis falcatis. *Garzin. herb.*
Senna italica, foliis obtuſis. *Bauh. pin.* 397. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 200. *ſ.* 2. *t.* 24. *f.* 2. *Dodon. pemt.* 361.
β Senna Alexandrina ſ. foliis acutis. *Bauh. pin.* 397. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 201. *ſ.* 2. *t.* 24. *f.* 1.
Habitat in India & Ægypto.

CASSIA (*planiſiliqua*) foliis quinquejugis ovato-lanceolatis glabris, glandula baſeos petiolorum. *Linn. ſp.* 540. *Roy. lugdb.* 468. *n.* 11.
Caſſia ſiliquis planis. *Plum. ſp.* 18.
Senna zeylanica, flore luteo magno, ſiliqua plana. *Burm. zeyl.* 214.
Flos flavus. *Rumph. amb.* 4. *p.* 63. *t.* 27.
Cambang cuning malaice. *D. Pryon.*
Habitat in Indiis.

Folia in quibusdam ſpeciminibus obtuſa in aliis apice acuminata, quæque ab incolis fœmina appellatur varietas hujus cenſenda, foliis minoribus.

CASSIA (*occidentalis*) foliis quinquejugis ovato-lanceolatis margine ſcabris, exterioribus majoribus glandula baſeos petiolorum. *Linn. ſp.* 539. ubi deſcr. *Roy. lugdb.* 467. *n.* 7.
Senna occidentalis, odore opii viroſo, Orobi pannonici foliis mucronatis glabra. *Comm. H. Amſt.* 1. *p.* 51. *t.* 26.
Senna indica, foliis conjugatis. flore luteo, incolis Tepan-lacki dicta. *D. Pryon.* Catippane mal.
Habitat in India utraque.

In horto ex ſeminibus ſæpius germinavit.

CASSIA (*fiſtula*) foliis quinquejugis ovatis acuminatis glabris, petiolis eglandulatis. *Linn. ſp.* 540. *Fl. zeyl.* 149. *Roy. lugdb.* 466. *n.* 2.
Caſſia fiſtula alexandrina. *Bauh. pin.* 405. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 215. *t.* 110. *Rumph. amb.* 2. *p.* 83. *t.* 21.
Conna. *Rheed. mal.* 1. *p.* 37. *t.* 22.
Habitat in India & Ægypto.

CASSIA (*alata*) foliis octojugis ovali-oblongis, interioribus minoribus, petiolis eglanduloſis, ſtipulis patulis. *Linn. ſp* 541. *Roy. lugdb.* 467. *n.* 3.
Caſſia ſylveſtris fœtida, ſiliquis alatis. *Plum. ſpec.* 18.

Fa-

Faba dulcis. *Merian. ſurin.* 58. *t.* 58.
Herpetica. *Rumph. amb.* 7. *p.* 35. *t.* 18.
Daun coepan Javanis, ſub quo nomine miſſa ac notata, quod ſit planta annua, ſex pedes alta, cujus ſuccus ex foliis expreſſus ſcabiem curat.
Habitat in India.

CASSIA (*ſurattenſis*) foliis octojugis ovato-oblongis obtuſis emarginatis inferioribus minoribus, glandula ad baſin binorum inferiorum pedicellata.
Senna ſurattenſis. *Garzin. herb.*

Caul. herbaceus. *Stipulæ* binæ ad petiolorum exortum lineari-lanceolatæ. *Fol.* apice obtuſa emarginata magnitudine inter *Caſſiam Sennam* & *Toram*, *glandula* pedicellata ad bijuga inferiora. *Pedunc.* axillares *bracteis* cordato-acuminatis, *pedicelli* uniflori, *Cor.* coloris aurantii magna.

CASSIA (*marilandica*) foliis octijugis ovato-oblongis æqualibus, glandula baſeos petiolorum. *Linn. ſp.* 541. *Roy. lugdb.* 467. *n.* 6.
Caſſia mimoſæ foliis, ſiliqua hirſuta. *Dill. elth.* 351. *t.* 260. *f.* 339.
Caſſia marilandica, pinnis foliorum oblongis, calyce floris reflexo. *Mart. cent.* 23. *t.* 23.
Habitat in India, Virginia, Marilandia.

CASSIA (*Sophera*) foliis decemjugis lanceolatis, glandula baſeos oblonga. *Linn. ſp.* 543. *Fl. zeyl.* 150.
Senna vigintifolia, ſiliquis teretibus. *Burm. zeyl.* 213. *t.* 98.
Senna orientalis fruticoſa, ſophera dicta. *Herm. lugdb.* 557.
Spheræ congener planta, ſiliquis compreſſis hirſutis, ſeminibus atris lucidis, floribus aureis. *Herm. muſ. zeyl.* 56.
Galegæ affinis. *Bauh. pin.* 352.
Gallinaria acutifolia. *Rumph. amb.* 5. *p.* 283. *t.* 97. *f.* 1.
Ponnam-tongera. *Rheed. mal.* 2. *p.* 101. *t.* 52.
Habitat in Indiæ ſylvis.

CASSIA (*auriculata*) foliis duodecim-jugis obtuſis mucronatis, glandulis ſubulatis pluribus, ſtipulis reniformibus barbatis. *Linn. ſp.* 543. *Fl. zeyl.* 151.
Senna ſpuria maderaſpatana, caule ad foliorum alas geminatis ſubrotundis appendiculis auriculato. *Plukn. alm.* 341. *t.* 314. *f.* 4.
Habitat in India.

CASSIA (*javanica*) foliis duodecim jugis oblongis obtuſis glabris, glandula nulla. *Linn. ſp.* 542.
Caſſia fiſtula javanica, flore carneo. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 217. *t.* 111.
Caſſia nigra ſeu fiſtuloſa ſecunda. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 44.
Caſſia fiſtula braſiliana. *Bauh. pin.* 403.
Senna malabarica. *Garzin. herb.* cujus folia quatuordecim juga oblonga, cum mucrone, duplo majora quam in *Commel.* figura.
Habitat in Indiis.

CASSIA (*mimoſoides*) foliis multijugis linearibus, glandula baſeos petiolorum obſoleta, ſtipulis ſetaceis. *Linn. ſp.* 543. *Fl. zeyl.* 154.
Mimoſa herba zeylanica, foliis & ſiliquis anguſtis glabris. *Burm. zeyl.* 160.
Herba viva zeylanica, ſiliquis longis anguſtis glabris. *Herm. muſ. zeyl.* 48.
Habitat in India.

Coejang kotteng Javanis, cum quo figura *Breyn. cent.* 23. *p.* 64. convenit, quæ Chamæcriſta Pavonis braſiliana, ſiliqua ſingulari vocatur. (niſi ſtipulæ cordatæ.)

CASSIA (*nictitans*) foliis multijugis, floribus pentandris, caule erecto. *Linn. ſp.* 543.
Caſſia calycibus acutis, floribus pentandris. *Linn. H. Cliff.* 497. *t.* 36.
Amæna mæſta. *Rumph. amb.* 6. *p.* 47. *t.* 67. *f.* 1.
β Senna ſpuria mimoſæ foliis, floribus parvis nictitantibus. *Plukn. alm.* 341. *t.* 314. *f.* 5.
Habitat in Indiis.

CASSIA (*procumbens*) foliis multijugis, caule procumbente. *Linn. ſp.* 543.
Caſſia americana procumbens herbacea, mimoſæ foliis, floribus parvis, ſiliquis anguſtis planis. *Comment. petrop. t.* 11.
Chamæcriſta mariana, flore minore. *Petiv. muſ.* 243. *n.* 40.
Habitat in Indiis.

POINCIANA (*alata*) caule inermi, foliis bipinnatis, foliolis ovato-oblongis. *Linn. ſp.* 544. *Fl. zeyl.* 159.
Criſta Pavonis flore elegantiſſimo variegato. *Burm. zeyl.* 79.
Caju Japan Javanis. *D. Pryon.*
Habitat in India.

POINCIANA (*bijuga*) aculeis ſolitariis, foliolis emarginatis. *Linn. ſp.* 544.
Frutex pavonius, ſeu Criſta Pavonis. *Breyn. cent.* 61. *t.* 22.
Criſta Pavonis. *Rumph. amb.* 4. *p.* 53. *t.* 20.
Acacia glorioſa jamaicenſis foliis minoribus ſubrotundis, ſpicis ad genicula ſimplicibus, floribus flavo purpureis. *Plukn. alm.* 5.
Habitat in Indiis.

Patra compala Javanis, ubi notatur: Cortex radicis recentis in febribus intermittentibus externe regioni hypochondriæ imponitur contra nauſeam.

POINCIANA (*pulcherrima*) aculeis geminis. *Linn. ſp.* 544.
Poinciana flore pulcherrimo. *Tourn. inſt.* 619.
Criſta Pavonis flore elegantiſſimo variegato. *Burm. zeyl.* 79.
Acacia orientalis glorioſa, coluteæ foliis, ad genicula ſpinis gemellis aculeata. *Plukn. alm.* 5.

Tsjetti-

Tsjetti-mandaru. *Rheed. mal.* 6. *p.* 1. *t.* 1.
Habitat in Indiis.
Has binas, quoad florendi modum convenientes & antea conjunctas nunc ſeparavit *Cl. Linnæus* ob aculeos. an ſatis conſtantes?

CÆSALPINIA. (*Sappan*) caule aculeato, foliolis oblongis inæquilateribus emarginatis. *Linn. ſp.* 545. *Fl. zeyl.* 158.
Acacia major tinctoria zeylanica Panſapan dicta. *Burm. zeyl.* 3.
Erythroxylum ſive lignum rubrum indicum ſpinoſiſſimum, coluteæ foliis, floribus luteis, ſiliquis maximis. *Herm. parad.* 332.
Acacia glorioſa zeylanica tinctoria ſpinoſa amplioribus foliis. *Plukn. alm.* 5.
Lignum ſappan. *Rumph. amb.* 4. *p.* 56. *t.* 21.
Tsjam-pangam. *Rheed. mal.* 6. *p.* 3. *t.* 2.
Habitat in Indiis.

GUILANDINA (*Bonduc*) aculeata, pinnis ovatis, foliolis aculeis ſolitariis. *Linn. ſp.* 545.
Acacia glorioſa, lentiſci folio, ſpinoſa, flore ſpicato luteo, ſiliqua magna muricata. *Plukn. alm.* 4. *t.* 2. *f.* 2.
Cæſalpinia aculeis recurvis, foliolis ovatis. *Linn. Fl. zeyl.* 157.
Lobus echinatus, fructu flavo, foliis rotundioribus. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 40.
Frutex globulorum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 89. *t.* 48.
Kitsjing Javanis.
Habitat in utraque India.

GUILANDINA (*Bonducella*) aculeata, pinnis oblongo ovatis, foliolis aculeis geminis. *Linn. ſp.* 545.
Acacia quæ lobus echinatus Cluſii, oculus cathi Luſitanis. *Burm. zeyl.* 4.
Lobus echinatus, fructu cæſio. *Herm. prodr.* 348.
Criſta Pavonis Glyzirrhizæ folio minor repens ſpinoſiſſima, flore luteo ſpicato minimo, ſiliqua longiſſima echinata, ſemine rotundo cinereo. *Breyn. prodr.* 2. *app.* 33. *t.* 28.
Globuli majores. *Rumph. amb.* 5. *t.* 49. *f.* 1.
Lobus echinatus, fructu cæſio, foliis longioribus. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 41.
Caretti. *Rheed. mal.* 2. *p.* 35. *t.* 22.
Jocan prectoe incolis.
Habitat in Indiis.

GUILANDINA (*Nugæ*) caule inermi, foliis petiolo primario ſubtus aculeis gemellis. *Linn. ſp.* 546.
Nugæ ſylvarum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 94. *t.* 50.
Frutex Japan. *D. Kleinhof.*
β Kellor javanis vel Moronga mas *D. Pryon*, quæ convenit cum illa, quæ Nugæ ſylvarum minima a *Rumphio* dicitur. *amb.* 5. *p.* 94. *t.* 49. *f.* 2.
Habitat in Amboina & Java.

GUILANDINA (*Moringa*) inermis, foliis ſubbipinnatis, foliolis inferioribus ternatis. *Linn. ſp.* 546. *Fl. zeyl. n.* 155.
Moringa zeylanica, foliorum pinnis pinnatis, flore majore, fructu anguloſo. *Burm. zeyl.* 162. *t.* 75.
Morunga. *Rumph. amb.* 1. *p.* 184. *t.* 74. & 75. *Rheed. mal.* 6. *p.* 19. *t.* 11.
Lignum peregrinum aquam cæruleam reddens. *Bauh. pin.* 416.
Pretu-morunga. Incolis.
Habitat in Zeylona, Malabara, Amboina, Ægypto, Africa.

GUAIACUM (*afrum*) foliolis multijugis acutis. *Linn. ſp.* 547.
Guilandinoides. *Linn. H. Cliff.* 489.
Acacia africana, quæ acaciæ ſimilis, foliis myrthi parvis aculeatis pinnatis, flore coccineo tetrapetaloide. *Walth. hort.* 2. *t.* 2.
Afra arbor acaciæ ſimilis, foliis myrthi aculeatis ſplendentibus. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 57.
Habitat in China, Africa.

CYNOMETRA (*cauliflora*) trunco florifero. *Linn. ſp.* 547. *Fl. zeyl.* 166.
Cynomorium. *Rumph. amb.* 1. *p.* 163. *t.* 62.
Naim-Nam. Javanis.
Habitat in India.

CYNOMETRA (*ramiflora*) ramis floriferis. *Linn. ſp.* 547.
Cynomorium ſylveſtre. *Rumph. amb.* 1. *p.* 164. *t.* 63.
Iripa. *Rheed. mal.* 4. *p.* 65. *t.* 31.
Habitat in India.

ANACARDIUM (*occidentale*). *Linn. ſp.* 548. *Fl. zeyl.* 165. *Roy. lugdb.* 463.
Anacardium occidentale Cajous dictum, officulo renis leporis figura. *Burm. zeyl.* 19.
Pomifera ſeu Prunifera indica, nuce reniformi ſummo pomo innaſcente, Cajous dicta. *Raj. hiſt.* 1649. *Catesb. car.* 3. *p.* 9. *t.* 9.
Acaiou. *Piſ. braſ.* 58. *mant.* 193.
Caſſuvium. *Rumph. amb.* 1. *p.* 177. *t.* 69.
Caſſchou. *Mer. Surin.* 16. *t.* 16.
Kagiu. *Boym. fl. ſinenſ. c. f. c.*
Kapa mava. *Rheed. mal.* 3. *p* 65. *t.* 54.
Jamboe-maſſon ſeu contoe moenjit. Javanis.
Habitat in Indiis.

ADENANTHERA (*pavonina*) foliis decompoſitis utrinque glabris. *Linn. ſp.* 550. *Fl. zeyl.* 160. *Roy. lugdb.* 462.

Poin-

Poinciana foliis duplicato-pinnatis, foliolis alternis. *Linn. H. Cliff.* 158.
Criſta Pavonis arbor, foliis ſubrotundis alternis, flore ſpicato pentapetalo flavo, lobis longis, fructu orbiculato coccineo. *Burm. zeyl.* 80.
Phaſeolus alatus arboreus, fructu orbiculato compoſito coccineo. *Herm. cat. lugdb.* 495.
Phaſeolus alatus, arbor indica, fructu coccineo orbiculato medio utrimque tumido. *Plukn. alm.* 294.
Corallaria parvifolia. *Rumph. amb.* 3. *p.* 173. *t.* 109.
Mandſiadi. *Rheed. mal.* 6. *p.* 25. *t.* 14.
Habitat in India.

ADENANTHERA (*Falcataria*) foliis decompoſitis ſubtus tomentoſis. *Linn. ſp.* 550.
Clypearia alba. *Rumph. amb.* 3. *p.* 176. *t.* 111.
Habitat in Amboina.

MELIA (*Azedarach*) foliis bipinnatis. *Linn. ſp.* 550. *Fl. zeyl.* 162. *Roy. lugdb.* 462. *n.* 2.
Azedarach. *Dod. pempt.* 848. *Burm. zeyl.* 40.
Arbor fraxini folio, flore cæruleo. *Bauh. pin.* 415.
β Azederach ſemper virens & florens. *Tourn. inſt.* 616. *Herm. lugdb. app.* 652.
Azedirachta indica, foliis ramoſis minoribus, flore albo ſubcæruleo. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 147. *t.* 76.
Syringæ ſpecies odore & ſapore non diſſimilis, Folla-morgatje. Acriku. Javanis. *D. Pryon.*
Habitat in Zeylona & Java.

MELIA (*Azadirachta*) foliis pinnatis. *Linn. ſp.* 550. *Fl. zeyl.* 161. *Roy. lugdb.* 462. *n.* 1.
Azedarach foliis falcato-ſerratis. *Burm. zeyl.* 40. *t.* 15.
Azadirachta indica, foliis fraxini. *Breyn. ic.* 15. *t.* 1.
Olea malabarica Fraxini folio. *Plukn. alm.* 269. *t.* 247. *f.* 1.
Arbor indica Fraxino ſimilis Oleæ fructu. *Bauh. pin.* 416.
Aria-bepou. *Rheed. mal.* 4. *p.* 107. *t.* 52.
Intarram Ceſſa Javanis. *D. Kleinhof.*
Habitat in India.

MELIA (*Koetjape*) foliis ternis.
Arbuſcula barbadenſis amplexicaulis triphylla. *Plukn. phyt.* 48. *t.* 145. *f.* 4. quæ differt petiolis alatis.
Koetjape. Javanis, quæ ſtigmatibus quinque.
Habitat in Java.

PTEROCARPUS (*Draco*). *Linn. ſp.* 1662. *Jacq. hiſt.* 283. *t.* 183. *f.* 92.
Draco arbor. *Loefl. it.* 266. & 273.
Draco arbor indica ſiliquoſa Populi folio. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 213. *t.* 109.
Lingoum. *Rumph. amb.* 2. *p.* 205. *t.* 170.
Habitat in India.

Tab. 34. *f.* 1. FAGONIA (*indica*) ſpinis geminis, foliis oppoſitis ovalibus.
Fagonia indica ad alas ſpinoſa, flore pentapetalo, fructu quinque capſulari; planta perſica. *Garzin. herb.*
Habitat in Perſia.

Rad. annua perpendicularis. *Caul.* herbaceus erectus teres glaber, ramis alternis. *Fol.* oppoſita ſubpetiolata ovali-oblonga integerrima glabra. *Spinæ* ad ramorum exortum geminæ. *Pedunc.* in ramorum ſummo & axillares uniflori, craſſitie pili. *Floſculi* pentapetali lutei. *Fruct. capſ.* quinquelocularis.

TRIBULUS (*lanuginoſus*) foliolis quinquejugatis ſubæqualibus, ſeminibus bicornibus. *Linn. ſp.* 553.
Tribulus terreſtris zeylanicus, cauliculis villoſis, fructu acuminato. *Burm. zeyl.* 226. *t.* 106. *f.* 1.
Tribulus terreſtris Indiæ orientalis, foliis viciæ ſubrotundis & villoſis. *Tourn. inſt.* 266.
Tribulus javanicus & perſicus. *Garzin. herb.*
Habitat in Zeylona.

PROSOPIS (*ſpicata*).
Wannie Coromandeli incolis. *D. Outgaerden.*
Habitat Coromandeli.

Arbor. Fol. alterna conjugata pinnata, foliolis octojugis ſine impari, ſimilibus Tamarindo, pinnis oblongis obtuſis. *Spicæ* anguſtæ longæ terminales & axillares. *Flores* parvi. *Cal. perianth.* monophyllum hemiſphæricum ſubquinquedentatum. *Cor.* petala quinque lanceolata ſeſſilia æqualia. *Stam. filam.* decem filiformia æqualia. *Antheræ* didymæ obtuſæ. *Piſt. germen* oblongum. *Stylus* filiformis longitudine ſtaminum. *Stigma* ſimplex. *Pericarp. ſiliqua* longa flatulenta unilocularis. *Sem.* plurima rotundato-oblonga colorata. Confer *Plukn. phyt. t.* 338. *pl.* 4. quæ ejuſdem videtur generis.

LIMONIA (*acidiſſima*) ſpinis axillaribus ſolitariis rectis, foliis pinnatis, petiolis alatis.
Limonia malus ſylveſtris zeylanica, fructu pumilo. *Burm. zeyl.* 143.
Schinus foliis pinnatis, petiolo marginato articulato, ſpinis axillaribus ſolitariis. *Linn. Fl. zeyl.* 175.
Aniſifolium. *Rumph. amb.* 2. *t.* 43.
Catu-tsjieru naregam. *Rheed. mal.* 4. *p.* 31. *t.* 14.
Habitat in India.

Plantæ javanicæ petioli membranacei vix alati (uti in figuris) teſte *Kleinhovio* arbor eſt 30 pedes alta 10 pollices craſſa, folia ſpirant odorem aniſi.



1. FAGONIA *indica*.
2. JUSSIŒA *tenella*.



1. FAGONIA *indica*.
2. JUSSIŒA *tenella*.

LIMONIA (*trifolia*) ſpinis axillaribus geminis, foliis ternatis ovatis: intermedio impari majore, fructu ſolitario. *Tab.* 34. *f.* 1.
Limonellus trifolius kimkit Javanis.
Habitat in Java.
Caul. fruticoſus erectus teres lævis; *Ramis* inter ad ſpinarum exortum incurvis. *Spinæ* geminæ rectæ ſubulatæ. *Folia* terna alterna petiolata inter ſpinas, foliolis ovatis glabris ſubtus lucidis. *Flores* ſolitarii pedunculati. *Fruct.* puſilli rotundati. Plures hujus generis ſpecies vid. in *Rumph. amb.* 2. a *cap.* 36 *ad* 41.

JUSSIÆA (*repens*) floribus pentapetalis decandris, pedunculis folio longioribus. *Linn. ſp.* 555. *Fl. zeyl.* 169.
Lyſimachia fructu caryophylloideo kikarindia zeylonenſibus. *Burm. zeyl.* 146.
Lyſimachia indica non pappoſa repens, flore pentapetalo, fructu caryophylloide. *Raj. hiſt.* 1510.
Caryophylloides. *D. Pryon.* Patjar ajer Javanis.
Nir carambu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 99. *t.* 51.
Habitat in India.

JUSSIÆA (*ſuffruticoſa*) erecta villoſa, floribus tetrapetalis octandris pedunculatis. *Linn. ſp.* 555.
Ludwighia capſulis oblongis uncialibus. *Roy. lugdb.* 252. *n.* 2.
Lyſimachia indica non pappoſa, flore luteo minimo, ſiliquis caryophyllum aromaticum æmulantibus. *Herm. lugdb.* 396.
Carambu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 95. *t.* 49.
β Cattu-carambu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 97. *t.* 50. quæ in ſpeciminibus javanicis foliis eſt obpoſitis.
Habitat in India.

JUSSIÆA (*erecta*) glabra, floribus tetrapetalis octandris ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 556. *Fl. zeyl.* 170.
Ludwighia capſulis oblongis. *Linn. H. Cliff.* 491.
Onagra perſicæ foliis amplioribus, parvo flore luteo. *Plum. ſp.* 7. *t.* 175. *f.* 2.
Lyſimachia lutea non pappoſa erecta, foliis glabris, fructu caryophylloide. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 37. *t.* 11. *f.* 1.
Jaſminum catalonicum, flore luteo. *Seb. theſ.* 1. *p.* 42. *t.* 26. *f.* 3.
Herba vitiliginum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 49. *t.* 21. *f.* 1.
Seroen-jayer. Javanis.
Creſcit in utraque India.

JUSSIÆA (*tenella*) glabra, floribus pentapetalis erectis ſubſeſſilibus, foliis oppoſitis. *Tab.* 35. *f.* 2.
Camarambaya. *Marcgr. hiſt.* 1. *p.* 30. *f.* 1.
Caryophylloides javanice bongo. *D. Pryon.*
Habitat in Java.
Caules glabri, *ramis* alternis. *Folia* oppoſita lineari lanceolata integerrima. *Flor.* axillares ſubpetiolati. *Capſulæ* oblongæ polyſpermæ.

QUIS-

10

Tab. 35. QUISQUALIS (*pubeſcens*) pedunculis alternis. *Linn. ſp.* 556.
f. 2. Quiſqualis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 71. *t.* 38.
Tab. 28. β *Quiſqualis* (*glabra*) pedunculis oppoſitis.
f. 2. Oedani. Javanis.
Habitat in Amboina.

Tab. 32. DAIS (*octandra*) floribus quadrifidis octandris.
f. 2. Kampang Garang. Javanis.
Habitat in Java.

Fol. oppoſita laurina petiolata lævia elliptico-oblonga acuminata. *Involucrum* unum alterumve pedunculatum terminale, *floribus* brevius. *Flores* glabri, *ſtaminibus* octo quibus ab hac claſſe differt.

CHALCAS (*Camuneng*).
Camunium. *Rumph.* 5. *p.* 26. *t.* 17.
Daun Cammuni. *Kleinhof.* ubi notatur: frutex eſt viginti quinque pedes altus, ob fragrantiſſimos albos flores in hortis colitur, & ad ſepes formandos lignum adhibetur.
Habitat in Java.

Frutex lævis. *Fol.* alterna ſubovata petiolata obſolete crenata. *Flores* paniculati terminales. *Cal. perianth.* quinquepartitum minimum: foliolis erectis ſubulatis perſiſtentibus. *Cor.* campanulata. *Petala* quinque ovato oblonga majuſcula unguibus oblongis. *Stam. filamenta* decem ſubulata erecta, corolla dimidio breviora. *Antheræ* ſubrotundæ. *Piſt. germen* ſubrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine ſtaminum. *Stigma* capitato - verrucoſum. *Peric. Bacca* oblonga. *Sem.* bina tomentoſa.

MELASTOMA (*malabathrica*) foliis integerrimis quinque nerviis lanceolato-ovatis ſcabris. *Linn. ſp.* 559. *Fl. zeyl.* 171.
Melaſtoma quinque nervia hirta major, capitulis ſericeis villoſis. *Burm. zeyl.* 155. *t.* 73.
Ciſtus indicus quinque nerveus, capitulis ſericeis pulpa nigra refertis, major. *Herm. muſ. zeyl.* 10.
Datura indica, folio malabathri. *Breyn. cent.* 119. *t.* 55.
Fragarius niger. *Rumph. amb.* 4. *p.* 137. *t.* 72.
Kadali maderaſpatana pentaneuros, foliis eleganter hirtis. *Petiv. herb.*
Kadali. *Rheed. mal.* 4. *p.* 87. *t.* 42.
Scanganii Biroerong incolis.
Habitat in India.

MELASTOMA (*hirta*) foliis denticulatis quinque nerviis ovato-lanceolatis, caule hiſpido. *Linn. ſp.* 559.
Groſſulariæ fructu non ſpinoſa, malabathri foliis, longa & ruſſa lanugine hirſutis, fructu majore cæruleo. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 85. *t.* 197. *f.* 2. *Raj. dendr.* 74.

Ar-



1. LIMONIA *trifolia*.
2. QUISQUALIS *pubeſcens*.

Arbuſcula jamaicenſis, quinque nervis minutiſſime dentatis foliis & caule pubeſcentibus. *Plukn. alm.* 40. *t.* 264. *no.* 1.
Kalou-kadali. *Rheed. mal.* 4. *p.* 91. *t.* 43.
Agrimoniæ congener indica. *Garzin. herb.*
Habitat in Indiis.

Cum figuris citatis convenit noſtra *planta*, pilis ferrugineis lanuginoſa, videturque diverſa a *Plum. ic.* 141. & *Plukn. t.* 265. *f.* 1. *foliis* ovatis acuminatis craſſis quinque nerviis, *venis* plurimis intertextis villoſis. *Pedunculi* axillares racemoſi pedicellis brevibus oppoſitis, ad quorum exortum *bracteæ* lanceolatæ. *Flos* inferus. *Cal.* perſiſtens. *Peric.* ſubrotundum.

MELASTOMA (*aſpera*) foliis integerrimis trinerviis lanceolatis ſcabris. *Linn. ſp.* 560. *Fl. zeyl.* 560.
Fragarius ruber. *Rumph. amb.* 4. *t.* 71. *p.* 135.
Kadali. *Rheed. mal.* 4. *p.* 87. *t.* 42.
Habitat in India.

MELASTOMA (*octandra*) foliis integerrimis trinerviis ovatis glabris, margine hiſpidis. *Linn. ſp.* 560. *Fl. zeyl.* 173.
Melaſtoma ſcabra trinervia. *Burm. zeyl.* 154. *t.* 72.
Ciſtus indicus trinervius anguſtifolius, flore roſeo, ſeminibus pulpa nigra incluſis. *Herm. muſ. zeyl.* 36.
Melaſtoma ſcabra trinervia, foliis oppoſitis oblongis. *D. Pryon.*
Caduk duk Javanis.
Habitat in India.

MELASTOMA (*criſpata*) foliis integerrimis quinque nerviis quaternis, ramis criſpatis. *Linn. ſp.* 560.
Funis muræenarum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 66. *t.* 35.
Habitat in Amboina.

DIGYNIA.

DIANTHUS (*chinenſis*) floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubulatis patulis tubum æquantibus, corollis dentatis. *Linn. ſp.* 588. *Roy. lugdb.* 443. *n.* 4.
Caryophyllus ſinenſis ſupinus leucoji folio, flore unico. *Tourn. act.* 1705. *p.* 348. *f.* 5. *Mill. ic.* 81. *f.* 2.
Tunica javanica. *D. Kleinhof.*
Habitat in China & Java, unde ſæpius cum ſeminibus miſſi.

BANISTERIA (*benghalenſis*) foliis ovato oblongis acuminatis, racemis lateralibus, ſeminibus patentibus. *Linn. ſp.* 611. *Fl. zeyl.* 176.
Acer benghalenſis laurinis foliis, fructu tergemino, totidem membranis exſtantibus alata. *Plukn. alm.* 7. *t.* 3. *f.* 1.
Acer ſcandens, foliis citri, flore cæruleo ſpicato. *Plum. ſp.* 18. *ic.* 14.
Loo-utan Javanis, cum quo melius convenire videtur. *Plukn. fig.* 3. *t.* 336. foliis integerrimis.
Creſcit in utraque India.

PENTAGYNIA.

AVERRHOA (*Bilimbi*) caudice nudo fructificante, pomis oblongis obtuſangulis. *Linn. ſp.* 613. *Fl. zeyl.* 177.
Blimbingium teres. *Rumph. amb.* 1. *p.* 118. *t.* 36. *Boym. fl. ſinenſ. P. f. P.* ?
Bilimbi. *Rheed. mal.* 3. *p.* 55. *t.* 45, 46.
Habitat in India.

AVERRHOA (*Carambola*) axillis foliorum fructificantibus, pomis oblongis acutangulis. *Linn. ſp.* 613. *Fl. zeyl.* 178.
Mala goënſia, fructu octangulari, pomi vulgaris magnitudine. *Bauh. pin.* 433.
Malus indica ſennæ occidentalis foliis, fructu acido parvo pentagono ſulcato, floribus rubris. *Burm. zeyl.* 148.
Prunum ſtellatum. *Rumph. amb.* 1. *p.* 115. *t.* 35.
Tamara-tonga ſ. carambolas. *Rheed. mal.* 3. *p.* 51. *t.* 43, 44.
Kamarangha cinghalenſium, fructu flavo oblongo ſulcato quinquangulo, malaice Carambolas. *Herm. herb.*
In omnibus Indiæ provinciis invenitur.

Cinghalenſes vaginas ex hoc ligno conficiunt, quibus cultros & gladios includunt, (nemo enim eorum ſine cultro in publicum exire ſolet) creduntque hujus arboris lignum ſecum geſtatum aut in cubiculo ſervatum valere adverſus veneficia & incantationes, teſte *Hermanno* in ejus herbario.

AVERRHOA (*acida*) ramis nudis fructificantibus, pomis ſubrotundis. *Linn. ſp.* 613. *Fl. zeyl.* 179.
Malus indica, fructu parvo rotundo acido ſtriato. *Burm. zeyl.* 148.
Blimbi altera minor. *Raj. hiſt.* 1450.
Neli-pouli. *Rheed. mal.* 3. *p.* 57. *t.* 47. & 48.
Cheramela. *Rumph. amb.* 7. *p.* 34. *t.* 17. *f.* 2.
Habitat in India.

COTYLEDON (*laciniata*) foliis trifidis, floribus quadrifidis. *Linn. ſp.* 615. *Roy. lugdb.* 454. *n.* 1.
Cotyledon afra, folio craſſo lato laciniato, floſculo aureo. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 288. *t.* 288.

Te-

Telephium indicum. *Bont. jav.* 132.
Telephium africanum anguſtiori folio, flore aurantiaco. *Plukn. alm.* 362. *t.* 228. *f.* 3.
Planta anatis. *Rumph amb.* 5. *p.* 271. *t.* 95.
Tsjakker-bebu Javanis. *D. Kleinhof.*
Habitat in India, Africa, Ægypto.

OXALIS (*ſenſitiva*) ſcapo umbellifero, foliis pinnatis. *Linn. ſp.* 622. *Fl. zeyl.* 180.
Oxys indica Tamarindi foliis, floribus umbellatis. *Burm. zeyl.* 178.
Oxaloides malabarica ſenſitiva, caule viridi glabro, flore luteo. *Garzin. act. angl.* 1730. *p.* 379. *t.* 2.
Herba mimoſa malabarenſium. *Zanon. hiſt.* 199. *t.* 61.
Herba ſentiens. *Rumph. amb.* 5. *p.* 301. *t.* 104. *f.* 2.
Herba viva. *Cluſ. exot.* 290.
Herba viva, foliis polypodii. *Baub. pin.* 259.
Todda-vaddi. *Rheed. mal.* 9. *p.* 33. *t.* 19.
Tacot-manucia. Indiapara Javanis.
Habitat in India.

OXALIS (*corniculata*) caule ramoſo diffuſo, pedunculis umbelliferis. *Linn. ſp.* 623. *Roy. lugdb.* 458. *no.* 4.
Oxys flore flavo. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 249.
Oxys flore luteo vulgaris minor zeylanica. *Burm. zeyl.* 179.
Oxys lutea indica, Daun-aſſan-kitsjil. *Rumph. amb.* 5. *p.* 277.
Trifolium acetoſum corniculatum luteum minus procumbens. *Moris. hiſt.* 2. *p.* 183. *ſ.* 2. *t.* 17. *f.* 2.
Habitat in India aliisque regionibus.

Diſtincta ſemper varietas quotannis ex Java mittitur radice repente.

DECAGYNIA.

PHYTOLACCA (*octandra*) floribus octandris octagynis. *Linn. ſp.* 631. ubi deſcr.
Phytolacca mexicana, baccis ſeſſilibus. *Dill. elth.* 218. *t.* 239. *f.* 308.
Jamma gobo. *Kæmph. amoen.* 828. *t.* 829.
Habitat in Mexico, Japan & Java.

PHYTOLACCA (*icoſandra*) floribus icoſandris decagynis. *Linn. ſp.* 631. ubi deſcr.
Phytolacca ſpicis florum longiſſimis, radice annua. *Mill. dict. t.* 207.
Habitat in Malabaria.

RHIZOPHORA (*conjugata*) foliis ovato-oblongis obtuſiuſculis integerrimis, calycibus ſeſſilibus, fructibus cylindraceo-ſubulatis. *Linn. ſp.* 634. *Fl. zeyl.* 181.
Habitat in Zeylona.

RHIZOPHORA (*gymnorhiza*) foliis ovato-lanceolatis integerrimis, radice terræ ſuperimpoſita. *Linn. ſp.* 634.
Mangium celſum. *Rumph. amb.* 3. *p.* 102. *t.* 68.
Candel. *Rheed. mal.* 6. *p.* 57. *t.* 31, 32.
Habitat in Indiæ ripis ſalſis.

RHIZOPHORA (*candel*) foliis obtuſis, pedunculis bigeminatis folio longioribus, fructibus ſubulatis. *Linn. ſp.* 634.
Tſierou kandel. *Rheed. mal.* 6. *p.* 63. *t.* 35.
Habitat in India.

RHIZOPHORA (*Mangle*) foliis acutis, fructibus ſubulato-ciliatis. *Linn. ſp* 634. *Jacq. hiſt. t.* 82.
Mangle arbor pyrifolia, ſalſis & uliginoſis locis proveniens, fructu oblongo tereti ſummis ramis radicoſa. *Plukn. alm.* 241. *t.* 204. *f.* 3.
Mangle pyri foliis cum ſiliquis longis, Ficui indicæ affinis. *Baub. hiſt.* 1. *p.* 415. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 63.
Mangium Candelarum. *Rumph. amb.* 3. *p.* 108. *t.* 71. & 72.
Pee-kandel. *Rheed. mal.* 6. *p.* 91. *t.* 34.
Habitat in locis paludoſis utriuſque Indiæ.

RHIZOPHORA. (*cylindrica*) fructibus cylindricis obtuſis. *Linn. ſp.* 635.
Mangium minus. *Rumph. amb.* 3. *p.* 106. *t.* 69.
Kari-kandel. *Rheed. mal.* 6. *p.* 59. *t.* 33.
Habitat in Indiæ uliginoſis.

RHIZOPHORA (*corniculata*) foliis ovatis, floribus confertis, fructibus arcuatis mucronatis. *Linn. ſp.* 635.
Mangium fruticoſum corniculatum. *Rumph. amb.* 3. *p.* 117. *t.* 77.
Habitat in Moluccis.

RHIZOPHORA (*caſeolaris*) foliis ovatis obtuſis, floribus ſolitariis, fructibus orbiculatis depreſſis mucronatis. *Linn. ſp.* 635.
Mangium caſeolare. *Rumph. amb.* 3. *p.* 111. *t.* 73. & 74.
Habitat in Moluccis.

RHI-

RHIZOPHORA (*caryophylloides*) foliis ovatis acuminatis, floribus confertis, fructibus conicis coronatis.
Mangium caryophylloides. *Rumph. amb.* 3. *p.* 119. *t.* 78.
β Mangle alba coriaria, folio denſiuſculo ſubrotundo glabro, fructu forma Caryophylli aromatici majore. *Plukn. alm.* 241. *t.* 204. *f.* 4.
Habitat in India.

GARCINIA (*Mangoſtana*) foliis ovatis, pedunculis unifloris. *Linn. ſp.* 635.
Mangoſtana. *Garzin act. angl.* 431. *t.* 1. *Bont. jav.* 115. *Rumph. amb.* 1. *p.* 132. *t.* 43.
Laurifolia javanenſis. *Banh. pin.* 461.
Habitat in Java.

GARCINIA (*celebica*) foliis lanceolatis, pedunculis trifloris. *Linn. ſp.* 635.
Mangoſtana celebica. *Rumph. amb.* 1. *p.* 134. *t.* 44.
Habitat in India.

CRATEVA (*Tapia*) inermis, foliis integerrimis, foliolis lateralibus baſi antica brevioribus. *Linn ſp.* 637. *Fl. zeyl.* 211.
Apioſcordon ſ. arbor americana triphyllos, Allii odore poma ferens. *Plukn. alm.* 34. *t.* 137. *f.* 7.
Malus americana trifolia, fructu pomi aurantii inſtar colorato. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 129. *t.* 67.
Anona trifolia, flore ſtamineo, fructu ſphærico ferrugineo ſcabro minore, allii odore. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 169.
Nurrvalla. *Rheed. mal.* 3. *p.* 49. *t.* 42.
Habitat in utraque India.

CRATAEVA (*Marmelos*) ſpinoſa, foliis ſerratis. *Linn. ſp.* 637. *Fl. zeyl.* 212.
Cucurbitifera trifolia ſpinoſa indica, fructu pulpa cydonii æmulo. *Plukn. alm.* 125. *t.* 170. *f.* 5.
Cydonis exotica. *Bauh. pin.* 435. quæ marmelos arbor. *Burm. zeyl.* 84.
Bilacus. *Rumph. amb.* 1. *p.* 197. *t.* 81.
Covalam. *Rheed. mal.* 3. *p* 37. *t.* 37.
Meſpilus indica trifolia ſpinoſa, odore Roſæ, marmelos dicta. Beli. cingh. *Herm. berb.*
Habitat in India.

Ex floribus aqua, odorem Roſarum æmulans, paratur, ex fructuum vero pulpa conficitur caro ſive marmelada antidyſenterica gratiſſima. *Herm. berb.*

TRIUMFETTA (*Bartramia*) foliis baſi integris *Linn. ſp.* 638.
Triumphetta floribus calyculatis, foliis rombeo-ovatis. *Jacq. amoen.* 22. *hiſt. t.* 9.
Bartramia. *Linn. Fl. zeyl.* 174.

Alcea indica, floribus roſaceis parvis, fructibus parvis quinque partitis hiſpidis lappaceis. *Burm. zeyl.* 9.
Malvinda floſculis puſillis ex luteo purpureis, foliis anguloſis. *D. Pryon.*
Lappula benghalenſis tetraspermos, Ribeſii folio, echinis orbicularibus ad foliorum ortum plurimis ſimul ſeſſilibus. *Plukn. alm.* 206. *t.* 41. *f.* 5.
Agrimonia maderaſpatana, folio rotundo ſingulari ſubtus incano. *Petiv. gaz.* 31. *t.* 32. *f.* 10.
Lappago amboinica. *Rumph. amb.* 6. *p.* 59. *t.* 25. *f.* 2.
Pulutan javanis, quæ differt foliis cordatis & ovatis.
Habitat in Indiis.

TRIUMFETTA (*Lappula*) foliis baſi emarginatis. *Linn. ſp.* 637. *Roy. lugdb.* 476.
Lappula bermudenſis althæoides ſpicata, fructu orbiculari majore. *Plukn. alm.* 206. *t.* 245. *f.* 7. cum qua Javanica optime convenit.
Habitat in India utraque.

PORTULACA (*oleracea*) foliis cuneiformibus, floribus ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 638. *Roy. lugdb.* 473. *n.* 1.
Portulaca ſativa & ſylveſtris latifolia & anguſtifolia. *Bauh. pin.* 288.
Portulaca domeſtica. *Lob. ic.* 388.
Golang Portulan javanis, quæ foliis minoribus.
Habitat in Indiis, Europa & Africa.

LYTHRUM (*fruticoſum*) foliis oppoſitis ſubtus tomentoſis, floribus decandris, corollis calyceque genitalibus brevioribus. *Linn. ſp.* 641.
Habitat in China.

DIGYNIA.

ZALEYA (*decandra*).
Tab. 36. *f.* 1. Wullei Tsjarne. Coromandeli incolis, unde miſſa.

Caul. herbaceus procumbens ſulcatus pubeſcens albicans. *Fol.* oppoſita petiolata ovalia margine integerrima. *Flor.* axillares minimi lutei. *Cal. per.* inferum pentaphyllum, foliolis ovatis intus coloratis. *Cor.* nulla. *Stam. filam.* duodecim capillaria, *Anth.* ſubrotundæ. *Piſt. germ.* ſuperum retuſum. *Styl.* duo filiformes. *Capſula* circumſciſſa bilocularis. *Sem.* duo, ſupra & infra, longiuſcula quadrangularia.

TRIGYNIA.

EUPHORBIA (*antiquorum*) aculeata ſubnuda triangularis articulata, ramis patentibus. *Linn. ſp.* 646. *Fl. zeyl. no.* 199. *Roy. lugdb.* 194. *n.* 2.
Euphorbium trigonum ſpinoſum rotundifolium. *Iſnard. act.* 1720. *p.* 50. *Burm. zeyl.* 96.

Eu-

Euphorbium verum antiquorum. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 23. *t.* 12.
Schadidacalli *Rheed. mal.* 2. *t.* 42. *p.* 81.
β Euphorbia aculeata nuda triangularis articulata, ramis erectis *Mill. dict.*
Euphorbium trigonum & tetragonum ſpinoſum, ramis compreſſis. *Iſnard. act.* 1720. *p.* 50. *Burm. zeyl.* 96.
Tithymalus aizoides triangularis & quadrangularis articuloſus & ſpinoſus, ramis compreſſis. *Commel. præl.* 55. *t.* 5.
Rangiferi cornua referens planta zeylanica ſandricalli zeylonenſibus. *Herm. par. pr.* 368.
Habitat in India.

EUPHORBIA (*neriifolia*) aculeata ſeminuda, angulis oblique tuberculatis. *Linn. ſp.* 648. *Fl. zeyl.* 200. *Roy. lugdb.* 194. *n.* 1.
Euphorbium afrum ſpinoſum, foliis latioribus non ſpinoſis. *Seb. theſ.* 1. *p.* 18. *t.* 9. *f.* 1.
Euphorbium ſpinoſum, amplo Nerii folio. *D. Iſnard. act.* 1720. *p.* 386.
Euphorbio-Tithymalus ſpinoſus, caule rotundo & anguloſo, Nerii foliis latioribus & anguſtioribus. *Burm. zeyl.* 95.
Tithymalus indicus ſpinoſus Nerii folio. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 25. *t.* 13.
Tithymalus zeylanicus ſpinoſus arboreſcens. *Plukn. phyt.* 369. *t.* 230. *f.* 4.
Tithymalus aizoides arboreſcens ſpinoſus, caudice angulari Nerii folio. *Commel. præl.* 22. *t.* 6. *Bradl.* 1. *p.* 25. *t.* 13.
Ligularia. *Rumph. amb.* 4. *p.* 88. *t.* 40.
Ela-calli. *Rheed. mal.* 2. *p.* 83. *t.* 43.
Habitat in India & Africa.

EUPHORBIA (*Tirucalli*) inermis ſeminuda fruticoſa filiformis erecta, ramis patulis determinate confertis. *Linn. ſp.* 649. *Roy. lugdb.* 195. *n.* 8.
Tithymalus ramoſiſſimus fruteſcens pene aphyllus. *Burm. zeyl.* 223.
Tithymalus indicus fruteſcens. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 27. *t.* 14.
Tithymalus arboreſcens, caule aphyllo. *Plukn. phyt.* 368. *t.* 319. *f.* 6.
Oſſifraga lutea. *Rumph. amb.* 7. *p.* 62. *t.* 29.
Tirucalli. *Rheed. mal.* 2. *p.* 85. *t.* 44.
Habitat in India.

EUPORBIA (*hypericifolia*) dichotoma, foliis ſerratis ovali-oblongis glabris, corymbis terminalibus, ramis divaricatis. *Linn. ſp.* 650. *Roy. lugdb.* 196. *n.* 16.
Euphorbia minima reclinata, foliolis ovatis denticulatis, floribus ſubumbellatis terminalibus lateralibusque. *Brown. jam.* 235.
Tithymalus americanus, floſculis albis. *Commel. præl.* 60. *t.* 60.
Tithymalus erectus acris Parietariæ foliis glabris, floribus conglomeratis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 197. *t.* 126.
Habitat in Indiis.

EU.

EUPHORBIA (*hirta*) dichotoma, foliis ſerrulatis ovatis acuminatis, pedunculis capitatis axillaribus, caulibus piloſis. *Linn. ſp.* 651. *Fl. zeyl.* 197.
Euphorbia reclinata minor ſubhirſuta, foliis ſerratis. *Brown. jam.* 234.
Tithymalus botryoides zeylanicus, cauliculis villoſis. *Burm. zeyl.* 223. *t.* 104.
Tithymalus botryoides major hirſutus zeylanicus, foliis & cauliculis villoſis. *Plukn. alm.* 373.
Eſula eſculenta. *Rumph. amb.* 6. *p.* 54. *t.* 23. *f.* 2.
Habitat in India.

EUPHORBIA (*pilulifera*) dichotoma, foliis ſerratis ovali-oblongis, pedunculis bicapitatis axillaribus, caule erecto. *Linn. ſp.* 651.
Tithymalus botryoides erectus, florum capitulis conjugatis & longiori pediculo inſidentibus. *Burm. zeyl.* 224. *t.* 105. *f.* 1. *Petiv. gazoph. t.* 80. *f.* 14.
Habitat in India.

EUPHORBIA (*parviflora*) ſubdichotoma, foliis ſerratis oblongis glabris, floribus ſolitariis, caule erectiuſculo alterne ramoſo. *Linn. ſp.* 652.
Tithymalus erectus, floribus rarioribus, foliis oblongis glabris integris. *Burm. zeyl.* 224. *t.* 105. *f.* 2.
Tithymalus tenellus indicus chamæciſes foliis, floſculis incarnatis. *Herm. zeyl.* 47.
Tithymalus malabaricus & zeylanicus argenteus, Buxi folio. *Herb. Garzin.*
Habitat in Zeylona.

EUPHORBIA (*thymifolia*) dichotoma, foliis ſerratis ovali-oblongis, capitulis axillaribus glomeratis ſubſeſſilibus, caulibus procumbentibus. *Linn. ſp.* 651. *Fl. zeyl.* 198. *Roy. lugdb.* 196. *n.* 15.
Tithymalus indicus annuus dulcis, floribus albis, caulibus viridantibus & rubentibus. *Plukn. alm.* 372. *t.* 113. *f.* 2.
Tithymalus exiguus procumbens chamæcyſe dictus. *Herm. lugdb.* 602.
β Tithymalus humilis ramoſiſſimus hirſutus, foliis Thymi ſerratis. *Burm. zeyl.* 225. *t.* 105. *f.* 3.
Habitat in India.

PENTAGYNIA.

Tab. 36. *f.* 2. GLINUS (*lotoides*) caule tomentoſo, foliis obovatis, verticillis rarioribus ſubpedunculatis.
Glinus. *Linn. ſp.* 603. *Gron. orient.* 143.
Alſine lotoides ſicula. *Boccon. ſicul.* 21. *t.* 11. *Moris. hiſt.* 2. *p.* 552.
Portulaca bætica, luteo flore, ſpuria aquatica. *Barr. rar.* 478. *ic.* 336.
Mercurialis incana, Veronicæ folio albo. *D. Kleinhof.* malaice Boelyongpiat.
Habitat in India aliiſque plagis.

GLI-



1 . GLINUS lotoides .
2 . ——— onoroides .
3 . CORCHORUS javanicus .



1. GLINUS lotoides.
2. ——— ononides.
3. CORCHORUS javanicus.

GLINUS (*ononides*) caule glabro, foliis obovatis, verticillis numeroſis ſeſſilibus. *Tab* 36. *f.* 2.
Planta repens argentea tota, quando erumpit e terra: malaice aud-gam pait. *D. Pryon.*

Præcedenti minor & habitu differens; *caul.* glaber, qui in antecedenti tomento obductus. *Fol.* oppoſita ramis axillaribus; *Verticilli* ad ſingulas alas ſeſſiles multiflori. *Calycis* foliola linearia acuminata glabra. *Corolla* lutea calycis magnitudine.

GLINUS (*dictamnoides*) caule rugoſo, foliis orbiculatis planis tomentoſis, floribus axillaribus ſubverticillatis.
Alſine lotoides, dictamni cretici facie, maderaſpatana. *Plukn. alnalth.* 10. *t.* 356. *f.* 6
Habitat in India.

OCTOGYNIA.

ILLICIUM (*aniſatum*). *Linn. ſp.* 664.
Somo vulgo ſkimmi. *Kæmpf. amoen.* 880. *t.* 881.
Habitat in Japonia & China.

ICOSANDRIA MONOGYNIA.

PSIDIUM (*pyriferum*) foliis lineatis obtuſiuſculis, pedunculis unifloris. *Linn. ſp.* 672. *Fl. zeyl.* 192.
Guajava alba dulcis. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 121. *t.* 63. *Merian. ſurin.* 19. *t.* 19.
Guajava foliorum angulis quadrangulis, fructu oblongo. *Trew. ehr. t.* 43.
Guajavos fructu pallido dulci. *Burm. zeyl.* 112.
Cujavus domeſtica. *Rumph. amb.* 1. *p.* 140. *t.* 47. *Boym. fl. ſinenſ. K. f. K.*
Pela. *Rheed. mal.* 3. *p.* 31. *t.* 34.
Habitat in Indiis.

PSIDIUM (*pomiferum*) foliis lineatis acuminatis, pedunculis trifloris. *Linn. ſp.* 672.
Guajava alba acida, fructu rotundiore. *Plukn. alm.* 181. *t.* 193. *f.* 4.
Guajabo pomifera indica, pomis rotundis. *Bauh. pin.* 437.
Cujavus agreſtis. *Rumph. amb.* 1. *p.* 142. *t.* 48. *Merian. ſurin.* 57. *t.* 57. *Boym. fl. ſinenſ. F. f. F.*
Guajava ſylvatica, flore pentapetalo albo, fructu viridi, mali facie, pulpa interiore rubra, eſculenta tota. *D. Pryon.*
Malacka pela. *Rheed. mal.* 3. *p.* 33. *t.* 35.
Habitat in Indiis.

PSIDIUM (*cujavillus*) foliis lineatis ovato-lanceolatis, pedunculis ſubbifloris.
Cujavillus. *Rumph. amb.* 1. *p.* 145. *t.* 49.
Habitat in India.

Folia in ſpecimine ſicco, hoc nomine ex Java miſſo, ſunt profunde lineata duriuſcula ferrugineo tomentoſa.

EUGENIA (*malaccenſis*) foliis integerrimis, pedunculis ramoſis lateralibus. *Linn. ſp.* 672. *Fl. zeyl.* 187.
Perſici officulo fructus malaccenſis rubens. *Bauh. pin.* 441.
Jambos ſylveſtris, fructu rotundo, Ceraſi magnitudine. *Burm. zeyl.* 125.
Jamboſa domeſtica. *Rumph. amb.* 1. *p.* 121. *t.* 37 & 38.
Nati-ſchambu. *Rheed. mal.* 1. *p.* 29. *t.* 18. *Raj. hiſt.* 1748.
Arbuſor Greſſer incolis.
Habitat in India.

EUGENIA (*jambos*) foliis integerrimis, pedunculis ramoſis terminalibus. *Linn. ſp.* 672. *Fl. zeyl.* 188.
Jambos malaccenſis, fructu aureo, roſam ſpirante. *Burm. zeyl.* 124.
Jamboſa ſylveſtris alba. *Rumph.* 1. *p.* 127. *t.* 39.
Perſici officulo fructus malaccenſis ex candido rubeſcens. *Bauh. pin.* 441.
Malacca ſchambu. *Rheed. mal.* 1. *p.* 27. *t.* 17.
Jamboe Tjeroyoe, ajer mauhar. Incolis.
Habitat in India.

EUGENIA (*aquea*) foliis integerrimis, pedunculis quadrifloris, pomis quinquelocularibus.
Jamboſa aquea. *Rumph. amb.* 1. *p.* 126. *t.* 38. *f.* 2.
Habitat in Amboina.

EUGENIA (*uniflora*) foliis integerrimis, pedunculis unifloris lateralibus. *Linn. ſp.* 673. *Fl. zeyl.* 189. *Roy. lugdb.* 265.
Eugenia indica myrti folio deciduo, flore albo, fructu ſuaverubente molli leviter ſulcato & odoro. *Mich. gen.* 226. *t.* 108.
Myrtus indica, foliis rigeſcentibus latis ac recurvis parum odoratis. *Till. piſ.* 117. t. 44.
Jambou Oudang. Incolis.
Habitat in India.

EUGENIA (*acutangula*) foliis crenatis, pedunculis terminalibus, pomis oblongis acutangulis. *Linn. ſp.* 673. *Fl. zeyl.* 190.
Jambos ſilveſtris ſamſtra radi dictus alter. *Raj. hiſt.* 1480. *Commel. Fl. mal.* 36.
Butonica terreſtris rubra. *Rumph. amb.* 3. *p.* 181. *t.* 115.
Tjeria-ſamſtra vadi. *Rheed. mal.* 4. *p.* 15. *t.* 7.
Habitat in India.

EU-

EUGENIA (*racemoſa*) foliis crenatis, racemis longisſimis, pomis ovatis. *Linn. ſp.* 673. *Fl. zeyl.* 191.
Butonica ſylveſtris alba. *Rumph. amb.* 3. *p.* 181. *t.* 116.
Samſtra vadi ſ. Caipatſiambu. *Rheed. mal.* 4. *p.* 11. *t.* 6.
Habitat in India.

MYRTUS (*communis*) floribus ſolitariis, involucro diphyllo. *Linn. ſp.* 673. foliis ovato-lanceolatis.
Myrtus amboinenſis. *Rumph. amb.* 2. *p.* 78. *t.* 18.
Caria-Poeti incolis.
Habitat in Aſia, Africa, Europa.

MYRTUS (*cumini*) pedunculis multifloris, foliis lanceolato-ovatis. *Linn. ſp.* 675. *Fl. zeyl.* 185.
Jamboſa ceramica. *Rumph. amb.* 1. *p.* 130. *t.* 41.
Aukenda zeylanenſibus, Caria-Poeti. Javanis.
Arbor zeylanica cuminum redolens. *Burm. zeyl.* 27.
Habitat in Zeylona & Amboina.

In Hermanni herbario occurrit planta floribus corymboſis longe pedunculatis, cujus Folia cum hacce conveniunt, ubi ab ipſo Herm. notatur: Fructus & cortex hujus Arboris Oleum præbent maxime ſpirituoſum, Cuminum redolens.

MYRTUS (*zeylanica*) pedunculis multifloris, foliis ovatis ſubpetiolatis. *Linn. ſp.* 675. *Fl. zeyl.* 182.
Myrtus zeylanica odoratiſſima, baccis niveis monococcis. *Herm. lugdb.* 434. *t.* 435.
Myrtoides foliis ovatis. *Linn. H. Cliff.* 489. *Roy. lugdb.* 535.
Vitis idæa zeylanica odoratiſſima. *Burm. zeyl.* 230.
Habitat in Zeylona.

Foliorum decoctum magni uſus eſt apud Cinghalenſes in morbis chronicis a phlegmate ortis; baccæ ſunt niveæ molliuſculæ modice cum dulcedine adſtringentes. *Herm. herb.*

MYRTUS (*androſæmoides*) pedunculis trifido-multifloris, foliis ſubovalibus ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 675. *Fl. zeyl.* 184.
Arbor foliis Androſæmi latioribus, plurimas baccas in ſummitate ramulorum ferens. *Burm. zeyl.* 29.
Habitat in Zeylona.

MYRTUS (*caryophyllata*) pedunculis trifido-multifloris, foliis obovatis. *Linn. ſp.* 675. *Fl. zeyl.* 183.
Caryophyllus aromaticus indiæ occidentalis, foliis & fructu rotundis. *Plukn. alm.* 188. *t.* 155. *f.* 3.

Ceraſus humilis umbellata, floſculis incarnatis, fructu mortinghos dicto. *Burm. zeyl.* 57.
Habitat in Indiis.

MYRTUS (*pimenta*) foliis alternis. *Linn. ſp.* 676. *Fl. zeyl.* 186.
Myrtus arborea aromatica, foliis laurinis. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 76. *t.* 191. *f.* 1.
Myrtus foliis oblongo-ovatis glabris alternis, racemis terminalibus & lateralibus. *Brown. jam.* 247.
Caryophyllus aromaticus americanus, Lauri acuminatis foliis, fructu orbiculari. *Plukn. alm.* 88. *t.* 155. *f.* 4.
Habitat in Indiis.

MYRTUS (*leucadendra*) baccis ſeſſilibus urceolatis, foliis lanceolatis. *Linn. ſp.* 67.
Myrto leucadendron foliis integris lanceolato-inflexis, floribus ſtaminoſis, fructibus urceolatis. *Burm. obſ.* ad *lib.* 2. *c.* 25. *Herb. Amb. Rumph.*
Daun Kitsjil & Daun Bezbari incolis.
Arbor alba. *Rumph. amb.* 2. *p.* 72. *t.* 16. major. &c. *Tab.* 17. minor Cajus Poeti ſpecies.
Habitat in Amboina & Java.

MYRTUS (*ſaligna*) ſpicis terminalibus, baccis ſeſſilibus urceolatis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis.
Arbor alba minor, Daun poeti kitsjil. *Rumph. amb.* 2. *p.* 76. *t.* 17. *f.* 2.
Myrto Leucadendron foliis lanceolatis acutis, floribus & fructu ſpicatis. *Burm. ibid. in notis.*
Habitat in Amboina & Java, unde miſſa.

Differt a præcedenti quod multo tenerior, *ramis* pluribus ſparſis, *folia* ſalicis anguſtifolii inſtar, *ſpicæ* terminales, *floribus* oppoſitis, *ſtylus* perſiſtens, *baccæ* urceolatæ. Binæ ultimæ arbores pretioſum & eximium valde oleum caju poeti præbent, in morbis paralyticis & arthriticis adeo decantatum.

PUNICA (*Granatum*) foliis lanceolatis, caule arboreo. *Linn. ſp.* 676.
Malus punica ſylveſtris & ſativa. *Bauh. pin.* 438.
Malum Granatum. *Rumph. amb.* 2. *p.* 94. *t.* 24. *f.* 1.
Granata punica mala. *Blackw. herbal. t.* 97. & 142.
β Granata malus zeylanica ſpinoſa. *Burm. zeyl.* 111. differt foliis latioribus a ſpeciminibus, quæ Coromandeli collecta fuere, ubi adſcriptum invenitur: differt hic frutex ab inferiore parte ſpinis magnis & parvis, quibus obſitus eſt.
Creſcit in India & in Europæ variis regionibus, colitur in hortis.

AMY-

AMYGDALUS (*nana*) foliis baſi attenuatis. *Linn. ſp.* 677. *Roy. lugdb.* 267. *n.* 3.
Amygdalus indica nana. *Plukn. alm* 28. *t.* 11. *f.* 3. *Mill. dict. t.* 28. *f.* 2.
Armeniaca perſicæ foliis, fructu exſucco villoſo. *Amm. ruth.* 273. *t.* 30.
Habitat in India.

DIGYNIA.

CRATAEGUS (*indica*) foliis lanceolatis ſerratis, caule inermi, corymbis ſquamoſis. *Linn. ſp.* 683. ubi deſcr.
Habitat in India.

TRIGYNIA.

SESUVIUM (*Portulacaſtrum*) *Linn. ſp.* 684. *Jacq. hiſt. t.* 95.
Portulaca foliis lanceolatis convexis, pedunculis unifloris. *Linn. ſp.* 1. *p.* 446. *Loeſl. it.* 191.
Portulaca curaſſavica, anguſto longo lucidoque folio procumbens, floribus rubris. *Plukn. alm.* 303. *t.* 216. *f.* 1. *Herm. par.* 212. *t.* 212.
Portulaca mariana latifolia, flore ſuaverubente. *Plum. ſp.* 6. *ic.* 223. *f.* 2.
Portulaca aizoides maritima procumbens, flore purpureo. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 204.
Crithmus indicus. *Rumph. amb.* 6. *p.* 165. *t.* 72. *f.* 1.
Portulaca javanica, foliis oppoſitis, flore ſolitario. Gelang laut incolis dicta. *D. Kleinhof.*

Hujus caules glaberrimi fungoſi, foliis linearibus ad apices incraſſatis, longioribus quam in citatis figuris.

POLYGYNIA.

ROSA (*indica*) germinibus ovatis, pedunculisque glabris, caule ſubinermi, petiolis aculeatis. *Linn. ſp.* 705. ubi deſcr.
Roſa cheuſan glabra, juniperi fructu. *Petiv. gaz.* 56. *t.* 35. *f.* 11.
Roſa verſicolor javanica plena & chinenſis. *D. Pryon.*
Foo-ſeu vulgo Ibara. *Kæmpf. amoen.* 862.
Habitat in Aſia & China.

Chinenſis planta multo tenerior & minor eſt Javanica. Variant *foliis* ternis & quinis, *petiolis* ad baſin foliolis inferioribus ſæpe decurrentibus cum impari pinnatis, ſuperioribus ternis, *Pedunculi* in noſtris ſpeciminibus uniflori, *floribus* ſimplicibus & plenis intenſe purpureis, *fructus* magnitudine ſorbi, at magis oblongi, *calyce* perſiſtente nunc integerrimo nunc laciniato.

RUBUS (*parvifolius*) foliis ternatis ſubtus tomentoſis, caule petiolisque aculeis recurvis. *Linn. ſp.* 707. ubi deſcr.
Rubus moluccanus parvifolius. *Rumph. amb.* 5. *p.* 88. *t.* 47. *f.* 1.
Habitat in India.

RUBUS (*moluccanus*) foliis ſimplicibus cordatis lobatis, caule aculeato decumbente. *Linn. ſp.* 707.
Rubus moluccanus latifolius. *Rumph. amb.* 5. *p.* 88. *t.* 47. *f.* 2.
Rubus idæus ſylveſtris & montanus, Ajam Bahuku incolis dictus. *D. Kleinhof.*
Habitat in Moluccis & Java.

Hujus varietas ex Indicis ſeminibus nobis enata eſt, caule pilis rubicundis ſcabro, foliis quinquelobis ſerratis.

CALYCANTHUS (*præcox*) petalis interioribus minutis. *Linn. ſp.* 718.
Jasminum flore pleno ex ſuavi fætido, fructu turbinato obai S. Robai. *Kæmpf. amæn.* 878. *t.* 879.
Habitat in Japonia.

POLYANDRIA MONOGYNIA.

RHEEDIA (*Javanica*) foliis lanceolatis, umbellis pedunculatis.
Habitat in Java.

Rami articulati læves ſtricti. *Ramuli* & *genicula* compreſſa. *Folia* oppoſita lanceolata petiolata integerrima glabra. *Petioli* breves pubeſcentes. *Pedunculi* ex alis foliorum ſæpius terni ad medium quadrifidi, *pedicellis* unifloris. *Flores* lutei. *Foliatura* & *umbellis* ab Americana differt, confer. *f.* 4. *t.* 358. *Plukn. phyt.* quæ ejusdem videtur generis.

CAPPARIS (*carandas*) pedunculis ſubtrifloris, foliis oppoſitis ovatis acuminatis, ſpinis bifurcatis.
Carandas. *Rumph. amb.* 7. *p.* 57. *t.* 25.

Javanica differt foliis ſubcordatis, pedunculis trifloris.

CAPPARIS (*zeylanica*) pedunculis ſolitariis unifloris, ſtipulis ſpinoſis, foliis ovatis utinque acutis. *Linn. ſp.* 720. *Fl. zeyl.* 210.
Capparis zeylanica duplicatis ſpinis, folio acuto. *Petiv. muſ.* 625.
Capparis ſpinoſa, foliis oblongis. *Burm. zeyl.* 53.
Capparis indica ſpinoſa, anguſtiore ſalicis folio. *Plukn. mant.* 36.
Habitat in Zeylona.

CAPPARIS (*ſepiaria*) pedunculis umbellatis, ſtipulis ſpinoſis, foliis annuis ovatis emarginatis. *Linn. ſp.* 720. ubi deſcr.
Arbuſcula baccifera ſcandens ſpinoſa, foliis buxi pallidioribus. *Plukn. mant.* 27. *t.* 338. *f.* 3.
Habitat in India.

CAPPARIS (*Baducca*) pedunculis ſubſolitariis, foliis perſiſtentibus ovato-oblongis nudis, determinate confertis. *Linn. ſp.* 720.
Capparis alia arboreſcens, Lauri folio, fructu oblongo ovato. *Plum. ſp.* 7. *ic.* 73. *f.* 2.

Brey-

Breynia fruticoſa, foliis ſingularibus oblongo-ovalibus ſuperne nitidis, ſiliquis minoribus teretibus æqualibus. *Brown. jam.* 246. *t.* 27. *f.* 2.
Badueca. *Rheed. mal.* 6. *p.* 105. *t.* 57. *Raj. dendr.* 1630.
Habitat in Indiis.

CAPPARIS (*carandas*) foliis oppoſitis ovatis, ſpinis bifurcatis.
Carandus. *Rumph. amb.* 7. *p.* 57. *t.* 25.
Habitat in Java & Amboina.

ARGEMONE (*mexicana*) capſulis quinquevalvibus, foliis ſpinoſis. *Linn. ſp.* 727. *Roy. lugdb.* 479. *Merian. ſurin.* 24. *t.* 24.
Papaver ſpinoſum. *Bauh. pin.* 171. *prodr.* 93. *t.* 92. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 93.
Papaver ſpinoſum luteum, foliis albis venis notatis. *Moris. hiſt.* 2. *p.* 277. *ſ.* 3. *t.* 14. *f.* 5.
Habitat in Indiis.

CAMBOGIA (*Gutta*) *Linn. ſp.* 728. *Fl. zeyl.* 195.
Arbor indica, Gummi guttam fundens, fructu dulci rotundo cerasi magnitudine, carcapuli Acoſtæ. *Herm. muſ. zeyl.* 26. *Burm. zeyl.* 27.
Carcapuli Acoſtæ, fructu malo aureo ſimili. *Plukn. alm.* 81.
Coddam pulli. *Rheed. mal.* 1. *p.* 41. *t.* 24.
Habitat in India.

NYMPHÆA (*Lotus*) foliis cordatis dentatis. *Linn. ſp.* 729. *Fl. zeyl.* 194.
Nymphæa foliis amplioribus profunde crenatis ſubtus areolatis. *Brown. jam.* 343.
Nymphæa indica, flore candido, folio in ambitu ſerrato. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 252. *Raj. ſuppl.* 630.
Nymphæa indica tuberoſa, foliis per marginem crenatis, flore incarnato. *Burm. zeyl.* 173.
Nymphæa indica minor, Taratti kitsjil. *Rumph. amb.* 6. *p.* 172. *c.* 51.
Lotus ægyptia. *Alp. ægypt.* 103. *exot.* 214. *t.* 213. 216. 218. 220. 222. 226.
Ambel. *Rheed. mal.* 11. *p.* 51. *t.* 26.
Habitat in aquis Indiæ, Africæ, Americæ.

NYMPHÆA (*Nelumbo*) foliis peltatis undique integris. *Linn. ſp.* 730. *Fl. zeyl.* 193.
Nymphæa indica, faba ægyptia dicta, flore incarnato. *Herm. par.* 205. *t.* 205.
Nymphæa fabifera, indiæ paludibus gaudens, foliis amplis umbilicatis, pedunculis ſpinoſis, flore roſeo purpureo. *Plukn. alm.* 267. *t.* 322. *f.* 1.
Nymphæa alba indica maxima fabifera, flore albo. *Burm. zeyl.* 173.
Nymphæa foliis orbiculatis peltatis ſubtus radiatis. *Brown. jam.* 343.
Taratti. *Rumph. amb.* 6. *p.* 168. *t.* 73.
Tamara. *Rheed. mal.* 11. *p.* 59. *t.* 30. & 31. Bem-Tamara. *t.* 32.
Habitat in Indiis.

NYM-

NYMPHÆA (*nouchali*) foliis ovalibus ſubpetiolatis integerrimis.
Nouchalei, Nymphea aquatica, flore cæruleo. *Dni. Outgaerden.*
Habitat Coromandeli.

Rad. alba, magnitudine pugni. *Fol.* ovalia integerrima, *petiolis* brevibus incurvis. *Cor.* polypetala. *Stam. filam.* apicibus cæruleis. *per. drupa* viridis polyſperma. *Sem.* rubra rotunda magnitudine ſeminum ſinapios.

BIXA (*Orellana*). *Linn. ſp.* 730. *Roy. lugdb.* 477.
Mitella americana maxima tinctoria. *Tourn. hiſt.* 242. *Boerh. lugdb.* 208.
Orleana folliculis lappaceis. *Plukn. alm.* 272. *t.* 209. *f.* 4. *Comm. H. Amſt.* 1. *p.* 65. *t.* 33.
Urucu *Piſonis.* 133. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 52. 181. *f.* 1.
Arbor mexicana, fructu Caſtaneæ, coccifera. *Bauh. pin.* 419.
Caſſomba-kling. Javanis. D. *Kleinhof.*
Habitat in Indiis.

MAMMEA (*aſiatica*) ſtaminibus flore longioribus. *Linn. ſp.* 731. ubi deſcr. *Oſb. it.* 278.
Mali perſicæ mammeyæ folio longiore arbor maxima, cortice ſulcato cinereo amaro. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 124.
Habitat in Java & Jamaica.

OCHNA (*ſquarroſa*) racemis lateralibus. *Linn. ſp.* 731. *Fl. zeyl.* 209.
Jabotapita cinnamomi folio, floribus ſpicatis. *Burm. zeyl.* 123. *t.* 56.
β Arbor africana ſubrotundo folio, margine denticulis acutis aſpero, floribus pentapetalis atropurpureis. *Plukn. alm.* 41. *t.* 263. *f.* 1. 2.
Habitat in Zeylona & Africa.

CALOPHYLLUM (*Inophyllum*) foliis ovalibus. *Linn. ſp.* 732. *Fl. zeyl.* 201.
Inophyllum flore octifido. *Burm. zeyl.* 131.
Nucifera arbor ſempervirens indica prælongis foliis venuſte venoſis. *Plukn. mant.* 136.
Arbor indica mali medicæ amplioribus foliis. *Plukn. alm.* 41. *t.* 147. *f.* 3.
Bintangor maritima. *Rumph. amb.* 2. *p.* 211. *t.* 71.
Ponna ſeu Ponna-maram. *Rheed. mal.* 4. *p.* 79. *t.* 38.
Tſjam poelang. ſeu Bintanger laut Javanis.
Habitat in India.

CALOPHYLLUM (*Calaba*) foliis ovatis obtuſis. *Linn. ſp.* 732. *Jacquin. hiſt.* 165. *Roy. lugdb.* 476.
Inophyllum flore quadrifido. *Burm. zeyl.* 130. *t.* 60.
Tſierou ponna. *Rheed. mal.* 4. *p.* 81. *t.* 39.
Tandjone kanki Javanis.
Habitat in Indiis.

CA-

CALOPHYLLUM (*Nagaſſarium*) foliis baſi attenuatis lanceolatis aveniis.
Nagaſſarium. *Rumph. amb* 7. *p.* 3. *t.* 2.
Nagaſſi javanis. *D. Kleinhof.*
Habitat in Amboina & Java, unde anno 1759. miſſa.

CALOPHYLLUM (*Akara*) foliis ovatis acuminatis, floribus terminalibus paniculatis.
Akara patsjoti. *Rheed. mal.* 5. *p.* 15. *t.* 8.
β Arbor indica mali aurantii foliis obtuſioribus. *Plukn. alm.* 3. *t.* 142. *f.* 2. ?
Habitat in India.

CALOPHYLLUM (*Soulattri*) foliis oblongo-ovatis lineatis glaberrimis, floribus lateralibus pedicellatis.
Soulattri. Javanis.
Habitat in Java.

MICROCOS (*paniculata*) panicula terminali. *Linn. ſp.* 733. *Fl. zeyl.* 207.
Microcos foliis alternis oblongis acuminatis. *Burm. zeyl.* 159. *t.* 74.
Cornus malabarica, folio cuſpidato, oſſiculo tomento obſito. *Commel. Fl. mal.* 80.
Arbor malabarica mucronatis firmioribus venoſis foliis, floribus ad ſummum ramulorum coronantibus. *Plukn. alm.* 40. *t.* 262. *f.* 3.
Schageri-cottam. *Rheed. mal.* 1. *p.* 105. *t.* 56.
Habitat in India.

MICROCOS (*lateriflora*) pedunculis axillaribus confertis dichotomis. *Linn. ſp.* 734. *Fl. zeyl.* 208.
Arbor javanica montana lauri folio. *D. Kleinhof.*
Hamdamanias. *Herm. zeyl.* 113.
Habitat in Zeylona.

ELÆOCARPUS (*ſerrata.*) *Linn. ſp.* 734. *Fl. zeyl.* 206.
Elaiocarpus foliis lauri ſerratis, floribus ſpicatis. *Burm. zeyl.* 93. *t.* 40.
Laurus indica ſerratifolia inodora, fructu olivæ magnitudine & forma, nucleis criſpis lapideis, lauro cераſo cluſii congener. *Herm. zeyl.* 9.
Olea ſylveſtris malabarica, fructu dulci. *Raj. hiſt.* 1546.
Prunus zeylanica lauri folio, veralu cinghalenſibus. *Raj. dendr.* 42.
Ganitrus. *Rumph. amb.* 3. *p.* 160. *t.* 101.
Perin-Kara. *Rheed. mal.* 4. *p.* 51. *t.* 24.
Habitat in India.

MESUA (*ferrea*) foliis lanceolatis. *Linn. ſp.* 734. *Fl. zeyl.* 203.
Arbor naghas ſeu ferrea. *Burm. zeyl.* 28. *Herm. zeyl.* 7.
β Caſtanea indica florida. *Raj. hiſt.* 1680.
Belutta-tsjampakan. *Rheed. mal.* 3. *p.* 63. *t.* 53.
Habitat in India.

VATERIA (*indica*). *Linn. ſp.* 734. *Fl. zeyl.* 204.
Amygdalo adfinis indica, fructu umbilicato, nucleo nudo, cortice pulvinato trifido tecto. *Raj. hiſt.* 1482. *Plukn. alm.* 28.
Pænoe. *Rheed. mal.* 4. *p.* 33. *t.* 15.
Habitat in India.

LAGERSTROEMIA (*indica*) *Linn. ſp.* 734.
Tsjikin. *Rumph. amb.* 7. *p.* 61. *t.* 28.
Habitat in Chinæ montibus & in Amboina, colitur in hortis.

THEA (*bohea*) floribus hexapetalis. *Linn. ſp.* 734.
Thea. *Kæmpf. amœn.* 605. *t.* 606.
Thee ſinenſium. *Breyn. cent.* 111. *t.* 112. *ic.* 17. *t.* 3. *Boccon. muſ.* 114. *t.* 91.
Thee frutex. *Bart. act.* 4. *p.* 1. *t.* 1. *Bont. jav.* 87. *t.* 88. *Barr. rar.* 128. *t.* 904.
Chaa. *Bauh. pin.* 147.
Euonymo affinis arbor orientalis nucifera, flore roſeo. *Plukn. alm.* 139. *t.* 88. *f.* 6.
Habitat in China & Japonia.

THEA (*viridis*) floribus enneapetalis. *Linn. ſp.* 735. *Hill. exot. t.* 22.
Habitat in China.

CARYOPHYLLUS (*aromaticus.*) *Linn. ſp.* 735.
Caryophyllus aromaticus, fructu oblongo. *Bauh. pin.* 410.
Caryophyllus aromaticus Indiæ orientalis, fructu clavato monopyreno. *Plukn. alm.* 88. *t.* 155. *f.* 1.
Caryophyllus. *Cluſ. exot.* 16. *Rumph. amb.* 2. *t.* 1, 2, 3.
β Caryophyllus malabaricus. *Plukn. alm.* 88. *t.* 274. *f.* 2.
Habitat in Moluccis.

Tab. 37. *f.* 1. DELIMA (*ſarmentoſa*) *Linn. ſp.* 736. *Fl. zeyl.* 205.
Frutex indicus ſarmentoſus, foliis hiſpidis rigidis. *Burm. zeyl.* 101.
Piripu. *Rheed. mal.* 7. *p.* 101. *t.* 54.
Koroswel cingalenſium. *Herm. herb.* ubi notatur: quod idem ſit, ac lævigare, folia enim, cum ſint ſcabra denſa & aſpera, ab incolis ad quæcunque læviganda uſurpantur.
Habitat in Zeylona & Malabaria.

CISTUS (*ægyptiacus*) herbaceus erectus ſtipulatus, foliis lineari-lanceolatis petiolatis, calycibus inflatis corolla majoribus. *Linn. ſp.* 742.
Cyticiſtus foliis inferioribus confertis, ſuperioribus oppoſitis. *Burm. zeyl.* 85. *t.* 36.
Cytiſus zeylanicus fruticoſus humilis, ſiliquis anguſtis ericæ folio. *Herm. zeyl.* 34.
Habitat in Ægypto & Zeylona.

COR.



1 . DELIMA *sarmentosa* .
2 . CORCHORUS *trilocularis* .

37



1. **DELIMA** *sarmentosa*.
2. **CORCHORUS** *trilocularis*.

CORCHORUS (*olitorius*) capſulis oblongis ventricoſis, foliorum ſerraturis infimis ſetaceis. *Linn. ſp* 746. *Fl. zeyl.* 213. *Roy. lugdb.* 478. *n.* 1.
Corchorus quod eryſimum latifolium, ſiliquis ſeſami. *Herm. zeyl.* 31. *Burm. zeyl.* 75.
Corchorus. *Cam. hort.* 47. *t.* 12.
Alcea cibaria vel corchorus americanus, carpini folio, capſula quintuplici longa. *Plukn. alm.* 17. *t.* 127. *f.* 4.
Habitat in Indiis.

CORCHORUS (*capſularis*) capſulis ſubrotundis depreſſis rugoſis. *Linn. ſp.* 746. *Fl. zeyl.* 214.
Corchorus foliorum infimis ſerraturis minoribus. *Linn. H. Cliff.* 210. *Roy. lugdb.* 478 *n.* 2.
Alcea olitoria ſive corchorus americanus, prælongis foliis, capſula ſubrotunda ſtriata brevi. *Plukn. alm.* 18. *t.* 255. *f.* 4.
Selagoeri lacki lacki ſeu mas. *D. Pryon.*
Habitat in India.

CORCHORUS (*æſtuans*) capſulis oblongis ſexſulcatis ſexcuſpidatis, foliis cordatis, infimis ſerraturis ſetaceis. *Linn. ſp.* 746.
Alcea cibaria ſ. corchorus americana, carpini foliis, ſextuplici capſula longiore. *Plukn. phyt.* 17. *t.* 127. *f.* 3.
Planta folio ſelagoeri rugoſo. D. *Kleinhof.*
Selagoeri parampuan ſeu fæmina. *D. Pryon.*
Habitat in Indiis.

CORCHORUS (*javanicus*) capſulis ſubrotundis hiſpidis, foliis ovato lanceolatis æqualibus ſerratis, ſtipulis ſetaceis. *Tab.* 36. *f.* 3.
Bonporroetang. Pulutan. Javanis.
Habitat in Java.

Stip. ad ſingulum petiolum. *cal.* ariſtati. *cor.* purpurea. *capſ.* hiſpida.

CORCHORUS (*trilocularis*) capſulis lineari-ſiliquoſis ſexſulcatis tricuſpidatis, foliis oblongis, ſerraturis æqualibus, infimis ſetaceis. *Tab.* 37. *f.* 2.
Habitat in India, juxta *Garcini* herbarium.

Caul. fruticoſus, *Ramis* erectis. *Fol.* lineari-oblonga, ſerraturis æqualibus, ad baſin folii productioribus. *Ped.* axillares ſolitarii, bini, terni. *capſulæ* lineares ſiliquoſæ trivalves, cuſpidibus tribus incurvis ad apicem valvularum, per maturitatem fiſſarum.

STRATIOTES (*aliſmoides*) foliis cordatis. *Linn. ſp.* 754. *Fl. zeyl.* 223. *Roy. lugdb.* 10.
Sagittariæ affinis malabarenſis latiſſimo folio, floribus ex albo trifoliatis. *Plukn. alm.* 326.
Sagittæ aut plantaginis aquaticæ nervoſis foliis, floribus tripetalis in ſingulis caulibus ſingulis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 633.
Ottel-ambel. *Rheed. mal.* 11. *p.* 95. *t.* 46.
Habitat in India.

POLYGYNIA.

DILLENIA (*indica.*) *Linn. ſp.* 754.
Malus roſea malabarica, ſyalita dicta. *Plukn. mant.* 124.
Songium. *Rumph. amb.* 2. *p.* 14. *t.* 45.
Syalita. *Rheed. mal.* 3. *p.* 39. *t.* 38, 39.
Habitat in Malabaria.

LIRIODENDRON (*liliifera*) foliis lanceolatis. *Linn. ſp.* 755.
Sampacca montana. *Rumph. amb.* 2. *p.* 204. *t.* 69.
Habitat in Amboina.

MICHELIA (*Champaca*) foliis lanceolatis. *Linn. ſp.* 756. *Fl. zeyl.* 144.
Uvifera arbor orientalis, folio oblongo. *Herm. prodr.* 385. *Plukn. alm.* 394.
Arbor procera, hajing halia dicta, floribus oblongis luteis odoratis. *Burm. zeyl.* 51.
Tsjampacca indorum ſive arbor uvifera indica, foliis lauri americanæ. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 101.
Sampacca. *Rumph. amb.* 2. *p.* 199. *t.* 67.
Champacam. *Rheed. mal.* 1. *p.* 31. *t.* 19.
Tsjampaka laut. Javanis.
Habitat in India.

MICHELIA (*euonymoides.*) foliis ovatis.
Sampacca ſylveſtris. *Rumph. amb.* 2. *p.* 202. *t.* 68.
Tsjampacca conneng. Javanis.
β Euonymus caudice non ramoſo, folio alato, fructu rotundo tripyreno. *Sloan. jam.* 2. *t.* 210. *f.* 2. 3.
Habitat in Indiis, ubi ob fragrantem odorem ſæpe colitur.
In ſpeciminibus javanicis Folia magis ovata quam in citatis figuris.

UVARIA (*zeylanica*) foliis integerrimis. *Linn. ſp.* 756. *Fl. zeyl.* 224.
Uva ſylveſtris zeylanica, mali aurantii ſapore. *Burm. zeyl.* 231.
Frutex baccifer, fructu ad ſingulos flores multiplici. *Raj. hiſt.* 1636.
Funis muſarius. *Rumph. amb.* 5. *p.* 78. *t.* 42.
Narum-panel. *Rheed. mal.* 2. *p.* 11. *t.* 9. *f.* 2.
β Cananga. *Rumph. amb.* 2. *p.* 195. *t.* 65, 66.
Habitat in India.

UVARIA (*japonica*) foliis ſerratis. *Linn. ſp.* 756.
Frutex viſcoſus procumbens, folio telephii vulgaris æmulo, fructu racemoſo. *Kæmpf. amoen.* 476. *t.* 477.
Habitat in Japonia.

ANNONA (*muricata*) foliis ovali-lanceolatis glabris nitidis planis, pomis muricatis. *Linn. ſp.* 756. *Roy. lugdb.* 494. *n.* 1.
Anona indica latifolia, fructu ſquamoſo aſpero. *Plukn. alm.* 31. *t.* 134. *f.* 2.
Anona indica, fructu conoide viridi, ſquamis veluti aculeato. *Plukn. alm.* 32. *t.* 135. *f.* 2.
Anona. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 133. *t.* 69. *Merian. ſurin.* 14. *t.* 14.
Anona fructu vireſcente. *Burm. zeyl.* 21.
Guanabanus fructu molliter aculeato. *Plum. gen.* 43. *t.* 143. *f.* 1.
Habitat in Indiis.

ANNONA (*ſquamoſa*) foliis oblongis, fructibus obtuſe ſubſquammatis. *Linn. ſp.* 757.
Annona foliis oblongo-ovatis undulatis venoſis, floribus tripetalis, fructibus mammillatis. *Brown. jam.* 256.
Anona tuberoſa. *Rumph. amb.* 1. *p.* 138. *t.* 46.
Anona foliis odoratis minoribus, fructu conoide ſquamoſo parvo dulci. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 168. *t.* 227.
Atamaram. *Rheed. mal.* 3. *p.* 21. *t.* 29.
Jata. *Boym. fl. ſinens. N. f. N.*
Habitat in Indiis.

ANNONA (*reticulata*) foliis lanceolatis, fructibus ovatis, reticulato-areolatis. *Linn. ſp.* 757.
Annona foliis oblongis undulatis venoſis, fructibus areolatis. *Brown. jam.* 256.
Anona maxima, foliis oblongis anguſtis, fructu maximo luteo conoide, cortice glabro in areolas angulares diſtincto. *Sloan. hiſt. jam.* 167. *t.* 226. *Catesb. car.* 2. *p.* 62. *t.* 62. *Raj. dendr.* 77.
Anona. *Rumph. amb.* 1. *p.* 136. *t.* 45.
Habitat in Indiis.

ANNONA (*aſiatica*) foliis lanceolatis glabris nitidis lineatis. *Linn. ſp.* 758. *Fl. zeyl.* 225. *Roy. lugdb.* 494. *n.* 2.
Anona ſylveſtris. *Burm. zeyl.* 21.
Guanabanus fructu purpureo. *Plum. ſp.* 43. *ic.* 143. *f.* 2.
Habitat in utraque India.

ATRAGENE (*zeylanica*) cirrhis diphyllis, petalis exterioribus quaternis. *Linn. ſp.* 76. *Fl. zeyl.* 226.
Clematis zeylanica, floribus obſoletis parvis. *Herm. zeyl.* 35. *Burm. zeyl.* 66.
Planta foliis geminatis, ex oppoſito longis pediculis inter bina folia capreolo donatis. *Burm. zeyl. p.* 194.
Habitat in Zeylona.

SATUREJA (*viminea*) pedunculis axillaribus trifloris, involucris linearibus, foliis lanceolato-ovatis integerrimis. *Linn. ſp.* 795.
Mentha viminea, foliis minoribus obovatis, pedunculis trifloris alaribus. *Brown. jam.* 258.
Habitat in Indiis.

Javanicæ plantæ *caulis* fruticoſus pedalis teres glaber. *folia* lineari-lanceolata. *Pedunculi* axillares floſculis binis, ternis, vel pluribus.

NEPETA (*indica*) corollarum labio ſuperiore integerrimo breviſſimo. *Linn. ſp.* 799.
Leucas foliis ſubrotundis ſerratis, flore albo. *Burm. zeyl.* 140. *t.* 63.
Nepeta indica, rotundiore folio. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 415. *ſ.* 11. *t.* 6. *f.* 7.
Lamium indicum, foliis oblongis, flore albo graveolens. *Herm. muſ. zeyl.* 65.
Katu-kurka. *Rheed. mal.* 10. *p.* 179. *t.* 90. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 296.
Habitat in India.

Tab. 38. *f.* 1. LAVANDULA (*multifida*) foliis duplicato-pinnatifidis. *Linn. ſp.* 800. *Roy. lugdb.* 322. *n.* 2.
Lavandula folio diſſecto. *Bauh. pin.* 216. multifido folio. *Cluſ. hiſt.* 1. *p.* 345.
Lavandula folio longiore, tenuius & elegantius diſſecto. *Comm. rar.* 27. *t.* 27. *Plukn. alm.* 209. *t.* 303. *f.* 5.
Lavendula perſica, foliis pinnatifidis. *Herb. garzin.* e quo hanc figuram produco, quæ forte macriori e ſolo collecta, maxime quoad lacinias differt, tam a figuris, quam a viva planta, quæ in hortis quotannis luxuriare ſolet.
Habitat quoque in India.

MENTHA (*fœtida*) ſpicis oblongis, foliis oblongis petiolatis ſerratis, caule piloſo.
Alopecuro-veronica. *Linn. Fl. zeyl.* 193. ubi deſcr.
Veronica hirſuta latifolia aquatica. *Herm. zeyl.* 29. *Burm. zeyl.* 228.
Majana fætida. *Rumph. amb.* 6. *p.* 41. *t.* 16. *f.* 2.
Tilam Incolis, ubi notatur: Folia loco cataplaſmatis tumoribus applicantur.
Habitat in Java.

BALLOTA (*diſticha*) foliis cordatis indiviſis crenatis, ſpicis folioſis, calycibus acuminatis.
Badok Bankon-Javanis.
Habitat in Java & Coromandeli.

Caul tetragonus villoſus. *Fol.* crenata lanuginoſa in Javanica, glabra in Coromandelica. *flores* verticillati ſæpe quatuordecim. *cal.* acuminatus, *laciniis* diſtantibus. *Cor.* ex albo purpuraſcens.

MAR-

T. 38.



1. LAVANDULA *multifida*.
2. MOLUCCELLA *persica*.
3. ORIGANUM *benghalense*.



1. LAVANDULA *multifida*.
2. MOLUCCELLA *persica*.
3. ORIGANUM *benghalense*.

MARRUBIUM (*indicum*) foliis cordatis ſerratis, calycibus quinquedentatis ſubulatis villoſis.
Marrubium odoratiſſimum, betonicæ folio. *Burm. zeyl.* 153. *t.* 71. *f.* 1.
Marrubium zeylanicum odoratum, nepethæ facie, folio lamii pannonici. *Herm. muſ. zeyl.* 30.
Habitat in Zeylona & Java; unde ſæpius miſſa.

Jakwanaſſa zeylonenſibus, ubi *Herm.* notat. ut ſtomachicum & uterinum adhibetur.

LEONURUS (*indicus*) foliis lanceolatis ſubſerratis, calycibus ſeptemdentatis. *Linn. ſp.* 817.
Leonurus americana alba, folio ſideritidis longiore. *Plukn. phyt.* 81. *t.* 80. *f.* 7.
Herba admirationis. *Rumph.* 6. *p.* 39. *t.* 16. *f.* 1.
Clinopodium javanicum gindji dictum. *D. Kleinhof.*
Hyſſopi montani ſpecies, folio gramineo. D. *Pryon.*
Tumba. *Rheed. mal.* 10. *p.* 181. *t.* 191.
Habitat in Indiis.

LEONURUS (*Marrubiaſtrum*) foliis ovatis lanceolatisque ſerratis, calycibus ſeſſilibus ſpinoſis. *Linn. ſp.* 817.
Marrubiaſtrum foliis cardiacæ. *Boccon. muſ.* 2. *p.* 120. *t.* 98.
Chenopodium hyſſopi latioribus foliis maderaspatanum. *Plukn. alm.* 110. *t.* 164. *f.* 2.
Hyſſopus latiore folio Ladang • Derman incolis. D. *Pryon.*
Habitat in Java & Ukrania.

Folia plantæ indicæ latiora ſcabriuſcula lanceolata dentata ut in *Plukn.* fig., cum qua convenit. *caul.* villoſus. *verticilli* compacti, *calyces* ſpinuloſi.

LEONURUS (*tataricus*) foliis tripartitis laciniatis, calycibus villoſis. *Linn. ſp.* 818.
Cardiaca foliis tenuius & profundius inciſis, glabra ſ. villoſa. *Amm. ruth.* 49, 50. *Mill. ic.* 80.
Habitat in Tataria & Java.

Sub nomine Artemiſiæ ex India transmiſſa; *foliis* inferioribus tripartitis, *laciniis* pinnatifidis, ſupremis tripartitis vix diviſis. *calyces* glaberrimi perſiſtentes apicibus ſpinoſis, *involucra* ad ſingulum verticillum ſetacea.

LEONURUS (*ſibiricus*) foliis tripartitis multifidis linearibus obtuſiuſculis. *Linn. ſp.* 818.
Cardiaca javanica. *Garzin. herb.*
Ballóte inodora, foliis coronopi. *Amm. ruth.* 48. *t.* 8.
Habitat in Sibiria, China, & java; unde ſæpius miſſa

PHLO-

PHLOMIS (*zeylanica*) foliis lanceolatis ſubſerratis, capitulis terminalibus, calycibus octodentatis. *Linn. ſp.* 820. *Fl. zeyl.* 227.
Cardiaca S. Leonurus, hyſſopi hirſutis foliis, maderaspatana, floribus dilute rubris, unico tantum verticillo in ramulorum cymis. *Plukn. alm.* 81. *t.* 118. *f.* 4.
Lamium anguſtifolium glabrum zeylanicum, flore albo. *Burm. zeyl.* 138.
Habitat in India.

PHLOMIS (*indica*) involucris linearibus, calycibus unilabiatis obliquis, foliis lanceolato-ovatis piloſis. *Linn. ſp.* 820. ubi deſcr.
Habitat in India.

MOLUCCELLA (*ſpinoſa*) calycibus ringentibus octodentatis. *Linn. ſp.* 821. *Roy. lugdb.* 314. *n.* 2.
Molucca ſpinoſa. *Dod. pempt.* 92. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 173.
Meliſſa moluccana fœtida. *Bauh. pin.* 229.
Habitat in Moluccis.

Tab. 38. *f.* 2. MOLUCCELLA (*perſica*) calycibus quinquefidis obtuſis, laciniis obovatis membranaceis, foliis cuneiformibus apice ſerratis, ſerraturis ſpinoſis.
Moldavica perſica ſpinoſa. *Garzin. herb.*
Habitat in Perſia.

Frutex ſimilis M. *fruteſcenti*. *ramis* ſimplicibus erectis glaberrimis albicantibus. *Spinæ* ad ſingula genicula inæquales ſimpliciſſimæ patentes, baſi ſæpe cohærentes, numero 5 ad 12. *Fol.* cuneiformia baſi integerrima apice ſerrata, ſerraturis ſpinuloſis tomentoſis, quæ in *fruteſcenti* muticæ *cal.* regularis quinquefidus, laciniis obovatis ſcarioſis obtuſis cum tribus mucronibus, quæ in *frut.* ovato-acuminatæ. *Cor.* planiuſcula glabra.

ORIGANUM (*Majorana*) foliis ovalibus obtuſis, ſpicis ſubrotundis compactis pubeſcentibus. *Linn. ſp.* 825. *Roy. lugdb.* 324. *n.* 2.
Majorana vulgaris. *Bauh. pin.* 224. *Lob. icon.* 498.
Marou incolis. ſive Abſinthium indicum latifolium, flore luteo. D. *Outgaerden*, quod Coromandeli collectum. cujus *caulis* ſemipedalis, *foliis* ovalibus villoſis
β Majorana tenuifolia. *Bauh. pin.* 224.
Majorana hortenſis odorata perennis. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 359.
Thymus ſilveſtris repens. D. *Kleinhof*, quæ præcedenti tenuior.
Habitat in India.

Tab. 38. *f.* 3. ORIGANUM (*benghalenſe*) foliis ovatis dentatis, ſpicis imbricatis lanuginoſis, bracteis ovatis.
Ocymum Benghalenſe. *Garcin. herb.*
Habitat in Benghala.

Caul. quadrangularis purpuraſcens glaber. *Fol.* ovata ad baſin integerrima coarctata, lateribus inæqualiter dentata glabra acuminata. *ſpicæ* oppoſitæ pedunculatæ. *bracteæ* imbricatæ ovatæ, *pilis* albicantibus lanuginoſæ. *Flores* minimi.

THY-

THYMUS (*indicus*) repens, caulibus erectis, ſpicis verticillato-interruptis.
Nila-nagel. herba odorata, flore ſpicato. D. *Outgaerden.*
Habitat Coromandeli.

OCIMUM (*fruteſcens*) racemis ſecundis lateralibus, caule erecto. *Linn. ſp.* 832. *Fl. zeyl.* 228. *Roy. lugdb.* 322. *n.* 1.
Ocymum zeylanicum perenne fruteſcens, folio calaminthæ non nihil ſimili. *Herm. par. bat.* 358.
Ocymum maximum perenne utriuſque Indiæ, foliis Atriplicis ingrati odoris. *Plukn. alm.* 268. *t.* 308. *f.* 4.
Cottam. *Rheed. mal.* 10. *p.* 153. *t.* 77.
Habitat in India.

OCIMUM (*gratiſſimum*) racemis terminalibus, bracteis caducis, foliis lanceolato-ovatis, caule ſuffruticoſo. *Linn. ſp.* 832.
Ocymum zeylanicum perenne odoratiſſimum latifolium. *Burm. zeyl.* 174. *t.* 80. *f.* 1.
Majorana rubra. *Rumph. amb.* 5. *p.* 291. *t.* 101.
Kattu-tritava. *Rheed. mal.* 10. *p.* 171. *t.* 86.
Habitat in Aſia.

Ocymum (*Baſilicum*) foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis. *Linn. ſp.* 833. *Roy. lugdb.* 322. *n.* 2.
Ocymum caryophyllatum majus. *Bauh. pin.* 226. *Cam. ep.* 308.
Baſilicum indicum hortenſe. *Rumph. amb.* 5. *p.* 263. *t.* 92. *f.* 1.
Sulaſſi-puti. Javanis.
Habitat in India.

OCYMUM (*minimum*) foliis ovatis integerrimis. *Linn. ſp.* 833. *Roy. lugdb.* 322. *n.* 1.
Ocymum minimum. *Bauh. pin.* 226. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 407. *ſ.* 11. *t.* 10. *f.* 17.
Ocymum citratum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 266. *t.* 93. *f.* 1.
Baſilicum indicum minus. D. *Kleinhof.*
Habitat in India.

OCYMUM (*tenuiflorum*) foliis ovato-oblongis ſerratis, bracteis cordatis reflexis concavis, ſpicis filiformibus. *Linn. ſp.* 833. ubi deſcr.
Ocymum maderaſpatanum fruteſcens gratiſſimi odoris, flore parvo, caulibus villoſis. *Plukn. alm.* 268. *t.* 208. *f.* 4.
Baſilicum agreſte. *Rumph. amb.* 5. *p.* 265. *t.* 92. *f.* 2.
Bajang-Baly. Javanis.
Habitat in India.

OCYMUM (*menthoides*) foliis lineari-lanceolatis ſerratis. *Linn. ſp.* 834. *Fl. zeyl.* 229.
Mentha zeylanica ſpicata puſilla, anguſtiſſimo folio dentato. *Burm. zeyl.* 158. *t.* 70. *f.* 2.

14

Mentha zeylanica, anguſtiſſimo folio dentato. *Ray. app.* 284.
Mentha criſpa. *Rumph. amb.* 5. *p.* 267. *t.* 93. *f.* 2.
Veronica zeylanica minima, flore rubello. *Hartogh. herb.*
Ocymum odoratiſſimum indicum, foliis anguſtioribus conjugatis. *D. Pryon.*
Habitat in Zeylona & Java.

OCYMUM (*ſcutellaroides*) foliis lanceolato-ovatis ſerratis, racemis verticillatis. *Linn. ſp.* 834. ubi deſcr.
Ocymum latifolium maculatum vel criſpum. *Plukn. alm.* 268.
Majana aurea. *Rumph. amb.* 5. *p.* 296. *t.* 102. *f.* 3.
Lamium folio variegato ex luteo & cæruleo, majana javanis. *D. Kleinhof.* qui notat, colitur in hortis ob foliorum colorem variegatum ex luteo in rubrum & purpureum.
Habitat in Amboina.

OCYMUM (*inodorum*) foliis ovalibus denticulatis, racemis paniculatis.
Ocymum zeylanicum annuum inodorum. *Burm. zeyl.* 175. *t.* 80. *f.* 2.
Sulaſſi puti-utan Javanis. Menthaſtrum ſeu ſcorodonia. *D. Pryon.*
Habitat in India.

Caul. glabri. *Fol.* petiolata ovalia. *bract.* minimæ. *Panicula* verticillata, floſculis tribus ex uno centro pedunculatis. *cal.* bilabiatus monophyllus, labio ſuperiore plano cordato latiore reflexo, inferiore quadridentato acuto connivente, *ſemina* quatuor ovata. *Var.* adeſt foliis duplo majoribus cordatis.

SCUTELLARIA (*indica*) foliis ſubovatis obtuſis crenatis petiolatis, racemis nudiuſculis. *Linn. ſp.* 836.
Serratula amara. *Rumph. amb.* 5. *p.* 459. *t.* 170. *f.* 1.
Scutellaria ſinica, betonicæ folio, floribus albis. *Plukn. amalth.* 190. *t.* 441. *f.* 1.
Habitat in Amboina & China.

SCUTELLARIA? (*japonica*) foliis ovatis ſerratis acuminatis petiolatis, racemis nudiuſculis verticillato-ſpicatis
Scorodoniæ affinis ſinica, floribus ex albo-purpuraſcentibus, ſpica florum compactiore. *Plukn. amalth.* 188. *t.* 441. *f.* 2.
Herba Japonica, floribus verticillatis. D. *Kleinhof.*
Habitat in Japonia, Java.

Javanicæ *caulis* procumbens, qui in *Plukn.* fig. erectus lævis. *Fol.* ovata ſerrata acuta petiolata glabra nitida. *Racemi* terminales, *geniculis* binis ſuperioribus ex alis verticillis approximatis ſpicati. *Cal.* quinquedentatus. *Cor.* cærulea minina, accuratiori examine hanc ad *Teucrii* genus referendam puto.

PRUNELLA (*indica*) foliis oblongis ſuperne crenatis, ſpicis capitatis, bracteis ciliatis.
Brunella javanica. D. *Kleinhof.*

Differt a citatis *Cl. Linn.* figuris, *foliis* ſubuncinatis inſtar *verbenæ nodifloræ* petiolatis, *pedunculi* terminales, axillares & foliis oppoſiti. *ſpicæ* capitatæ, calycibus villoſis. Alteram quoque ex Java accepimus vix a vulgari diverſam niſi magnitudine minori.

RHI-



1. **RHINANTHUS** *indica*.
2. **ANTIRRHINUM** *papilionaceum*
3. **STERIS** *aquatica*.
4. **BASELLA** *japonica*.
5. **GMELINA** *indica*.

RHINANTHUS (*indica*) foliis ſublanceolatis piloſis integerrimis. *Linn. ſp.* 841. *Fl. zeyl.* 238. *Tab.* 39. *f.* 1.
Hyſſopus paluſtris repens tenellus, odore thymi. *Burm. zeyl.* 123.
Hyſſopus wela kola dictus. *Grimm. laborat. zeyl.* 129.
Hyſſopus zeylonenſis elegans tenellus, ſapore & odore thymi. *Herm. herb.* & *Muſ. zeyl.* 47.
β Veronicæ adfinis indica tenuifolia, floſculis e cauliculis barbatis, ſummo caule fere umbellatis. *Plukn. phyt.* 384. *t.* 114. *f.* 2.
Habitat in Zeylona.

GERARDIA (*delphinifolia*) foliis linearibus pinnatifidis, caule ſubramoſo. *Linn. ſp.* 848. *Amoen. acad.* 4. *p.* 318.
Habitat in India.

GERARDIA (*glutinoſa*) foliis ovatis ſerratis, bracteis linearibus hiſpidis. *Linn. ſp.* 849. ubi deſcr. *Osb. it. t.* 9.
Habitat in China.

ANTIRRHINUM (*papilionaceum*) corollis ecaudatis, floribus axillaribus, calycum foliolo ſupremo majori, foliis carnoſis. *Linn. dictum.* *Tab.* 39. *f.* 2.
Aſarina perſica nummulariæ facie. *Garzin. herb.*
Habitat in Perſia.

Folia alterna ſparſa breviter petiolata obovata carnoſa integerrima, magnitudine origani. *Flores* axillares ſolitarii breviſſime pedunculati, magnitudine foliorum. *Cal.* pentaphyllus foliolo ſupremo duplo majori cordato, longitudine fere floris, reliquis lanceolatis brevioribus. *Corolla* ecaudata, labio ſuperiore bifido, marginibus lateralibus reflexis, labio inferiore latiore trifido æquali. *ſtamina* didynamia duo. Differt a reliquis peculiari calyce, cujus folium ſupremum tegit corollæ latus ſuperius uti vexillum, reliquis quatuor brevioribus, lateribus corollæ incumbentibus, ut in flore papilionaceo.

TORENIA (*aſiatica*) *Linn. ſp.* 862. *Amoen. acad.* 3. *p.* 25. *Osb. it.* 210.
Euphraſiæ affinis puſilla planta. *Plukn. amalth.* 85. *t.* 373. *f.* 2.
Aſarinæ foliis & facie capſula bivalvi lignoſa. *Plukn. amalth.* 19. *t.* 360. *f.* 3.
Kaka-pu. *Rheed. mal.* 9. *p.* 103. *t.* 53.
Habitat in India.

BIGNONIA (*Catalpa*) foliis ſimplicibus cordatis ternis, caule erecto, floribus diandris. *Linn. ſp.* 868. *Jacq. amer.* 25. *Brown. jam.* 264. *Roy. lugdb.* 289. *n.* 1.
Bignonia arbor, tubo ſingulari undulato, ſiliquis longiſſimis & anguſtiſſimis. *Plum. ſp.* 5. *ic.* 57. *Duham. arb.* 1. *p.* 104. *t.* 41. *Catesb. car.* 1. *p.* 49. *t.* 49.
Kawara Triſagi. *Kæmpf. jap.* 841. *t.* 842.
Cumbulu. *Rheed mal.* 1. *p.* 75. *t.* 41.
Habitat in utriſque Indiis.

BIGNONIA (*indica*) foliis bipinnatis, foliolis integris ſubcordatis acutis. *Linn. ſp.* 871. *Fl. zeyl.* 236.
Bignonia arbor indica, foliis cordiformibus. *Tourn. inſt.* 165.

Clematis arborea malabarica maxima, juglandis folio, pinnis rotundioribus, flore albicante ampliſſimo, ſiliqua compreſſa lata. *Breyn prod.* 54.
Arbor ſiliquoſa malabarica, cordato folio, fructu maximo oblongo plano. *Raj. hiſt.* 1741.
Palega pajanelli. *Rheed. mal.* 1. *p.* 77. *t.* 43.
Boenglo Javanis.
Habitat in India.

CRESCENTIA (*ovata*) foliis ovatis integerrimis, apice acuminatis.
Habitat in Java.

Folia in hac ſpecie perfecte ovata nec attenuata, ut in *Creſcentia cujete.*

GMELINA (*coromandelica*) ſpinis oppoſitis conjugatis erectiuſculis.
Rhamnus foliis buxeis minimis confertim naſcentibus, ſpinis longis armata. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 100. *t.* 207. *f.* 1.
Lycium maderaſpatanum indici alpino putati æmulum foliis minoribus, bijugis & grandioribus aculeis horridum. *Plukn. phyt.* 234. *t.* 97. *f.* 2.
Care Coromandeli incolis.
Habitat in India utraque.

Ramuli noſtri *folia* ſunt bina oppoſita nec plura, ut in figuris depingitur.

GMELINA (*indica*) ſpinis alternis, foliis longioribus.
Doery Roekan Javanis.
Habitat in Java.

Caul. flexuoſus, *Fol.* ſolitaria breviſſimis petiolis, cordata crenata obtuſiuſcula. *Spinæ* foliis longiores ſæpe axillares vel infra folium ſimpliciſſimæ.

GMELINA (*aſiatica*) ſpinis oppoſitis horizontalibus. *Linn. ſp.* 873. *Fl. zeyl.* 230.
Michelia ſpinoſa, floribus luteis. *Amm. act. petrop.* 8. *p.* 218. *t.* 18.
Prunus indica ſylveſtris, fructu flavo pyriformi. *Burm. zeyl.* 197.
Lycium maderaſpatanum indici alpino putati æmulum, foliis majoribus bijugis & grandioribus aculeis horridum. *Plukn. alm.* 234. *t.* 305. *f.* 3.
Doery Radak Javanis. D. *Kleinhof.*
Habitat in India.

In noſtro ſpecimine nulla foliola binis oppoſitis majoribus junguntur quæ in figure *Plukn.* depicta ſunt.

Tab. 41. *f.* 1. CORNUTIA (*corymboſa*) foliis ovatis, corymbis terminalibus.
Cornutioides. *Linn. Fl. zeyl.* 195. ubi deſcr.
Sambucus zeylanica odorata aromatica. *Herm. herb. Burm. zeyl.* 209.
Habitat in Zeylona.

In *Herm.* herbario notatur: hujus radicis cortex oleum præbet aromaticum, & odoratu ſuaviſſimum, efficaciſſimum remedium in ventriculi imbecillitate, dolore & vomitu.

CA-



1. CORNUTIA *corymboſa*.
2. RUELLIA *repens*.
3. ——— *erecta*.



1. CORNUTIA corymboſa.
2. RUELLIA repens.
3. ——— erecta.

CAPRARIA (*uniflora*) foliis oppoſitis cordatis, floribus ſolitariis. *Tab.* 19. *f.* 3.
Alſine repens, folio conjugato ſerrato. ſub quo nomine ex java mittitur.
β Alſine affinis foliis & floribus oppoſitis, quæ tantum differt, quod flores ſint terminales.

CAPRARIA (*cruſtacea*) repens, foliis oppoſitis ovatis ſuppetiolatis crenatis.
Caranaſci minus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 491. *t.* 170. *f.* 3.
Habitat in China & Amboina.

Simillima *Caprariæ gratioloidi*, ſed folia magis ovata & omnino petiolata, calyciſque foliola latiora.

BUCHNERA (*aſiatica*) foliis integerrimis alternis, calycibus ſcabris. *Linn ſp.* 879. ubi deſcr.
Habitat in Zeylona & China.

OROBANCHE (*Æginetia*) caule unifloro, flore ſubſpathaceo. *Linn. ſp.* 883. ubi deſcr.
Aphyllos indica, flore dipetalo difformi, campanam emittente. *Raj. tom.* 3. *p.* 404.
Tſiam-cumulu. *Rheed. mal.* 11. *p.* 97. *t.* 47.
Habitat in Malabaria.

DODARTIA (*indica*) foliis ovatis ſerratis villoſis. *Linn. ſp.* 883. ubi deſcr.
Habitat in India.

SESAMUM (*orientale*) foliis ovato-oblongis integris. *Linn. ſp.* 883. ubi deſcr. *Fl. zeyl.* 237. *Roy. lugdb.* 292. *n.* 1.
Seſamum veterum. *Bauh. pin.* 27. *Moris. hiſt.* 2. *p.* 282. *ſ.* 5. *t.* 15. *f.* 3. *Riv. mon. t.* 20.
Digitalis orientalis, ſeſamum dicta. *Burm. zeyl.* 87. *t.* 38. *f.* 1.
Schit-elu. *Rheed. mal.* 9. *p.* 105. *t.* 54.
Widjor Javanis.
Habitat in Zeylona, Malabara.

SESAMUM (*indicum*) foliis inferioribus trifidis. *Linn. ſp.* 884. *Roy. lugdb.* 292. *n.* 2.
Seſamum indicum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 204. *t.* 76. *f.* 1.
Seſamum alterum foliis trifidis orientale, ſemine obſcuro. *Plukn. alm.* 344. *t.* 109. *f.* 4.
Habitat in India.

SESAMUM (*javanicum*) foliis lanceolatis dentatis ſeſſilibus.
Bahel-Tsjulli. *Rheed. mal.* 9. *p.* 2. *t.* 87.
Digitali affinis indica Blattariæ folio, flore rubicundo. *Commelin.* in notis ibidem.

Planta paluſtris flore cæruleſcente. Patjar ayer. Javanis. D. *Kleinhof.*
Habitat in India.

Caul. angulatus ſulcatus. *Fol.* lanceolata ſeſſilia ſubtomentoſa. *Floreſc:* ſpicata, *pedicellis* brevibus. *Cal.* quinque partitus, foliolis-ovato oblongis æqualibus perſiſtentibus. *Cor.* monopetala tubuloſa campanulata, limbo erecto-quadrifido, lobis ſuperioribus latioribus *ſtam filam.* quatuor fauci corollæ inſerta adſcendentia, corolla breviora, *antb.* compreſſæ bilobæ; *glandulæ* duæ ad baſin filamentorum ſuperiorum. *Piſt. germ.* ovatum. *ſtyl.* filiformis longitudine ſtaminum, *ſtigma* bilobum compreſſum. *Per. capſula* globoſa acuminata tetragona compreſſa quadrilocularis. *ſem.* minima rotunda.

Tab. 40. *f.* 1. RUELLIA (*tentaculata*) foliis obovatis, verticillis obvallatis, ſpinis inermibus bifurcatis. *Linn. ſp.* 886.
Ruellia ſurattenſis. *Garzin. herb.*
Euphraſia Acinos latiore folio maderaſpatana, cauliculis pubeſcentibus. *Plukn. alm.* 142. *t.* 279. *f.* 7.
Habitat in India.

RUELLIA (*criſpa*) foliis ſubcrenatis lanceolato-ovatis, capitulis ovatis folioſis hiſpidis. *Linn. ſp.* 886. ubi deſcr. *Osb. it.* 240.
Adhatoda luzanenſis, ſpica plana. *Petiv. gazoph.* 73. *f.* 6.
Habitat in India.

Tab. 40. *f.* 2. RUELLIA (*repanda*) foliis lanceolatis obtuſe-dentatis petiolatis, caule repente. *Linn. ſp.* ubi deſcr.
Prunella molucca anguſtifolia. *Rumph. amb.* 6. *p.* 30. *t.* 13. *litt. B.* ubi ſimplex ejus folium.
Bajau China malaice; Dinding andaun Padjingh javanice.
Habitat in Java & Amboina.

RUELLIA (*ringens*) foliis oblongis integerrimis, floribus ſolitariis ſeſſilibus, caule procumbente. *Linn. ſp.* 886. *Fl. zeyl.* 234. *Osb. it.* 229.
Bicapſularis indica ſolani foliis & flore, convolvuli inſtar repens. *Raj. hiſt.* *t.* 3. *p.* 549.
Lychnis articulata repens, folio vincæ pervincæ. *Burm. zeyl.* 144.
Upudali. *Rheed. mal.* 9. *p.* 125. *t.* 64.
Habitat in India.

RUELLIA (*antipoda*) foliis mucronato-ſerratis, caule repente, floribus ſubſpicatis terminalibus quinis terniſve. *Linn. ſp.* 886.
Alſine veronicæ facie, pediculis uncialibus. *Burm. zeyl.* 13.
Alſine repens, folio conjugato, flore albo. *D. Pryon.*
Gentianella utriuſque Indiæ impatiens, folioagerati. *Plukn. alm.* 167. *t.* 186. *f.* 2.
Cruſta ollæ parva. *Rumph. amb.* 5. *p.* 460. *t.* 170. *f.* 3.
Katu-pee-tjanga-piiſpam. *Rheed. mal.* 9. *p.* 113. *t.* 58.
Habitat in pleriſque Indiæ locis.

Javanica cum *Rheed.* fig. convenit, & in quibusdam ſpeciminibus occurrit, foliis ad axillas ſolitariis, terminalibus binis.

RUEL-



1. **RUELLIA** *tentaculata.*
2. ——— *repanda.*



1. *RUELLIA tentaculata.*
2. ——— *repanda.*



1 . RUELLIA *persica* .
2 . ACANTHUS *ciliaris* .



1. RUELLIA *persica*.
2. ACANTHUS *ciliaris*.

RUELLIA (*Anagallis*) foliis lanceolatis ſerratis, caule procumbente, floribus axillaribus ſolitariis.
Anagallis javanica. *D. Kleinhof.*
Cruſta ollæ major, caranaſci dicta. *Rumph. amb.* 5. *p.* 460. *t.* 170. *f.* 2.
Habitat in Java & Amboina.

Præcedenti major, differt floribus ſolitariis axillaribus, quod aliquando in floribus antipodæ obſervatur.

RUELLIA (*alternata*) foliis oblongo-cordatis crenatis petiolatis, ſpicis alternis folioſis, bracteis crenatis.
Prunella molucca ſylveſtris alba & rubra. *Rumph. amb.* 6. *p.* 31. *t.* 13. *f.* 2, 3.
Pee-tsjanga-puispam. *Rheed. mal.* 9. *p.* 115. *t.* 59.
Dinding Ary malaice Javanis.
Habitat in Java.

RUELLIA (*repens*) foliis lanceolatis integerrimis, floribus ſeſſilibus, bracteis petiolatis, caule repente. *Tab.* 41. *f.* 1.
Planta folio ſilagoeri, fructu ſpicato, D. *Kleinhof.*
Habitat in Java.

RUELLIA (*erecta*) foliis ovalibus integerrimis, floribus axillaribus ſeſſilibus, caule erectiuſculo. *Tab.* 41. *f.* 3.
β Katulio vitsna-elandi. *Rheed. mal.* 9. *p.* 119. *t.* 61. quæ foliis alternis.
Habitat in India.

Variat a præcedenti: *caule* erecto rigidiuſculo: *foliis* brevioribus obtuſis, *floribus* pluribus ſubſeſſilibus, *piſtillo* elongato perſiſtente.

RUELLIA (*perſica*) foliis lanceolatis dentatis ſpinuloſis, floribus oppoſitis. *Tab.* 42. *f.* 1.
Acanthus perſicus. *Garzin. herb.*
Habitat in Perſia.

Caul. breviſſimus glaber lineatus. *folia* oppoſita ſæpius ſubquaterna ſubſeſſilia lanceolata, denticulis utrimque tribus quinisve interruptis, ſpinula multum acuminatis & exſertis (ut in *Melampyro arvenſi*) ciliatis, nervo albicante. *Flores* axillares ſeſſiles ſolitarii. *Calycis* anguli acuminati, dentibus brevibus ciliati.

BARLERIA (*longifolia*) ſpinis verticillorum ſenis, foliis enſiformibus longiſſimis ſcabris. *Linn. ſp.* 887. *Amoen. acad.* 4. *p.* 320.
Anchuſa anguſtifolia, verticillis longis, aculeis armatis. *Plukn. alm.* 30. *t.* 133. *f.* 4.
Habitat in India.

BARLERIA (*Prionitis*) ſpinis axillaribus quaternis, foliis integerrimis. *Linn. ſp.* 887. *Fl. zeyl.* 233. *Roy. lugdb.* 291. *n.* 1.
Adhatoda ad alas ſpinoſa & florifera. *Burm. zeyl.* 8.
Lycium indicum, ſpinis quaternis ad foliorum ſingulorum exortum. *Seb. theſ.* 1. *p.* 21. *t.* 13. *f.* 1.

Me-

Melampyro cognato maderaſpatana, ſpinis horrida. *Plukn. alm.* 243. *t.* 119. *f.* 5.
Hyſtrix frutex. *Rumph. amb. auct.* 22. *t.* 13.
Coletta-veetla. *Rheed. mal.* 9. *p.* 77. *t.* 41.
Habitat in India.

BARLERIA (*buxifolia*) ſpinis axillaribus oppoſitis ſolitariis, foliis ſubrotundis integerrimis. *Linn. ſp.* 887.
Barleria americana ſpinoſiſſima muteſcens, buxi folio parvo. *Amm. herb.* 104.
Planta javanica, jalappæ flore, *D. Garcin.*
Capparis forma frutex ſpinoſus malabaricus. *Plukn. alm.* 80.
Cara-ſchulli. *Rheed. mal.* 2. *p.* 91. *t.* 47.
Habitat in Indiis.

BARLERIA (*criſtata*) foliis oblongis integerrimis, calycis foliolis duobus latioribus ciliatis, duobuſque linearibus acutis. *Linn. ſp.* 887. *Osb. it.* 225. *t.* 1.
Melampyro cognata maderaſpatenſis. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 429. *ſ.* 11. *t.* 23. *f.* 7.
Habitat in India.

Tab. 43. *f.* 1. OVIEDA (*mitis*) foliis lanceolatis ſubrepandis. *Linn. ſp.* 889.
Bonga Penjaton. Javanis.
Habitat in Java.

VOLKAMERIA (*aculeata*) ſpinis petiolorum rudimentis. *Linn. ſp.* 889. *Jacquin. hiſt.* 117.
Clerodendrum fruticoſum ſpinoſum, foliis inferioribus confertis, ſuperioribus oppoſitis, pedunculis tripartitis trifloris alaribus. *Brown. jam.* 262. *t.* 30. *f.* 2.
Liguſtrum aculeatum, fructu teſticulato. *Plum. ic.* 164. *f.* 1.
Paliuro affinis liguſtrifolia ſpinoſa, flore monopetalo difformi. *Sloan. hiſt.* 2. *p.* 137. *t.* 166. *f.* 23. *Raj. dendr.* 95.
Duglaſſia ſpinoſa liguſtri folio. *Amm. herb.* 576.
Frutex ſylveſtris, flore albo, Antralia moegri javanis. *D. Kleinhof.*
Habitat in utraque India.

VOLKAMERIA (*inermis*) ramis inermibus, foliis ovalibus integerrimis. *Linn. ſp.* 889. *Fl. zeyl.* 231.
Periclymeni ſimilis myrtifolia arbor maderaſpatenſis. *Plukn. amalth.* 167.
Baccifera malabarica, fructu oblongo tetracocco calyculato. *Raj. hiſt.* 1573.
Jasminum littoreum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 86. *t.* 46.
Jasminum glandiferum foetidum zeylanicum. *Burm. zeyl.* 127.
Jasmini flore frutex philippenſis, foliis floribuſque fere ternis. *Petiv. gaz.* *t.* 42. *f.* 7.

Peri-



1. OVIEDA *mitis*.
2. VITES *pinnata*.

44

T. 44.



VOLKAMERIA *alternifolia*.

44



VOLKAMERIA alternifolia.



1: VOLKAMERIA *multiflora*.

2. PEDALIUM *murex*.



1: VOLKAMERIA *multiflora*.
2. PEDALIUM *murex*.

Periclymeno ſimilis arbor myrtifolia maderaſpatana. *Plukn. alm.* 287. *t.* 211. *f.* 4.
Nir-notsjil. *Rheed. mal.* 5. *p.* 97. *t.* 49.
Serouni laut ſeu jasminum ſylveſtre. D. *Kleinhof.*
Habitat in India.

VOLKAMERIA (*alternifolia*) ramis inermibus, foliis alternis ovatis dentatis, floribus terminalibus. *Tab.* 44.
Puan-Bonga. Javanis.
Rami ſimpliciſſimi glabri, cortice albicante. *Folia* alterna patentia petiolata ovata dentibus inæqualibus acuminata. *pedunculi* longiſſimi terminales.

VOLKAMERIA (*multiflora*) ramis inermibus, foliis oppoſitis cordatis ſubdentatis acuminatis, pedunculis axillaribus multifloris. *Tab.* 45. *f.* 1.
Planta javanica, flore irregulari. *Garcin. herb.*
Habitat in Java.
Differt a præcedenti: *ramis* tenerioribus. *Foliis* oppoſitis. *Pedunculis* axillaribus, *floribus* numeroſſimis.

CLERODENDRUM (*infortunatum*) foliis ſimplicibus cordatis tomentoſis. *Linn. ſp.* 889. *Fl. zeyl.* 232.
Clerodendron folio lato & acuminato. *Burm. zeyl.* 66. *t.* 29.
Viburnum zeylanicum maximum conjugato oblongo folio, flore albo. *Hartogh. herb.*
Peragu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 41. *t.* 25. foliis alternis. *Raj. hiſt.* 1571.
Habitat in India.

CLERODENDRUM (*fortunatum*) foliis ſimplicibus lanceolatis integerrimis. *Linn. ſp.* 889. *Amoen. acad.* 4. *p.* 320. *Osb. it.* 228. *t.* 11.
Arbor zeylanica fortunata quibusdam *Petiv. muſ. n.* 870.
Planta fortunata, pinna zeylonenſibus. *Herm. muſ. zeyl.* 59.
Frutex flore perlato, fructu rotundo. D. *Kleinhof.*
Habitat in India.
In Javanicis ſpeciminibus *Folia* ſubovata acute dentata, *flores* per intervalla pedunculati ſubumbellati, *bracteis* ovatis acuminatis.

VITEX (*trifolia*) foliis ternatis quinatiſque integerrimis, paniculis dichotomis. *Linn.* 890. *Fl. zeyl.* 413.
Vitex trifolia minor indica. *Plukn. alm.* 390. *t.* 206. *f.* 5.
Vitex trifolia indica odorata hortenſis, floribus cæruleis racemoſis. *Burm. zeyl.* 229.
Lagondium vulgare. *Rumph. amb.* 4. *p.* 48. *t.* 18.
Piperi ſimilis fructus ſtriatus fæmina. *Bauh. pin.* 412.
Caranoſi. *Rheed. mal.* 2. *p.* 13. *t.* 11. *Raj. hiſt.* 1575.
β Vitex trifolia, floribus per ramos ſparſis. *Burm. zeyl.* 229. *t.* 109.
Habitat in India.

14

VITEX (*Negundo*) foliis quinatis, ternatiſque ſerratis, floribus racemoſo-paniculatis. *Linn. ſp.* 890. *Fl. zeyl.* 414. *Osb. it.* 92.
Vitex trifolia indica minor ſerrata. *Plukn. alm.* 390.
Vitex trifolia ſylveſtris indica odorata. *Burm. zeyl.* 229.
Negundo arbor mas. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 189.
Lagondium littoreum. *Rumph. amb.* 4. *p.* 50. *t.* 19.
Bemnoſi. *Rheed. mal.* 2. *p.* 15. *t.* 12.
Habitat in India.

VITEX (*zeylanica*) foliis pinnatis ternis quinisve integerrimis, floribus corymboſo-paniculatis.
Habitat in Zeylona.

Adfinis Bemnoſi *Hort. mal.* 2. *p.* 15. *t.* 11. at folia pinnata ſæpius quina glaberrima nigricantia, petiolis horizontalibus incraſſatis. corymbus terminalis ex paniculis numeroſis conſtans.

Tab. 43. *f.* 2. VITEX (*pinnata*) foliis pinnatis integerrimis, paniculis trichotomis. *Linn. ſp.* 890.
Piſtacio-vitex. *Linn. Fl. zeyl.* 445.
Patjar-China. Cambang Tsjulang malaice dicta Javanis.
Habitat in Java & Zeylona.

BONTIA (*germinans*) foliis oppoſitis, pedunculis ſpicatis. *Linn. ſp.* 891.
Bontia foliis ſubtus tomentoſis. *Jacq. amer.* 25.
Bontia foliis integris oblongis oppoſitis, petiolis craſſis breviſſimis ſubamplexicaulibus, floribus racemoſis. *Brown. jam.* 263.
Avicennia. *Linn. Fl. zeyl.* 57. *Mat. med.* 42.
Mangle lauroceraſi foliis, flore albo tetrapetalo. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 66. *Raj. dendr.* 115.
Anacardium. *Bauh. pin.* 511. orientale. *Plukn. alm.* 28.
Arbor indica, fructu conoide, cortice pulvinato, nucleum unicum nullo oſſiculo tecto claudente. *Raj. hiſt.* 1566.
Oepata. *Rheed. mal.* 4. *p.* 95. *t.* 45.
Caju cantekka Javanis.
Habitat in utrisque Indiis.

ACANTHUS (*ilicifolius*) foliis repandis dentato-ſpinoſis, caule fruticoſo aculeato. *Linn. ſp.* 892. *Osb. it.* 92.
Acanthus malabaricus, agrifolii folio. *Petiv. ſicc.* 10. *gaz. t.* 94. *f.* 15.
Aquifolium indicum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 163. *t.* 71.
Aquifolii facie arbor malabarica, acanthi flore albo cucullato. *Plukn. phyt.* 38. *t.* 264. *f.* 4.
Frutex indicus ſpinoſus, foliis agrifolii, ſiliqua geminata brevi. *Raj. hiſt.* 1766.
Carduus aquaticus S. Indorum dilivaria. *Cammel. luz.* 6. *n.* 16.
Paina ſchylli. *Rheed. mal.* 2. *p.* 93. *t.* 48.
Habitat in Indiæ locis maritimis.

ACAN.

ACANTHUS (*maderaſpatanus*) foliis quaternis obſolete dentatis inermibus, calycibus ciliatis. *Linn. ſp.* 892.
Adhatoda maderaſpatana, calyce barbato, foliis ſubtus villoſis. *Petiv. muſ.* 23.
Habitat in India.

ACANTHUS (*ciliaris*) foliis quaternis ellipticis, calycibus ciliatis. *Tab.* 42.
Acanthus quadrifolius zeylanicus. D. *Garcin.* *f.* 2.
Melampyro affinis tetraphylla gangetica, floribus inter folia ſparſis. *Plukn. phyt.* 245. *t.* 99. *f.* 3. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 402.
Habitat in Zeylona.

Caul. herbaceus dichotomus. *Folia* quaterna elliptica mutica. *Flores* axillares ſolitarii. *Cal.* exterior imbricatus foliolis quatuor parium ciliatis, interior tetraphyllus foliolis duobus exterioribus lanceolatis, reliquis longioribus, interioribus duobus minoribus linearibus. *capſula* rubra.

PEDALIUM (*murex*) *Linn. ſp.* 892. *Fl. zeyl.* 440. *Tab.* 45.
Hyoſcyamus maritimus, fructu tribuli aculeato, diſpermos. *Burm. zeyl.* 122. *Herm. zeyl.* 42. *f.* 2.
Planta zeylanica, cujus fructus eſt ſpinoſus inſtar tribuli aquatici, albicans. *Garzin. herb.*
Kaku-mullu. *Rheed. mal.* 10. *p.* 143. *t.* 72.
Habitat in Zeylona & Malabara.

Differt noſtra ab H. Mal. figura, quod multo tenerior, *caul.* erectiuſculus ex albido tomentoſus. *Fol.* alterna dentata ſcabriuſcula lucida. *Flores* axillares ſolitarii. *fructus* obovatus; ideoque mera varietas ab illa H. Malab.

TETRADYNAMIA SILICULOSA.

LEPIDIUM (*perfoliatum*) foliis caulinis pinnato-multifidis ramiferis cordatis amplexicaulibus integris. *Linn. ſp.* 397. *Roy. lugdb.* 335. *n.* 8. *Gron. orient* 79.
Naſturtium ſpicatum perſicum perfoliatum maximum. *Moris. hiſt.* 2. *p.* 294. *ſ.* 3. *t.* 25. *f.* 17.
Thlaſpi verum dioſcoridis. *Zanon. hiſt.* 193. *t.* 129.
Habitat in Perſia.

IBERIS (*ſemperflorens*) frutescens, foliis cuneiformibus integerrimis obtuſis. *Linn. ſp.* 904. *Roy. lugdb.* 336. *n.* 1.
Leucojum fruticoſum umbellatum perſicum, foliis leucoji inſtar ſempervirentibus. *Moriſ. hiſt.* 2. *p.* 296.
Thlaſpi latifolium polycarpon, leucoji foliis. *Bocc. ſic.* 55. *t.* 22. *f.* 1.
Thlaſpi fruticoſum, folio leucoji, ſemperflorens. *Scb. theſ.* 1. *p.* 2. *t.* 13. *f.* 4.
Habitat in Perſia.

PELTARIA (*Garzini*) foliis petiolatis ellipticis, ſiliculis unilocularibus compreſſis. *Tab.* 45. *f.* 1.
Alyſſon perſicum Plantaginis aquatici folio. *Garcin. herb.*
Habitat in Perſia.

Caul. glaberrimi albicantes. *Fol.* alterna elliptica integerrima glabra. *Siliculæ* obcordatæ pedunculatæ compreſſæ glaberrimæ monoſpermæ, *ſeminibus* oblongis.

CARDAMINE (*indica*) foliis ſimplicibus obovatis denticulatis, petiolis longis.
Cardamine Javanica humilis latifolia. *D. Kleinhof.*
Habitat in Java.

In noſtra planta *caules* palmares; *folia* obovata glabra, *petiolis* folio longioribus. *ſiliquæ* lineares ſtrictæ.

SISYMBRIUM (*ſinapis*) foliis ſublyratis denticulatis, ſiliquis ſubdeclinatis.
Draba anguſtifolia major. *Barr. ic.* 270.
Habitat in Java.

Statura & facies *ſinapis arvenſis*, at flores minutiſſimi albi, refertque racemus cum ſiliquis *ſiſymbrium amphibium*, licet ſiliquæ longiores patentiſſimæ declinatæ

SISYMBRIUM (*indicum*) ſiliquis pedunculatis rectis patentibus, foliis lyratis ovatis lævibus. *Linn. ſp.* 917. ubi deſcr.
Seſuri-china Javanis. *D. Kleinhof.*
Habitat in India.

Tab. 46. *f.* 2. HELIOPHILA (*incana*) caule flexuoſo, foliis linearibus ſubfalcatis obtuſis.
Leucojum incanum javanicum. *Garcin. herb.*
Habitat in India.

Caul. a ramo ad ramum flexuoſi glaberrimi albicantes. *Fol.* ſeſſilia ſæpe falcata linearia obtuſa. *Flores* in ſummo caule ſæpius tres pedunculati. *ſiliquæ* lineares compreſſæ, diſſepimento diſtinctæ.

BRASSICA (*chinenſis*) foliis ovalibus ſubintegerrimis, floralibus amplexicaulibus lanceolatis, calycibus ungue petalorum longioribus. *Linn. ſp.* 932. *Amoen. acad.* 4. *p.* 281.
Cadjoe coe. Incolis.
Habitat in China.

BRASSICA (*violacea*) foliis lanceolato-ovatis glabris indiviſis dentatis. *Linn. ſp.* 932.
Habitat in China.

SINAPIS (*juncea*) ramis faſciculatis, foliis ſummis lanceolatis integerrimis. *Linn. ſp.* 934.
Sinapi indicum maximum lactucæ folio. *Herm. par. bat.* 230. *t.* 230.
Habitat in India.

RAPHANUS (*ſativus*) ſiliquis teretibus toroſis bilocularibus. *Linn. ſp.* 935.
Raphanus chinenſis oliferus *ibidem.* β.
Raphanus minor oblongus orbicularis. *Bauh. pin.* 96.
Habitat in China.

CLEOME (*fruticoſa*) floribus gynandris tetrandris, foliis ſimplicibus, caule fruticoſo. *Linn. ſp.* 937. ubi deſcr.
Habitat in India.

CLEO-



1. PELTARIA *garcini*.
2. HELIOPHILA *incana*.
3. CLEOME *fruticosa*.

CLEOME (*heptaphylla*) floribus gynandris, foliis ſubſeptenatis, caule aculeato. *Linn. ſp.* 937.
Sinapiſtrum indicum ſpinoſum, foliis quinque, ſex, ſeptemve numero incertis. *Burm. zeyl.* 215.
Pentaphyllum peregrinum ſiliquoſum bivalve majus. *Moriſon. hiſt.* 2. *p.* 288.
β Sinapiſtrum indicum majus quinquefolium aſperum. *Raj. ſuppl.* 418.
Habitat in Indiis.

CLEOME (*pentaphylla*) floribus gynandris, foliis quinatis, caule inermi. *Linn. ſp.* 938. *Fl. zeyl.* 239.
Sinapiſtrum indicum pentaphyllum, flore carneo, minus non ſpinoſum. *Herm. lugdb.* 564. *Burm. zeyl.* 216. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 294. *Raj. hiſt.* 859.
Pentaphyllum peregrinum ſiliquoſum bivalve minus. *Moris. hiſt.* 2. *p.* 289.
Quinquefolium lupini folio. *Bauh. pin.* 326.
Capa-veela. *Rheed. mal.* 9. *p.* 43. *t.* 24.
Habitat in Indiis.

CLEOME (*triphylla*) floribus gynandris, foliis ternatis, caule inermi. *Linn. ſp.* 938.
Sinapiſtrum indicum triphyllum, flore carneo, non ſpinoſum. *Herm. lugdb.* 564. *Raj. ſupp.* 421.
Habitat in Indiis.

CLEOME (*icoſandra*) floribus icoſi-tetrandris, foliis quinatis. *Linn. ſp.* 938. *Fl. zeyl.* 240.
Sinapiſtrum zeylanicum pentaphyllum viſcoſum, flore flavo. *Burm. zeyl.* 215. *t.* 99.
Habitat in Zeylona.

CLEOME (*viſcoſa*) floribus dodecandris, foliis quinatis ternatiſque. *Linn. ſp.* 238. *Fl. zeyl.* 241.
Sinapiſtrum zeylanicum triphyllum & pentaphyllum viſcoſum, flore flavo. *Mart. cent.* 25. *t.* 25. *Burm. zeyl.* 215.
Papaver corniculatum acre triphyllum indicum, floribus luteis, viſcoſum zeylanicum. *Plukn. alm.* 280.
Eryſimum ſeu ſinapiſtrum indicum triphyllum viſcoſum, flore flavo. *Herm. muſ. zeyl. p.* 13.
Aria veela. *Rheed. mal.* 9. *p.* 41. *t.* 23. *Ray. hiſt.* 3. *p.* 427.
Habitat in Zeylona & Malabaria.

CLEOME (*dodecandra*) floribus dodecandris, foliis ternatis. *Linn. ſp.* 939. *Fl. zeyl.* 242.
Sinapiſtrum triphyllum pumilum glabrum, floſculo purpureo, ſiliqua membranacea. *Burm. zeyl.* 216. *t.* 100. *f.* 1.

Sinapiſtrum indicum triphyllum, flore carneo, non ſpinoſum. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 194. *t.* 124 *f.* 1.
Sinapiſtrum indicum triphyllum, ſiliqua maxima, flore albo. *Boerh. lugdb.* 307.
Eryſimum minimum triphyllum, flore purpureo fiſtuloſo. *Herm. herb.*
Habitat in Indiis.

CLEOME (*monophylla*) floribus hexandris, foliis ſimplicibus petiolatis ovatis lanceolatis. *Linn. ſp.* 940. *Fl. zeyl.* 243.
Sinapiſtrum zeylanicum viſcoſum, folio ſolitario, flore flavo, ſiliqua tenui. *Burm. zeyl.* 217. *t.* 100. *f.* 2.
Sinapiſtrum indicum, acetoſæ vulgaris folio, ſiliquis longis. *Herm. zeyl.* 10.
Papaver corniculatum acre, ſingulari folio, malabaricum. *Plukn. alm.* 210.
Herba ſiliquoſa indica tetraphylla, ſiliquis longis anguſtis, e ſingulis foliorum alis ſingulis. *Raj. app.* 427.
Tſieru veela. *Rheed. mal.* 9. *p.* 63. *t.* 34.
Habitat in Zeylona & Malabara.

MONADELPHIA PENTANDRIA.

WALTHERIA (*indica*) foliis ovatis ſerratis plicatis, capitulis ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 941. *Roy. lugdb.* 348. *n.* 2.
Malvinda ulmifolia, floſculis puſillis muſcoſis conſtipatis. *Burm. zeyl.* 149. *t.* 68.
Alcea zeylanica carpini foliis, floſculis faſciculatim congeſtis. *Herm. lugdb.* 13.
Betonica arboreſcens, villoſis foliis profunde venoſis, floribus ex alis foliorum glomeratis. *Plukn. mant.* 31.
Habitat in India.

WALTHERIA (*anguſtifolia*) foliis lanceolatis ſerratis, capitulis pedunculatis. *Linn. ſp.* 941. *Fl. zeyl.* 244. *Roy. lugdb* 348. *n.* 1.
Monoſperm-Althea arboreſcens villoſa, flore minore. *Iſnard. act.* 1721. *p.* 278. *t.* 14.
Betonica arboreſcens maderaſpatana villoſa, foliis profunde venoſis. *Plukn. alm.* 67. *t.* 150. *f.* 5.
Habitat in Indiis.

MELOCHIA (*pyramidata*) floribus umbellatis oppoſitifoliis, capſulis pyramidatis pentagonis, angulis acutis, foliis nudis. *Linn. ſp* 943. *Fl. zeyl.* 245. *Loefl. it.* 255.
Melochia herbacea tenuiſſima ramoſa, foliis oblongo-ovatis, umbellulis lateralibus, foliis approximatis. *Brown. jam.* 276.
Malvinda altiſſima, Betonicæ folio, floribus ad genicula gemellis. *Burm. zeyl.* 150. *t.* 69. *f.* 1.

Alt.

Althea minima ſurrecta, veronicæ villoſis foliis, maderaſpatana. *Plukn. alm.* 25. *t.* 132. *f.* 3.
Alcea indica alta ramoſa, foliis floribusque minimis. *Herm. zeyl.* 40.
Habitat in Indiis.

MELOCHIA (*concatenata*) ramis confertis terminalibus, capſulis globoſis ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 944. *Fl. zeyl.* 247.
Alcea indica, floſculis parvis faſciculatim ramulis adfixis. *Plukn. alm.* 26. *t.* 9. *f.* 5. *Breyn. prodr.* 1. *p.* 2.
Althea folio viridi, floſculis muscoſis parvis racematim denſe diſpoſitis. *Herm. zeyl.* 31.
Habitat in India.

MELOCHIA (*corchorifolia*) floribus capitatis ſeſſilibus, capſulis ſubrotundis. *Linn. ſp.* 944. *Fl. zeyl.* 246.
Melochia corchori foliis. *Dill. H. elth.* 221. *t.* 17. *f.* 217. *Burm. zeyl.* 156.
Althæa peregrina longiore betonicæ folio, floribus albis perexiguis, capitulis arcte conglomeratis. *Plukn. alm.* 25. *t.* 44. *f.* 5.
Tſjeru-uren. *Rheed. mal.* 9. *p.* 143. *t.* 73.
Habitat in India.

MELOCHIA (*ſupina*) floribus capitatis, foliis ovatis ſerratis, caulibus procumbentibus. *Linn. ſp.* 944.
Alcea ſupina puſilla geranii exigui maritimi folio & facie maderaſpatenſis, fructu in ſummo caule glomerato, pericarpio duro. *Plukn. alm.* 14. *t.* 132. *f.* 4.
Habitat in India.

MELOCHIA (*erecta*) floribus capitatis ſeſſilibus, foliis ovato-lanceolatis ſerratis, caulibus erectis.
Bompoeroetang. Javanis.
Habitat in Java.

Caul. erecti glaberrimi in noſtris dichotomi. *Fol.* inferiora ovata ſuperiora lanceolata acuminata inæqualiter ſerrata. *Fl.* capitati minimi, *paleis* ſetaceis. *Capſulæ* ſubrotundæ glaberrimæ.

MELOCHIA (*cordata*) floribus ſolitariis oppoſitifoliis, foliis cordatis ſerratis, capſulis compreſſis.
Malvinda foliis ſerratis angulofis, flore luteo. *D. Outgaerden.*
Perum Ponnaku. Incolis Coromandeli.

Caul. bipedales erecti. *Fol.* cordata in quibusdam ſpeciminibus triloba inæqualiter dentata, *petiolis* foliis longioribus. *Pedunc.* foliis oppoſiti ſolitarii. *Capſulæ* ſubrotundæ compreſſæ polyſpermæ, *ſeminibus* triquetris albis.

CON-

CONNARUS (*monocarpos*). *Linn. ſp.* 914. *Fl. zeyl.* 248.
Rhus zeylanicus trifoliatus Phaſeoli facie, floribus copioſis ſpicatis. *Burm. zeyl.* 199. *t.* 89.
Phaſeolus zeylanicus arboreſcens monocarpos. *Raj. ſupp.* 438.
Arbor trifolia ſiliquoſa ſarmentoſa unicam continens fabam. *Herm. muſ. zeyl.* 30.
Habitat in Zeylona.

HUGONIA (*Myſtax*) ſpinis oppoſitis revolutis. *Linn. ſp.* 944. *Fl. zeyl.* 249.
Ceraſus zeylanica ſarmentoſa amara capreolata ſeu cornigera, cortice odore Ciſti, ſeu violaceo. *Herm. zeyl.* 9. *Burm. zeyl.* 57.
Ægoceratos arbor zeylanica, Lauri fructu, cortice coſtum olente. *Raj. dendr.* 45.
Myſtax frutex baccifer malabaricus, fructu calyculato rotundo monopyreno. *Raj. hiſt.* 1570.
Ciſtus indicus Violæ Martiæ odore *Herm. herb.* ubi notatur. Cortex hujus arboris eſt amariſſimus & aromaticus, ſpirans odorem Iridis ſeu potius Violæ Martiæ, & uſurpatur in urbe Goa loco Coſti.
Nux vomica maderaſpatana minima, ſpinis corniculatis. *Petiv. herb.*
Modira-canni. *Rheed. mal.* 2. *p.* 29. *t.* 19.
Habitat in India.
Differunt ſpecimina inprimis foliatura, Javanica foliis ovatis magnitudine Perſici arboris, Zeylanica minoribus ovalibus cum acumine nigerrimis, & quæ in Petiverii herbario occurrit, foliis eſt coriaceis inſtar foliorum Arbuti uvæ urſi, omnibus ſpinis oppoſitis revolutis.

DODECANDRIA.

PENTAPETES (*phœnicea*) foliis haſtato-lanceolatis ſerratis. *Linn. ſp.* 958. *Mill. dict. t.* 201.
Alcea indica lucido haſtato folio, flore Blattariæ phæniceo. *Plukn. phyt.* 255. *f.* 3. *Raj. ſuppl.* 523.
Blattaria zeylanica, flore amplo coccineo. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 11. *t.* 6. *Burm. zeyl.* 47.
Flos impius. *Rumph. amb.* 5. *p.* 288. *t.* 100. *f.* 1.
Siaſmin. *Rheed. mal.* 10. *p.* 1. *t.* 1.? quæ foliis cordatis, pedunculis elongatis.
Boengha Haram Zadah. Javanis. *D. Kleinhof.*
Habitat in India.

PENTAPETES (*ſuberifolia*) foliis ovatis repandis. *Linn. ſp.* 959. *Fl. zeyl.* 250. *Amoen. acad.* 1. *p* 407.
Pteroſpermadendrum ſuberis folio anguloſo ſubtus incano, floribus albis. *Amm. act. petrop.* 8. *p.* 215. *t.* 14.
Arbor champacca ſuberis folio, fructu ligneo, ſeminibus alatis referto. *Petiv. muſ. n* 349.
Welagha Cinghalenſium. *Herm. herb. & muſ. zeyl.* 3.
Habitat in India.

PEN-

PENTAPETES (*acerifolia*) foliis cordatis repandis. *Linn. ſp.* 959.
Pteroſpermadendron folio Aceris, flore fructuque majore. *Amm. act. petr.* 8. *p.* 216. *t.* 16, 17.
Habitat in India.

POLYANDRIA.

BOMBAX (*pentandrum*) floribus pentandris. *Linn. ſp* 959. *Fl. zeyl.* 220.
Bombax foliis digitatis, brachiis erecto-patentibus, *Brown. jam.* 277.
Xylon caule inermi. *Roy. lugdb.* 437. *n.* 1. *Linn. H. cliff.* 175.
Goſſypium ſeu xylon arbor orientalis, digitatis foliis lævibus, fructu quinquecapſulari alba & nitente lanugine farcto. *Plukn. phyt.* 172. *t.* 188. *f.* 4.
Eriophoros javana. *Rumph. amb.* 1. *p.* 194. *t.* 80.
Goſſypium javanenſe, ſalicis folio. *Bauh. pin.* 430.
Panja-panjala, ſive arbor lanigera Bontii. *Rheed. mal.* 3. *p* 59. *t.* 49, 50, 51.
Habitat in utraque India.

BOMBAX (*ceiba*) floribus polyandris, foliis quinatis. *Linn. ſp.* 959. *Jacq. amer.* 26.
Xylon foliis digitatis caule aculeato. *Linn. Fl. zeyl.* 221. *Roy. lugdb.* 437. *n.* 2.
Xylon & Goſſypium arboreum, caule ſpinoſo. *Tourn. inſt.* 101. *Bauh. pin.* 430.
Goſſypium arboreum maximum ſpinoſum, folio digitato, lana ſericea griſea. *Sloan. jam.* 2. *p.* 72.
Moul-elavou. *Rheed. mal.* 3. *p.* 61, *t.* 52.
Habitat in Indiis.

BOMBAX (*conga*) floribus polyandris, foliis palmatis quinquelobis tomentoſis.
Xylon foliis quinque lobis acuminatis ſubtus tomentoſis. *Linn. Fl. zeyl.* 222.
Ketmia folio quinquefido ſubtus candicante, flore flaveſcente, ſemine tomentoſo. *Burm. zeyl.* 136.
Goſſypium fruteſcens annuum, folio vitis ampliore quinquefido. *Plukn. alm.* 178. *t.* 188. *f.* 2.
Conga pomifera craſſa arbor, procera 30. pedum. *D. Oudgaerden.*
Habitat in India.

Caul. albicans ſcaber. *Fol.* peltata palmata quinqueloba (inſtar Ricini) tomentoſa. *Flores* lutei. *Cal.* pentaphyllus foliolis ovatis obtuſis. *Cor.* pentapetala plana. *Stam.* plurima longitudine calycis. *Piſt. germ.* ſubrotundum. *Styl.* longitudine ſtaminum. *Per. capſula* quinquelocularis; *Semina* plurima reniformia ſplendentia pappoſa.

SIDA (*ſpinoſa*) foliis cordato-oblongis ſerratis, ſtipulis ſetaceis, axillis ſubſpinoſis. *Linn. ſp.* 960. *Fl. zeyl.* 254. *Roy. lugdb.* 349. *n.* 6.

Alcea carpini folio americana fruteſcens, floſculis luteis, ſemine duplici roſtro. *Commel H. Amſt.* 1. *p.* 3. *t.* 2.
Althæa Carpini folio, floſculis luteis. *Bocc. ſic.* 11. *t.* 2.
Althæa virginiana bidens pimpinellæ majoris acutiore folio, floribus minimis luteis. *Plukn. alm.* 25. *t.* 9. *f.* 6.
Alcea utriuſque Indiæ carpini folio, ſemine duplici ariſta donato. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 271.
Malva ulmifolia, ſemine cum duplici roſtro. *Tourn. inſt.* 96.
Silagoeri panjang. Javanis.
Habitat in utraque India.

SIDA (*alba*) foliis cordatis ſubrotundis, ſtipulis ſetaceis, axillis ſubtriſpinoſis. *Linn. ſp.* 960.
Malva bicornis ſanguiſorbæ folio villoſo & glabro. *Dill. H. elth.* 214. *t.* 171. *f.* 210.
Malva indica, foliis ſubrotundis. *Tourn. inſt.* 96.
Althæa roſtrata cormandelenſis, Pimpinellæ majoris folio ſubrotundo, ſemine bicorni. *Plukn. alm.* 26. *t.* 9. *f.* 3.
Habitat in India.

SIDA (*rhombifolia*) foliis lanceolato-rhomboidibus ſerratis, axillis ſubſpinoſis. *Linn. ſp.* 961. *Fl. zeyl.* 252. *Gron. virg.* 101. *Roy. lugdb.* 349. *n.* 5.
Malvinda unicornis, folio Rhomboide perennis. *Dill. H. elth.* 216. *t.* 172. *f.* 212.
α Althæa carpini folio, floſculis minimis. *Bocc. ſic.* 11. *t.* 6. *f.* 2.
Alcea utriuſque Indiæ carpini folio, ſemine ſimplici ariſta donato. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 270.
β Althæa indica minima Bæwila zeylanenſibus. *Burm. zeyl.* 15.
Creſcit in utraque India.

SIDA (*alnifolia*) foliis orbiculatis plicatis ſerratis. *Linn. ſp.* 961. *Fl.* 253. *Roy. lugdb.* 349. *n.* 7.
Malvinda ſtellata alnifolia. *Dill. elth.* 215. *t.* 172. *f.* 211. *Burm. zeyl.* 150.
β Malva indica, folio cordiformi. *Tourn. inſt.* 96.
Alcea zeylanica, folio latiore cordiformi. *Herm. lugdb.* 12.
Habitat in India.

SIDA (*retuſa*) foliis cuneiformibus retuſis ſerratis ſubtus tomentoſis. *Linn. ſp.* 961.
Althæa indica latiori folio cordiformi ad ſummum ſinuato. *Plukn. alm.* 26. *t.* 9. *f.* 2.
Silaguirum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 44. *t.* 19.
Kurundoti. *Rheed. mal.* 10. *p.* 35. *t.* 18.
Silagoeri. parum paon Javanis.
Habitat in India.

SI-

SIDA (*acuta*) foliis lanceolatis ſerratis, ſtipulis ſetaceis, floribus axillaribus ſolitariis.

Althæa cormandeliana anguſtis prælongis foliis, ſemine bicorni. *Plukn. mant.* 10. *t.* 334 *f.* 2.

Silagurium anguſtifolium. *Rumph. amb.* 6. *p.* 45. *t.* 18. *f.* 2.

Tjeru parua. *Rheed. mal.* 10. *p.* 105. *t.* 53.

Habitat in India.

Rami ſtricti glabri. *Fol.* alterna patentiuſcula petiolata ovato-oblonga acuta. *Stipulæ* lineari-lanceolatæ ſetaceæ petiolis longiores, *Flores* axillares ſolitarii pedunculati, *bracteis* ovatis.

SIDA (*cordifolia*) foliis cordatis ſubangulatis ſerratis villoſis. *Linn. ſp.* 961.

Malvinda bicornis, ballotes folio molli. *Dill. H. elth.* 211. *t.* 171. *f.* 209. *Burm. zeyl.* 149.

Althæa maderaſpatana ſubrotundo folio molli & hirſuto multipilis, ſeu ſeminibus ad apicem crinitis. *Plukn.* 25. *t.* 131. *f.* 2.

Alcea indica, molli & lanuginoſo folio, ſeminibus duplici & nonnunquam triplici ariſta donatis. *Herm. zeyl.* 2.

Malva foliis cordatis crenatis villoſis, floribus lateralibus congeſtis. *Linn. Fl. zeyl.* 255.

Alcea indica minor, ſemine leviter criſtato. *Herm. zeyl.* 42.

Katu-uren. *Rheed. mal.* 10. *p.* 107. *t.* 54.

Habitat in India.

SIDA (*periplocifolia*) foliis oblongis integerrimis, caule paniculato. *Linn. ſp.* 962. *Fl. zeyl.* 251. *Roy. lugdb.* 349. *n.* 2.

Sida erecta glabra, foliis cordatis acuminatis integris ſubtus incanis, pedunculis longiſſimis tenuiſſimis. *Brown. jam.* 280.

Abutilon periplocæ anguſtioris folio, fructu ſtellato. *Dill. H. elth.* 4. *t.* 3. *f.* 3. *Burm. zeyl.* 2.

Alcea orientalis ſcammoniæ folio major, floribus albis. *Plukn. alm.* 17. *t.* 74. *f.* 7.

Althæa ſcammoniæ folio, floſculis albis zeylanica *Herm prodr.* 309.

Abutilon ampiſſimo folio, caule villoſo. *Plum. ſp.* 2. *ic.* 3.

Habitat in Zeylona, Java, & America.

SIDA (*Abutilon*) foliis ſubrotundo-cordatis indiviſis, pedundulis folio brevioribus, capſulis multilocularibus, corniculis bifidis. *Linn. ſp.* 963. *Roy. lugdb.* 349. *n.* 9. *Gron. virg.* 78.

Althæa Theophraſti, flore luteo. *Bauh pin.* 316.

Abutilon Avicennæ. *Burm. zeyl.* 1.

Abutilon indicum, flore luteo. *Breyn prodr.* 1. *p* 1.

Alcea indica, Abutilon dicta, pericarpio membranaceo orbiculari compreſſo, vertice corniculis extus coronato, intus decem aut duodecim loculamentis diviſo. *Plukn. alm.* 17.

Althæa altera S. Abutilon. *Camer. epit.* 668.
Habitat in Indiis.

SIDA (*aſiatica*) foliis cordatis indiviſis, ſtipulis reflexis, pedunculis longioribus, capſulis multilocularibus hirſutis, calyce brevioribus. *Linn. ſp.* 964.
Abutilon indicum, flore luteo minore. *Linn. Fl. zeyl.* 520. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 1. *Burm. zeyl.* 1.
Alceæ affinis indica, Abutilon dicta, flore parvo flavo, foliis mollibus profunde venoſis, ſiliculis lanuginoſis. *Plukn. phyt.* 17. *t.* 126. *f.* 5.
Alcea populi folio villoſo leviter ſerrato. *Sloan. jam.* 98.
Watta Toety. Incolis.
Habilat in Indiis.

In loco natali in proceram altitudinem excreſcit. *Herm. herb.*

SIDA (*indica*) foliis cordatis ſublobatis, ſtipulis reflexis, pedunculis longioribus, capſulis multilocularibus ſcabris, calyce longioribus. *Linn. ſp.* 964.
Abutilon indicum. *Camer. hort* 3. *t.* 1. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 959. *Moris. hiſt.* 2. *p.* 531. *ſ.* 5. *t.* 19. *f.* 4.
Abutilon indicum, foliis profunde inciſis. *Burm. zeyl.* 2.
Althææ theophraſti ſimilis. *Bauh. pin.* 316.
Habitat in India.

SIDA (*racemoſa*) foliis cordatis crenatis villoſis, racemis axillaribus multifloris.

Caul. teretes villoſi. *Fol.* alterna magna cordata crenata acuminata, e cinereo-tomentoſa. *Petiolis* longiſſimis. *Pedunc.* axillares erectiuſculi ſubdichotomi, ramulis divaricatis. *Flor.* terminales plures minores lutei.

Tab. 47. *f.* 1. SIDA (*perſica*) foliis inferioribus petiolatis cordatis acuminatis, ſuperioribus ſeſſilibus lanceolatis dentatis, pedunculis ſolitariis unifloris.
Abutilon. *Garzin. herb.*
Habitat in Perſia.

Rami ſtricti teretes glabri. *Fol.* inferiora petiolata magna cordata acuminata glabra lucida profunde dentata, ſuperiora ſeſſilia tomentoſa lanceolata denticulo uno & altero ad baſin, apice integerrima. *Flor.* axillares ſolitarii, terminales bini, *bracteis* ſetaceis. *Calyces* tomentoſi. *Corolla* lutea.

MALVA (*tomentoſa*) foliis cordatis crenatis tomentoſis, floribus lateralibus congeſtis, caule fruticoſo. *Linn. ſp.* 967. ubi deſcr. *Fl. zeyl.* 255. *Roy. lugdb.* 357. *n.* 8.
Althæa orientalis bidens, ſubrotundis foliis, floribus parvis luteis. *Plukn. amalth.* 11. *t.* 356 *f.* 1.
Habitat in India.

MAL-

T. 47.



1. SIDA *persica*.
2. HIBISCUS *panduræformis*.



1. SIDA *persica*.
2. HIBISCUS *panduræformis*.

MALVA (*gangetica*) foliis cordatis obtuſis ſcabris, floribus ſeſſilibus glomeratis, arillis dentis muticis crenulatis. *Linn. ſp.* 967.
Althæa indica, Abutili ſubrotundo folio, flore luteo ſpicato. *Plukn. phyt.* 24. *t.* 74. *f.* 6.
Habitat in India.

MALVA (*verticillata*) caule erecto, foliis angulatis, floribus axillaribus glomeratis ſeſſilibus, calycibus ſcabris. *Linn. ſp.* 970. *Roy. lugdb.* 356.
Malva ſinenſis erecta, floſculis albis minimis. *Boerh. lugdb.* 1. *p.* 268.
Malva annua rotundifolia, floribus omnium minimis albis pentaphyllis verticillatim genicula ambientibus. *Moris. hiſt.* 2. *p.* 521. *Raj. hiſt.* 598.
Habitat in China.

ALCÆA. (*indica*) caule ſuffruticoſo, foliis cordatis trilobis acuminatis crenulatis tomentoſis, pedunculis unifloris.
Malva arborea indica. D. v. Santen.
Habitat in Java.

Caul. erectus ſtriatus tomentoſus cicatriculatus fungoſus, *Fol.* cordata triloba, lobis acuminatis e cinereo ſubtus tomentoſa, *petiolis* foliis longioribus. *Fl.* terminales magni lutei. *Cal. per.* exterius ſexpartitum ad baſin uſque diviſum, lanciniis lanceolatis, interius quinquefidum majus, laciniis ovatis acuminatis.

URENA (*lobata*) foliis angulatis ſubtus tomentoſis. *Linn. ſp.* 974. *Fl. zeyl.* 256. *Roy. lugdb.* 358.
Urena ſinica xanthii facie. *Dill. elth.* 340. *t.* 319. *f.* 412.
Trifolio adfinis indiæ orientalis xanthii facie. *Breyn. cent.* 82. *t.* 35.
Malvinda foliis dentatis ſubtus incanis. *D. Pryon.*
Alcea indica, floribus roſeis parvis, fructibus parvis quinquepartitis hiſpidis lappaceis. *Herm. zeyl.* 8. *Burm. zeyl.* 9.
Lappago amboinica. *Rumph. amb.* 6. *p.* 59. *t.* 25. *f.* 2.
Uren. *Rheed. mal.* 10. *p.* 3. *t.* 2.
Habitat in variis Indiæ locis.

URENA (*ſinuata*) foliis ſinuato-palmatis, ſinubus obtuſis. *Linn. ſp.* 974. *Fl. zeyl.* 257.
Alcea indica fruteſcens, foliis in lacinias varie diſſectis. *Plukn. alm.* 15. *t.* 74. *f.* 1. & *t.* 5. *f.* 3. foliis ad marginem exaſperatis bryoniæ albæ diviſuris.
Malvinda foliis inferioribus multifidis, ſuperioribus inciſis, flore ſolitario. *Burm. zeyl.* 150. *t.* 69. *f.* 2.
Alcea floribus roſeis parvis, fructu lappaceo quinquepartito, foliis profunde laciniatis. *Herm. zeyl.* 63.
Malvinda flore ſolitario, foliis varie diſſectis, quo magis ad infercora eo latioribus & maxime laciniatis. Populoan. Malaice. *D. Pryon.*
Habitat in India.

URENA (*procumbens*) foliis haſtato ſubcordatis indiviſis ſerratis, caule procumbente. *Linn. ſp.* 975. ubi deſcr.
Habitat in China.

GOSSYPIUM (*herbaceum*) foliis quinquelobis, caule herbaceo lævi. *Linn. ſp.* 975. *Roy. lugdb.* 359.
Goſſypium fruteſcens, ſemine albo. *Bauh. pin.* 430.
Goſſypium. *Rumph. amb.* 4. *p.* 33. *t.* 12. & 13. β. cujus lobi longiores, foliaque profunde diviſa.
Habitat in utriſque Indiis.

GOSSYPIUM (*arboreum*) foliis palmatis, lobis lanceolatis, caule fruticoſo *Linn. ſp.* 975. *Roy. lugdb.* 359.
Goſſypium latifolium. *Rumph. amb.* 4. *p.* 37. *t.* 13.
Goſſypium herbaceum, ſeu xylon maderaſpatenſe, rubicundo flore, pentaphyllum. *Plukn. alm.* 172. *t.* 188. *f.* 3.
Cudupariti. *Rheed. mal.* 1. *p.* 55. *t.* 31.
Ceiba Javanis.
Habitat in India.

HIBISCUS (*populeus*) foliis cordatis integerrimis, caule arboreo, calycum exteriore truncato. *Linn. ſp.* 979. *Fl. zeyl.* 258.
Ketmia indica Populi folio, fructu orbiculato compreſſo. *Tourn. inſt.* 110. *Burm. zeyl.* 136.
Althæa arborea indica, Populi folio, flore ephemero. *herm. lugdb.* 22.
Alcea arborea maxima, Populi folio, flore majore flaveſcente. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 10. malbarienſis. *Raj hiſt* 1069.
Novella littorea. *Rumph. amb.* 2. *p.* 244. *t.* 74.
Bupariti. *Rheed. mal.* 1. *p.* 51. *t.* 29.
Habitat in India.

HIBISCUS (*tiliaceus*) foliis cordatis ſubrotundis indiviſis acuminatis crenatis, caule arboreo, calycum exteriore decem crenato. *Linn. ſp.* 976. *Fl. zeyl.* 259. *Roy. lugdb.* 532.
Malva arborea maritima, folio ſubrotundo minore acuminato, ſubtus candido cortice in funes ductili. *Sloan jam.* 1. *p.* 215. *t.* 134. *f.* 4.
Ketmia zeylanica ſempervirens & florens tiliæ folio, flore luteo. *Burm. zeyl.* 136.
Alcea indica ſinarum, flore luteo malvaceo. *Plukn. amalth.* 6. *t.* 355. *f.* 5.
Alcea malabarica, Abutili folio, flore minore ex albo flaveſcente exterius adſperſo. *Raj. hiſt.* 1070.
Novella. *Rumph. amb.* 2. *p.* 218. *t.* 73.
Pariti. Seu Tali-Pariti. *Rheed. mal.* 1. *p.* 53. *t.* 30.
Condang waru Javanis.
Habitat in India utraque.

Caul & *Fol.* in pleriſque ſpeciminibus tomentoſa. *Stipulæ* & *bracteæ* ovatæ, ſemiamplexicaules.

HI-

HIBISCUS (*panduræformis*) foliis cordato-lanceolatis denticulatis tomentoſis, caule hirto. *Tab.* 47. *f.* 2.
Ketmia folio haſtato ſubtus incano. *Garcin herb.*

Caul. herbaceus, pilis hirtus. *Fol.* alterna petiolata cordato lanceolata denticulata tomentoſa. *Fl.* pedunculati axillares. *Cal.* perianth. exterius octophyllum, foliolis lineari-obtuſis, *pilis* pellucentibus tomentoſis, interius ad baſin quinquefidum, foliolis ovalibus longioribus. *Corolla* ſulphurea ad ungues maculis purpuraſcentibus.

HIBISCUS (*ſimplex*) foliis cordatis trilobis repandis integerrimis. *Linn. ſp.* 977.
Malva arborea, folio ſubrotundo, flore liliaceo. *Sloan. jam.* 1. *p.* 95. *t.* 134. *f.* 1, 2, 3?
Pannuara fonti coromandeli incolis *D. Outgaerden*, quæ foliis ſerratis tomentoſis.
Habitat in Aſia.

HIBISCUS (*Roſa ſinenſis*) foliis ovatis accuminatis ſerratis glabris, caule arboreo. *Linn. ſp.* 977. *Fl. zeyl.* 260.
Alcea javanica arboreſcens, flore pleno rubicundo. *Breyn. cent.* 121. *t.* 56.
Ketmia ſinenſis, fructu ſubrotundo, flore pleno. *Tourn. inſt.* 100. *Burm. zeyl.* 233.
Althæa arborea, Roſa ſinenſis dicta, flore multiplici. *Herm. lugdb.* 22.
Flos feſtivalis. *Rumph. amb.* 4. *p.* 24. *t.* 8.
Schem-pariti. *Rheed. mal.* 1. 25. *t.* 17.
Campang ſappadoe vel waribang. Javanis.
Habitat in India.

HIBISCUS (*hirtus*) foliis lanceolato-ovatis acuminatis ſerratis, ramis ſcabris, caule herbaceo. *Linn. ſp.* 77. ubi deſcr.
Alcea fruticoſa malabarienſis, anguſtis foliis rigidiuſculis, floribus amoene rubellis, ſemine papposo. *Plukn. alm.* 14. *t.* 254. *f.* 3.
Habitat in India.

Javanicæ plantæ *Fol.* latiora quam in *Plukn.* fig. *Flor.* amoene rubri, triplo minores quam in *Roſa ſinenſi.*

HIBISCUS (*mutabilis*) foliis cordato-quinquangularibus obſolete ſerratis, caule arboreo. *Llnn. ſp.* 977. *Roy. lugdb.* 358. *n.* 3.
Althæa arborea, Roſa ſinenſis dicta. *Moris. hiſt.* 2. *p.* 530. *ſ.* 5. *t.* 18. *f.* 2.
Roſa ſinenſis. *Ferr. flor.* 493. *t.* 497. *Merian. ſur.* 31. *t.* 31.
Flos horarius. *Rumph. amb.* 4. *p.* 27. *t.* 9.
Hina-paretti. *Rheed. mal.* 6. *p.* 66. *t.* 38. 39. 40. 41.
Habitat in Indiis.

HI-

HIBISCUS (*ficulneus*) foliis quinquefido palmatis, caule aculeato, floribus pedunculatis. *Linn. ſp.* 978. *Fl. zeyl.* 263. *Roy. lugdb.* 359. *n.* 7
Ketmia zeylanica, Fici folio, perianthio oblongo integro. *Dill. elth.* 190. *t.* 157. *f.* 190. *Burm. zeyl.* 137.
Habitat in Zeylona.

HIBISCUS (*ſabdariffa*) foliis ſerratis, inferioribus ovatis indiviſis, ſuperioribus tripartitis, caule inermi, floribus ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 978. *Fl. zeyl.* 262. *Roy. lugdb.* 359. *n.* 6.
Alcea acetoſa indica mitis, foliis ſuperioribus goſſypii in modum tripartito-diviſis. *Plukn. alm.* 15. *t.* 6. *f.* 2.
Ketmia vel Althæa indica Goſſypii folio, Acetoſæ ſapore. *Tourn. inſt.* 100. *Burm. zeyl.* 135. *Raj. hiſt.* 1900.
Habitat in Indiis.

HIBISCUS (*cannabinus*) foliis ſerratis, ſuperioribus palmatis quinquepartitis ſubtus uniglandulofis, caule aculeato, floribus ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 979. ubi deſcr.
Alcea benghalenſis ſpinoſiſſima, Acetoſæ ſapore, flore luteo pallido, umbone purpuraſcente. *Commel. H. amſt.* 1 *t.* 18.
Ketmia indica, foliis digitatis, flore magno ſulphureo, umbone atro-purpureo, petiolis ſpinoſis. *Ehret. t.* 6. *f.* 1.
Ketmia indica, Cannabinis foliis Bangue dicta. *Burm. zeyl.* 134.
Habitat in India.

HIBISCUS (*ſurattenſis*) recurvato-aculeatus, foliis trilobis, calycibus exterioribus appendiculatis, ſtipulis ſemicordatis, floribus pedunculatis. *Linn. ſp.* 979. ubi deſcr.
Herba Crinalium. *Rumph. amb.* 4. *p.* 40. *t.* 16. Katnat Javanis.
Ketmia indica ſpinuloſa profunde laciniata, Acetoſæ ſapore. *Burm. zeyl.* 134.
β Hibiſcus foliis palmato-digitatis quinquepartitis, laciniis lanceolatis, caule aculeato. *Linn. Fl. zeyl.* 264.
Alcea ſpinoſa maderaſpatana, ſaporis acidi, foliis profunde laciniatis cannabis in modum pentapyllæa. *Plukn. alm.* 15. *t.* 5. *f.* 4.
Narinam-puli. *Rheed mal.* 6. *p.* 75 *t.* 44.
Caadtu Malligei. Coromandeli Incolis. Caſtoeri Javanis.
Habitat in India.

HIBISCUS (*manihot*) foliis palmato-digitatis ſeptempartitis. *Linn. ſp.* 980.
Ketmia folio manihot ſerrato, flore amplo ſulphureo. *Dill. elth.* 189. *t.* 156. *f.* 189.
Alcea ſinica, manihot ſtellato folio, capſula longa piloſa pyramidata, quinquefariam diviſa. *Plukn. amaltb.* 7. *t.* 355. *f.* 2.
Habitat in india.

HI-

HIBISCUS (*Abelmoſchus*) foliis ſubpeltato-cordatis ſeptem angularibus ſerratis hiſpidis. *Linn. ſp.* 980. *Fl. zeyl.* 261. *Roy. lugdb.* 358. *n.* 4.
Alcea hirſuta, flore flavo, ſemine moſchato. *Marcgr. braſ.* 45. *t.* 45.
Ketmia ægyptia, ſemine moſchato. *Tourn. inſt.* 100. *Burm. zeyl.* 134.
Alcea ægyptia villoſa. *Bauh. pin.* 317.
Flos moſchatus. *Merian. ſurin.* 42. *t.* 42.
Granum moſchatum. *Rumph. amb.* 4. *p.* 38. *t.* 15.
Catta-gaſturi. *Rheed. mal.* 2. *p.* 71. *t.* 38.
Caſtoeri malaice, gandapoera Javanice.
Habitat in India.

HIBISCUS (*eſculentus*) foliis quinquepartito-pedatis, calycibus interioribus latere rumpentibus. *Linn ſp.* 980.
Alcea americana annua, flore flavo maximo, fructu pyramidato ſulcato. *Commel. H. amſt.* 1. *p.* 37. *t.* 19. *Raj. ſuppl.* 518.
Alcea maxima malvæ roſeæ folio, fructu decagono recto craſſiore breviore eſculento. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 223. *t.* 133. *f.* 3.
Okra. *Kalm. it.* 2. *p.* 209. Quingambo. *Marcgr. braſ.* 31.
Habitat in Indiis.

HIBISCUS (*vitifolius*) foliis quinqueangularibus acutis ſerratis, caule inermi, floribus pendulis. *Linn. ſp.* 980. *Fl. zeyl.* 265.
Althæa indica vitis folio, flore flavo pendente. *Herm. lugdb.* 26. *t.* 28. unguibus ex atro purpureo holoſericis. *Herm. herb.*
Ketmia indica vitis folio, flore amplo flavo. *Burm. zeyl.* 137.
Alcea indica vitis folio, flore amplo flaveſcente, quinis ad ſingulos flores thecis. *Plukn. alm.* 15.
Katu-beloeren. *Rheed. mal.* 6. *p.* 79. *t.* 46.
Habitat in India.

HIBISCUS (*zeylanicus*) foliis cordato-haſtatis, pedunculis alternis unifloris geniculatis. *Linn. ſp.* 981. *Fl. zeyl.* 266.
Tullu Poundon Coromandeli incolis.
β Ketmia zeylanica urens piloſa annua, flore ſulphureo, umbone atro-purpureo. *Seb. theſ.* 2. *t.* 18. *f.* 3. *Burm. zeyl.* 137.
Habitat in Zeylona.

Caul. ſuffruticoſus teres, *pilis* brevibus ruffeſcentibus. *Fol.* cordato-haſtata ſive triloba, lobo medio productiori, lateralibus erectiuſculis denticulatis. *Pedunc.* erecti pollicares infra florem geniculati, *bracteis* breviſſimis. *Calyx* exterior perſiſtens, *ſetis* decem filiformibus erectis, *germen* involventibus; interior breviſſimus quinquedentatus, *Cor.* lutea, *Calyce* exteriore longior.

CAMELLIA (*japonica*). *Linn. ſp.* 282.
Tſubakki montanus ſ. ſylveſtris, flore roſeo ſimplici. *Kæmpf. amoen.* 850. *t.* 851. & β. 852.
Roſa chinenſis. *Edw. av.* 2. *p.* 67. *t.* 67.
Habitat in Japonia & China.

POLYGALA (*chinenſis*) floribus imberbibus ſpicatis axillaribus, caule ſuffruticoſo, foliis ovalibus. *Linn. ſp.* 989. ubi deſcr.
Polygala arborea, foliis lanceolato-ovatis, capſulis compreſſis bilobis ultra medium diviſis. *Brown. jam.* 287.
Habitat in Indiis.

POLYGALA (*glaucoides*) floribus imberbibus, pedunculis multifloris lateralibus, caulibus diffuſis herbaceis, foliis acutis. *Linn. ſp.* 991. *Fl. zeyl.* 270.
Alſine glaucis marinæ folio. *Herm. zeyl.* 33. *Burm. zeyl.* 13.
Habitat in Zeylona.

POLYGALA (*triflora*) floribus imberbibus, pedunculis ſubtrifloris, caule herbaceo erecto, foliis linearibus alternis. *Linn. ſp.* 991. *Fl. zeyl.* 269.
Linaria minima zeylanica. *Herm. zeyl.* 31. *Burm. zeyl.* 143.
Habitat in Zeylona.

POLYGALA (*ciliata*) floribus imberbibus, capſulis ciliato-dentatis, caule herbaceo erecto. *Linn. ſp.* 991. *Fl. zeyl.* 268.
Habitat in India.

POLYGALA (*Thea*) floribus imberbibus, pedunculis unifloris, caule fruticoſo, foliis alternis lineari-oblongis.
Polygala fruteſcens, Lavandulæ folio viridi, flore cæruleo. *Burm. zeyl.* 195. *t.* 85.
Polygala zeylanica Roſmarini folio, flore cæruleo. *Hartogh. herb.*
Thea ſpuria japonica. *D. Kleinhof.*
β Kimalela Javanis, quæ foliis ovalibus triplo majoribus.

Javanica ſub nomine Theæ miſſa optime quadrat cum citata *Theſ. zeyl.* figura, niſi quod minor & tenerior ſit.

DECANDRIA.

ERYTHRINA (*Corallodendron orientale*) foliis ternatis inermibus, caule arboreo aculeato. *Linn. ſp.* 992. *Fl. zeyl.* 275. *Roy. lugdb.* 373. *n.* 1.
Corallodendrum triphyllum americanum ſpinoſum, flore ruberrimo. *Tourn. inſt.* 661. *Burm. zeyl.* 74.
Gelala littorea. *Rumph. amb.* 2. *p.* 230. *t.* 76.
Mouricou. *Rheed. mal.* 6. *p.* 13. *t.* 7.
Habitat in Indiis.

ERYTHRINA (*picta*) foliis ternatis aculeatis, caule arboreo aculeato. *Linn. ſp.* 993.
Gelala alba. *Rumph. amb.* 2. *p.* 234. *t.* 77.
Habitat in Amboina.

ASPA-

ASPHALATHUS (*indica*) foliis quinatis ſeſſilibus, pedunculis unifloris. *Linn. ſp.* 1001.
Geniſta. *Linn. Fl. zeyl.* 271.
Lotus tenuifolius maderaſpatanus, ſiliqua ſingulari glabra. *Plukn. alm.* 225. *t.* 201. *f.* 2.
Dorycnium zeylanicum, folio minutiſſimo. *Burm. zeyl.* 89.
Dorycnium indicum, floribus ſingularibus rubris in pedicello oblongis, ſiliquis perexiguis. *Raj. ſuppl.* 471.
Manelli. *Rheed. mal.* 9. *p.* 69. *t.* 37.
Habitat in India.

ASPHALATHUS (*perſica*) foliis bijugis ſeſſilibus, ſtipulis integerrimis, floribus lateralibus ſeſſilibus.
Dorycnium perſicum incanum. *Garcin. herb.*
β Tsjovanna manilla. *Rheed. mal.* 9. *p.* 71. *t.* 38.
Habitat in Perſia & Malabaria.

Planta lucida. *Caul.* herbacei glaberrimi, *ramulis* ſimplicibus. *Fol.* ſeſſilia quaterna ſive bijuga obovalia integerrima. *Flor.* axillares ſolitarii vel bini. *Calyces* albicantes, longitudine fere *corollæ*, perſiſtentes. *Legum.* plana nigricantia.

CROTALARIA (*chinenſis*) foliis ſimplicibus ovatis ſubpetiolatis, ſtipulis minutiſſimis. *Linn. ſp.* 1003. ubi deſcr.
Habitat in China.

CROTALARIA (*juncea*) foliis ſimplicibus lanceolatis petiolato-ſeſſilibus, caule ſtriato. *Linn. ſp.* 1004. *Roy. lugdb.* 374. *n.* 3. *Trew. ehret. t.* 47.
Crotalaria benghalenſis, foliis geniſtæ hirſutis. *Plukn. alm.* 122. *t.* 169. *f.* 5.
Crotalaria malabarica ſylveſtris, foliis ſingularibus majoribus, floribus luteis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 464.
Crotalaria malabarica ſalicis folio. *Garcin. herb.*
Tandela-cotti. *Rheed. mal.* 9. *p.* 47. *t.* 26.
Habitat in India.

CROTALARIA (*retuſa*) foliis ſimplicibus oblongis cuneiformibus retuſis. *Linn. ſp.* 1004. ubi deſcr. *Fl. zeyl.* 276.
Crotalaria aſiatica, floribus luteis, folio ſingulari cordiformi. *Herm. lugdb.* 200. *t.* 201. *Burm. zeyl.* 80.
Geniſtella indica major, ſalicis folio glabro obtuſo cordiformi, flore luteo minore. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 50.
Crotalaria benghalenſis, ex cujus viminibus fila & vela conficiuntur. *Garcin. herb.*
Crotalaria major. *Rumph. amb.* 5. *p.* 278. *t.* 96. *f.* 1.
Tandale-cotti. *Rheed. mal.* 9. *p.* 45. *t.* 25.
Habitat in India.

17

CROTALARIA (*ſeſſiflora*) foliis ſimplicibus lanceolatis ſubſeſſilibus, floribus ſeſſilibus lateralibus, caule æquali. *Linn. ſp.* 1004. ubi deſcr.
Habitat in China.

Tab. 48. f. 1. CROTALARIA (*ſericea*) foliis ſimplicibus ovalibus ſubſeſſilibus tomentoſis, floribus ſpicatis terminalibus.
Crotalaria Geniſtæ folio & ſiliqua ferruginea, Janachidde Malabarorum. *Plukn. mant.* 58. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 464.
Habitat in India.

Rami ſimplices ſtriati. *Fol.* alterna ſimplicia ſubpetiolata ovalia cum acumine ſubtus ſericea. *Spica* terminalis, *bracteis* linearibus ſetaceis. *Flores* lutei.

Tab. 48. f. 2. CROTALARIA (*nana*) foliis ſimplicibus oblongis ſubſeſſilibus glabris, pedunculis lateralibus trifloris.
Crotalaria minor benghalenſis, flore luteo. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 464.
Crotalaria malabarica. *Garcin. herb.*
Habitat in India.

Rad. fibroſa. *Caul.* herbacei palmares erectiuſculi ſimpliciſſimi. *Folia* alterna ſubpetiolata oblonga obtuſa. *Pedunculi* axillares triflori, *bracteis* lanceolatis. *Cal.* piloſi patentes. *Legum.* obtuſa minima.

CROTALARIA (*verrucoſa*) foliis ſimplicibus ovatis, ſtipulis lunatis declinatis, ramis tetragonis. *Linn. ſp.* 1005. *Fl. zeyl.* 277.
Crotalaria foliis ſolitariis ovatis acutis, caule ſulcato. *Burm. zeyl.* 81. *t.* 34.
Crotalaria aſiatica, folio ſingulari verrucoſo, floribus cæruleis. *Herm. lugdb.* 199. *t.* 199. *Raj. hiſt.* 1893.
Geniſta indica rotundifolia ſpicata cærulea, ſiliquis hirſutis bullatis. *Herm. zeyl.* 65.
Geniſtella major indica, Alni folio, flore cæruleo ſpicato. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 67.
Pee-tandale-cotti. *Rheed. mal.* 9. *p.* 53. *t.* 29.
Habitat in India.

Variat *foliis* obtuſis & acuminatis, *ſtipulis* lunatis & lanceolatis in eadem planta, *leguminibus* glabris & villoſis.

CROTALARIA (*laburnifolia*) foliis ternatis ovatis acuminatis, ſtipulis nullis, leguminibus pedicellatis. *Linn. ſp.* 1005. *Fl. zeyl.* 278.
Crotalaria aſiatica fruteſcens, floribus luteis amplis, trifolia. *Herm. lugdb.* 196. *t.* 197. ſiliquis bullatis. *herb. Herm.*
Anonis aſiatica fruteſcens. *Tourn. inſt.* 409. *Burm. zeyl.* 21.
Nella-tandale-cotti. *Rheed. mal.* 9. *p.* 49. *t.* 27.
Habitat in Zeylona & Malabara.

CRO-



1. CROTALARIA *sericea*.
2. ——————— *nana*.
3. HIBISCUS *zeylanicus*.



1. CROTALARIA *sericea*.
2. ―――― *nana*.
3. HIBISCUS *zeylanicus*.



1. *ONONIS persica.*
2. *PSORALEA corylifolia.*
3. *LOTUS persicus.*



1. ONONIS persica.
2. PSORALEA corylifolia.
3. LOTUS persicus.

CROTALARIA (*quinquefolia*) foliis quinatis. *Linn. ſp.* 1006.
Crotalaria pentaphylla, ſiliquis latis valde tumidis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 465.
Crotalaria pentaphylloides maderaſpatana, floribus luteis. *Plukn. alm.* 122.
Lupinus folio trifido & quinquefido. *D. Kleinhof.*
Wellia-tandale-cotti. *Rheed. mal.* 9. *p* 51. *t.* 28.
Habitat in India.
Differt foliis ternatis, floribus rarioribus.

ONONIS (*perſica*) ſtipulis integerrimis lanceolatis, foliis ternis cuneiformibus apice tridentatis, ſpica folioſa terminali. *Tab.* 49. *f.* 1.
Anonis non ſpinoſa purpuraſcens minor. *Barrl. icon.* 354. quæ major.
Anonis perſica, flore luteo. *Garcin. herb.*
Habitat in Perſia.
Caul. vix palmaris procumbens, *ramulis* diffuſis. *Foliola* ſubpetiolata cuneiformia, apicibus tridentatis. *Stipulæ* & *bracteæ* lanceolatæ ſemiamplexicaules. *Spica* folioſa terminalis, *floſculis* alternis.

LUPINUS (*javanicus*) floreſcentia ſubſpicata, calycibus alternis inappendiculatis, labio ſuperiore bipartito, inferiori trifido.
Lupinus indicus, anguſtiſſimo folio. *Herm. lugdb.* 386.
Habitat in Java.
Caul. ſtriati glabri. *Fol.* quina petiolis duplo longioribus, foliola linearia apice obtuſiuſculo, baſi anguſtiore, glaberrima. *Spica* terminalis alterniflora, *bracteis* lanceolatis appendiculatis. *Ped.* longitudine bractearum erectiuſculi. *Calyx.* quinquefidus, labio ſuperiori majori erectiuſculo bipartito, inferiori trifido. *Cor.* purpuraſcens magna; inter *hirſutum* & *perennem* locum meretur, quibus adfinis.

PHASEOLUS (*coccineus*) volubilis, floribus racemoſis geminis, bracteis calyce brevioribus, leguminibus pendulis. *Linn. ſp.* 1016.
Phaſeolus indicus, flore coccineo ſeu puniceo. *Moris. hiſt.* 2. *p.* 69.
Phaſeolus puniceo flore. *Cornut. canad.* 184.
Habitat in Indiis.

PHASEOLUS (*lunatus*) volubilis, leguminibus acinaciformibus ſublunatis lævibus. *Linn. ſp.* 1016.
Phaſeolus benghalenſis ſcandens, ſiliqua acinaciformi, ſemine ovato compreſſo ſtriato. *Berg. viadr.* 99.
Habitat in Benghala.

PHASEOLUS (*farinoſus*) volubilis, pedunculis ſubcapitatis, ſeminibus tetragono-cylindricis pulverulentis. *Linn. ſp.* 1016.
Phaſeolus peregrinus, flore roſeo, ſemine tomentoſo. *Niſſ. act.* 1730. *p.* 577. *t.* 42.
Phaſeolus indicus, hederæ folio anguloſo, ſemine oblongo lanuginoſo. *Raj. ſuppl.* 308.
Banirearn Javanis.
Habitat in India.

PHASEOLUS (*caracalla*) volubilis, vexillis carinaque ſpiraliter convolutis. *Linn. ſp.* 1017. *Roy. lugdb.* 367. *n.* 2.
Phaſeolus indicus, cochleato flore. *Triumf. obſ.* 93. *t.* 94. *Raj. hiſt.* 1890.
Habitat in Indiis.

PHASEOLUS (*nanus*) caule teretiuſculo lævi, bracteis calyce majoribus, leguminibus pendulis compreſſis rugoſis. *Linn. ſp.* 1017.
Phaſeolus vulgaris italicus humilis ſ. minor albus cum orbita nigricante. *J. Bauh. hiſt.* 2. *p.* 358.
Smilax ſiliqua ſurſum ringente, ſive Phaſeolus parvus italicus. *Bauh. pin.* 339.
Habitat in India.

PHASEOLUS (*radiatus*) caule erecto tereti, floribus capitatis, leguminibus cylindricis horiſontalibus. *Linn. ſp.* 1018. *act. Holm.* 1742. *p.* 202. *t.* 7. *f.* 2. *Fl. zeyl.* 281.
Phaſeolus zeylanicus, ſiliquis radiatim digeſtis. *Dill. elth.* 315. *t.* 235. *f.* 309. *Burm. zeyl.* 192.
Habitat in Zeylona.

PHASEOLUS (*max*) caule erecto anguloſo hiſpido, leguminibus pendulis hirtis. *Linn. ſp.* 1018. *Fl. zeyl.* 280. *Roy. lugdb.* 367. *n.* 1.
Phaſeolus orthocaulis, Mungo Perſarum, Turcarum maſc, Hiſpanorum max. *Hernand. mexic.* 887.
Phaſeolus erectus, caule & folio rigido, flore pallide luteo, ſiliqua craſſa ampla. *Burm. zeyl.* 190.
Fructus niger, Coriandro ſimilis. *Bauh. pin.* 413.
Cadelium. *Rumph. amb.* 5. *p.* 388. *t.* 140.
Habitat in India.

PHASEOSUS (*ſphærosſpermos*) caule erecto, ſeminibus globoſis, hilo tincto. *Linn. ſp.* 1018.
Phaſeolus erectus minor, ſemine ſphærico albido, hilo nigro. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 185. *t.* 117. *f.* 1. 2. 3.
Phaſeolus indicus, fructu ſtricto albo minore nigra macula. *Plukn. alm.* 290.
Habitat in Indiis.

DOLICHOS (*ſinenſis*) volubilis, pedunculis multifloris erectis, leguminibus pendulis cylindricis toruloſis. *Linn. ſp.* 1018.
Dolichos ſinenſis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 375. *t.* 134.
Habitat in Sina.

DOLICHOS (*unguiculatus*) volubilis, leguminibus capitatis ſubcylindraceis, apice recurvo concavo. *Linn. ſp.* 1019.
Cacara nigra. *Rumph. amb.* 5. *p.* 381. *t.* 138.
Habitat in Amboinia.

DO-

DOLICHOS (*pruriens*) volubilis, leguminibus racemoſis hirtis, valvulis ſubcarinatis, pedunculis ternis. *Linn. ſp.* 101. *Fl. zeyl.* 539. *Jacq. amer.* 27. *n.* 2.
Phaſeolus braſilianus fruteſcens, lobis villoſis pungentibus. *Sloan. jam. hiſt.* 1. *p.* 178.
Phaſeolus zeylanicus, lobis undique piloſis, fructu lucido nigro. *Burm. zeyl.* 191.
Phaſeolus zurattenſis, ſiliqua hirſuta pungente. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 444.
Cacara pruritus. *Rumph. amb.* 6. *p.* 393. *t.* 142.
Nai-corana. *Rheed. mal.* 8. *p.* 61. *t.* 35.
Catjang gattal & cacara gattal Javanis. quæ ultima videtur varietas.
Habitat in Indiis.

DOLICHOS (*urens*) volubilis, leguminibus racemoſis hirtis tranſverſim lamellatis, ſeminibus hilo cinctis. *Linn. ſp.* 1020.
Phaſeolus indiæ orientalis, ſiliquis plurimis hirſutie pungentibus, faba magna oſtream referente. *Plukn. alm.* 292.
Kaku-valli. *Rheed. mal.* 8. *p.* 63. *t.* 36.
Habitat in India.

DOLICHOS (*tetragonolobus*) volubilis, leguminibus membranaceo-quadrangulatis. *Linn. ſp.* 1020.
Lobus quadrangularis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 374. *t.* 133.
Habitat in Amboina.

DOLICHOS (*minimus*) volubilis, leguminibus racemoſis compreſſis tetraſpermis, foliis rhombeis. *Linn. ſp.* 1020.
Dolichos minimus, floribus luteis. *Linn. H. cliff.* 360. *t.* 21.
Phaſeolus exiguus glaber Trifolii foliis, ſiliqua plana compreſſa. *Burm. zeyl.* 188. *t.* 84 *f.* 2.
Phaſeolus minimus fætidus, floribus ſpicatis e viridi luteis, ſemine maculato. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 182. *t.* 115. *f.* 1.
Habitat in Indiis.

DOLICHOS (*ſcarabæoides*) volubilis, foliis ovatis tomentoſis, floribus ſolitariis, ſeminibus bicornibus. *Linn. ſp.* 1020. *Fl. zeyl.* 282.
Phaſeolus minimus biſnagaricus, foliis argenteo-villoſis, ſiliquis toroſis brevibus ſpadicea hirſutie pubeſcentibus, fructu parvo ſcarabæoide nigro. *Plukn. alm.* 290. *t.* 52. *f.* 3.
Phaſeolus zeylanicus tomentoſus ſalviæ foliis, lobis parvis oblique articulatis alter. *Burm. zeyl.* 188.
Phaſeolus zeylanicus, ſalviæ foliis ſubrotundis mollibus & hirſutis. *Herm. par. bat. pr.* 364.
Phaſeolus perſicus mollis. *Garcin. herb.*

He-

Hedyſarum trifoliatum repens, folio ovali hirſuto, ſiliqua in ſingulo articulo ſemen continente reniforme. *D. Pryon.*
Habitat in India.

DOLICHOS (*bulboſus*) volubilis, foliis glabris multangulis dentatis. *Linn. ſp.* 1021.
Phaſeolus nervicenſis, foliis multangulis, tuberoſa radice. *Plukn. alm.* 292. *t.* 52. *f.* 4.
Cacara bulboſa. *Rumph. amb.* 5. *p.* 373. *t.* 132.
Habitat in India.

Tab. 50. *f.* 1. DOLICHOS (*trilobus*) volubilis, foliolis lateralibus extrorſum gibbis, intermedio trilobo. *Linn. ſp.* 1021.
Phaſeolus maderaſpatanus, foliis glabris trilobis, floribus exiguis longis petiolis ex eodem puncto geminis. *Plukn. alm.* 292. *t.* 214. *f.* 3.
Hedyſarum triphyllum repens, foliis inciſis, ſiliquis inarticulatis hirſutis. *D. Pryon.*
Habitat in India.
Variat caule repente volubili & erectiuſculo, glabro & piloſo.

DOLICHOS (*purpureus*) volubilis, caule glabro, petiolis ſubpubeſcentibus, corollæ alis patentibus. *Linn. ſp.* 1021. ubi deſcr.
Habitat in Indiis.

DOLICHOS (*lignoſus*) volubilis, caule perenni, pedunculis capitatis, leguminibus ſtrictis linearibus. *Linn. ſp.* 1022.
Dolichos caule perenni lignoſo. *Linn. H. Cliff.* 360. *t.* 20.
Phaſeolus indicus perennis, floribus purpuraſcentibus. *Eichr. carol.* 36.
Cacara ſ. Phaſeolus perennis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 378. *t.* 136.
Habitat in India.

DOLICHOS (*enſiformis*) caule ſuberecto, leguminibus gladiatis tricarinatis, ſeminibus arillatis. *Linn. ſp.* 1022.
Phaſeolus maximus, ſiliqua enſiformi nervis inſignita, ſemine albo membranula incluſo. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 177. *t.* 114. *f.* 1. 2. 3.
Phaſeolus indicus trifolius, ſiliqua longa grandi, fabis eſculentis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 445.
Lobus machæroides. *Rumph. amb.* 5. *p.* 376. *t.* 135. *f.* 1.
Bara-mareka. *Rheed. mal.* 1. *p.* 85. *t.* 44.
Habitat in Indiis.

DOLICHOS (*ſoja*) caule erecto flexuoſo, racemis axillaribus erectis, leguminibus pendulis hiſpidis ſubdiſpermis. *Linn. ſp.* 1023. *Fl. zeyl.* 534.
Phaſeolus erectus, ſiliquis Lupini, fructu piſi majoris candido. *Kæmpf. amoen.* 837. *t.* 838.
Phaſeolus japonicus, fructu albo, ex quo ſoja conficiunt japonenſes, D. Sherard. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 438. ubi & memoratur alter niger, butyri vices ſupplens.
Habitat in Japonia.



1. DOLICHOS *trilobus*.
2. GLYCINE *monophyllos*.

DOLICHOS (*biflorus*) caule perenni lævi, pedunculis bifloris, leguminibus erectis. *Linn. ſp.* 1023. *Roy. lugdb.* 368. *n.* 5.
Phaſeolus maderaſpatanus Laplab effigie, flore parvo ochroleuco, ſiliquis falcatis gemellis. *Plukn. phyt.* 291. *t.* 213. *f.* 4.
Phaſeolus frutеſcens perſicus biflorus. *Garcin herb.*
Habitat in India.

DOLICHOS (*catjang*) caule erecto, leguminibus linearibus gemellis erectiuſculis.
Phaſeolus minor. *Rumph. amb.* 5. *p.* 383. *t.* 139.
Phaſeolus indicus, flore cæruleo, ſiliquis erectis gemellis, fructu parvo ruffeſcente. *Plukn. alm.* 290.
Phaſeolus zeylanicus tenellus, ſiliquis anguſtis. *Herm. zeyl.* 44. *Burm. zeyl.* 189.
Pæru. *Rheed. mal.* 8. *p.* 75. *t.* 41.
Habitat in India.

DOLICHOS (*uncinatus*) volubilis, caule perenni, pedunculis multifloris, leguminibus linearibus, ariſta uncinata.
Phaſeolus ſubhirſutus americanus exitioſus, ſiliquis longis cauliculis inſidentibus. *Plukn. phyt.* 290. *t.* 214. *f.* 2.
Hedyſarum trifoliatum repens, foliis oblongis hirſutis. *D. Kleinhof.*
Habitat in India utraque.
Differt a *Plukn.* figura *pedunculis* brevioribus, *leguminibus* ſeptem margine non calloſis. *Tab.* 50.

GLYCINE (*monophyllos*) caule volubili, foliis ſimplicibus reniformibus, floribus paniculatis lateralibus. *f.* 2.
Auricula gliris. *D. Outgaerden*, ſive Illie tſewie incolis.
Habitat Coromandeli.
Caul volubiles glaberrimi, ad exortum pedunculorum *ſtipulis* binis lanceolatis. *Fol.* petiolata, ſolitaria orbiculato-reniformia plicata maculata. *Flor.* rubri. *Legumina* plana monoſperma.

GLYCINE (*javanica*) foliis ternatis, caule villoſo, petiolis hirſutis, bracteis lanceolatis minutis. *Linn. ſp.* 1024. ubi deſcr.
Habitat in India.

GLYCINE (*Abrus*) foliis abrupto-pinnatis, pinnis numeroſis obtuſis. *Linn. ſp.* 1025. *Fl. zeyl.* 284.
Glycirrhiza indica, ſiliquis & ſeminibus piſi coccineis, hilo nigro notatis. *Herm. prodr.* 337.
Phaſeolus Glycirrhizitis, folio alato, piſo coccineo, atra macula notato. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 180. *t.* 112. *f.* 4. 5. 6.
Phaſeolus arboreſcens alatus & volubilis major orientalis, fructu coccineo, hilo nigro notato. *Plukn. alm.* 294. *t.* 214. *f.* 5.
Orobus indicus Abrus Alpini dictus, fructu coccineo, macula nigra notato. *Burm. zeyl.* 177.
Piſum indicum minus coccineum. *Bauh. pin.* 212.
Abrus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 57. *t.* 32.
Konni. *Rheed. mal.* 8. *p.* 71. *t.* 39.
Habitat in utraque India, & Ægypto.

17

GLYCINE (*triloba*) caule glabro proſtrato, foliis ternatis trilobis, ſtipulis minutis, pedunculis longiſſimis.
Trifolium maderaſpatanum, cauliculis piloſis ſcandens, Paſſifloræ modo trilobatum. *Plukn. phyt. t.* 120. *f.* 7.
Habitat in Java.

Floret quotannis in horto; *Caules* & *Pedunculi* glaberrimi, *Stipulæ* infra folia lineares, ad petiolorum exortum ovatæ membranaceæ.

CLITORIA (*Ternatea*) foliis pinnatis. *Linn. ſp.* 1025. *Fl. zeyl.* 283.
Phaſeolus indicus, Glyzirrhizæ foliis, flore amplo cæruleo. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 47. *t.* 24.
Flos clitoridis ternatenſium. *Breyn. cent.* 76. *t.* 31. flore cæruleo & flore albo. *Burm. zeyl.* 100. & 101.
Ternatea flore ſimplici cæruleo. *Tourn. act.* 1706. *p.* 84.
Flos cæruleus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 56. *t.* 31.
Convolvulus quinquefolius glaber, flore cæruleo & albo. D. *Pryon.*
Klinting Javanis.
β Var. foliis minoribus rotundioribus quinquejugis, flore minore cæruleo.

LATHYRUS (*odoratus zeylanicus*) pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliis ovato-oblongis, leguminibus hirſutis. *Linn. ſp.* 1032.
Lathyrus zeylanicus, odorato flore amoeno ex albo & rubro vario. *Burm. zeyl.* 138.
Habitat in Zeylona.

LATHYRUS (*ſativus*) pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ovali-compreſſis, dorſo bimarginatis. *Linn. ſp.* 1030. *Roy. lugdb.* 363. *n.* 4.
Clymenum benghalenſe, cadjan dictum. *Garzin herb.*
Habitat in India & Europa.

Indica differt ab Europæa, *Cirrhis* bifidis abque foliis, *Leguminibus* compreſſis triſpermis, acuminibus uncinatis.

VICIA (*benghalenſis*) pedunculis ſubquinquefloris, foliolis integerrimis, ſtipulis integris, leguminibus erectiuſculis. *Linn. ſp.* 1036. *Roy. lugdb.* 365. *n.* 5.
Vicia benghalenſis hirſuta & incana, ſiliquis Piſi. *Herm. lugdb.* 623. *t.* 625.
Habitat in India.

ARACHIS (*Hypogæa*) *Linn. ſp.* 1049. *Roy. lugdb.* 390.
Arrchidna quadrifolia villoſa, flore luteo. *Plum. gen.* 49. *Ehret. pict.* 5. *f.* 3.
Senna tetraphylla ſ. abſi congener hirſuta maderaſpatenſis, folliculos ſub terra condens. *Plukn. alm.* 341. *t.* 60. *f.* 2.
Chamæbalanus Japonica. *Rumph. amb.* 4. *p.* 426. *t.* 156.
Habitat in Indiis.

CY-



1. CYTISUS *persicus*.
2. SENECIO *biflorus*.
3. HEDYSARUM *spartium*.



1. *CYTISUS persicus*.
2. *SENECIO biflorus*.
3. *HEDYSARUM spartium*.

CYTISUS (*cajan*) racemis axillaribus erectis, foliolis ſublanceolatis tomentoſis, intermedio longius petiolato. *Linn. ſp.* 1041. *Fl. zeyl.* 279. *Roy. lugdb.* 369. *n.* 3.
Cytiſus folio molli incano, ſiliquis orobi contortis & acutis. *Burm. zeyl.* 86. *t.* 37.
Cytiſus fruteſcens. *Plum. ſpec.* 19. *ic.* 114. *f.* 2.
Phaſeolus erectus incanus, ſiliquis toroſis kajan dictus. *Plukn. alm.* 293. *t.* 213. *f.* 3.
Laburnum humilis, ſiliqua inter grana & grana juncta, ſemine eſculento. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 31.
Anagyris indica leguminoſa, ſiliquis toroſis. *Herm. par. bat. p.* 311.
Cajan arbor indica, foliis Trifolii bituminoſi, ſiliquis orobi. *Breyn. prodr.* 1. *p.* 20.
Thora-paeru. *Rheed. mal.* 6. *t.* 13.
Cadjang goedil Javanis. Cathaetora Cinghalenſibus.
Habitat in Indiis.

Profert piſa flava, quæ ab incolis comeduntur. *Herm. herb.*

CYTISUS (*perſicus*) ramis ſtrictis divaricatis, floribus ſolitariis ſparſis, foliis lineari-lanceolatis; medio duplo longiore. *Tab.* 51. *f.* 1.
Cytiſus perſicus humilis. *Garcin. herb.*
Habitat in Perſia.

ROBINIA (*mitis*) racemis pedicelli ternis, foliis impari-pinnatis, caule inermi. *Linn. ſp.* 1044. ubi deſcr.
Phaſeolo accedens arbor indica Coral dicta polyphylla non ſpinoſa, foliis mollibus. *Plukn. phyt.* 293. *t.* 104. *f.* 3.
Habitat in India.

ROBINIA (*javanica*) caule inermi, foliis pinnatis ſexjugis, pedunculis ſimplicibus multifloris.
Habitat in Java.

HIPPOCREPIS (*multiſiliquoſa*) leguminibus pedunculatis confertis, margine altero lobatis. *Linn. ſp.* 1050. *Roy. lugdb.* 384. *n.* 2.
Ferrum equinum perſicum. *Garzin. herb.*
Ferrum equinum alterum polyceraton. *Fab. col. ecphr.* 1. *p.* 300. cujus icon cum indica planta omnino convenit.
Ferrum equinum, ſiliqua multiplici. *Bauh. pin.* 346.
Habitat in India & Europa.

HEDYSARUM (*bupleurifolium*) foliis ſimplicibus lanceolatis acutis, caule inermi. *Linn. ſp.* 1051.
Ornithopodium maderaſpatanum bupleuri folio. *Petiv. gazoph.* 18. *t.* 11. *f.* 12.
Scorpioides maderaſpatanum graminis leucanthemi foliis, ſiliquis nodoſis. *Plukn. amalth.* 189. *t.* 443. *f.* 4.

Geniſta articulata repens, foliis longis acutis ex ſingulo nodo unum producens folium, flore cæruleo, ſiliculis glabris. D. *Pryon.*
Habitat in India.

HEDYSARUM (*nummularifolium*) foliis ſimplicibus cuneiformibus. *Linn. ſp.* 1051. *Fl. zeyl.* 288.
Hedyſarum monophyllum repens, folio nummulariæ rotundo, ſiliculis hispidis parvis. *Burm. zeyl.* 113.
Onobrychis maderaſpatana nummulariæ foliis, ornithopodii ſiliquis. *Petiv. gaz.* 41. *t.* 26. *f.* 4.
Geniſta articulata repens, foliis craſſiuſculis rotundis, flore cæruleſcente, ſiliquis glabris, nullis articulis vel interſtitiis diſtinctis. D. *Pryon.*
Habitat in India.

In binis his ſpeciebus mire ludit natura; videnturque ambæ hybridæ, quum inter miſſa ſpecimina plura inveniantur foliis inferioribus ſubrotundis, & ovalibus non cuneiformibus, ſuperioribus lanceolatis, conveniuntque inter ſe quoad creſcendi modum, ſtipulis paleaceis, longitudine petiolorum, & leguminibus toruloſis.

Tab. 52. *f.* 1. HEDYSARUM (*reniforme*) foliis ſimplicibus reniformibus. *Linn. ſp.* 1051.
Cadjang Djingkok Javanis. D. *Kleinhof.*
Habitat in India.

HEDYSARUM (*maculatum*) foliis ſimplicibus ovatis obtuſis. *Linn. ſp.* 1051. *Fl. zeyl.* 290. *Roy. lugdb.* 385. *n.* 1.
Hedyſarum humile, capparidis folio maculato. *Dill. elth.* 170. *t.* 141. *f.* 168.
Hedyſarum monoſpermum zeylanicum pedunculatum. *Burm. zeyl.* 114.
Habitat in India.

HEDYSARUM (*ſtyracifolium*) foliis ſimplicibus cordato-orbiculatis retuſis ſupra glabris. *Linn. ſp.* 1052.
Habitat in India.

HEDYSARUM (*gangeticum*) foliis ſimplicibus ovatis acutis, baſi ſtipulatis. *Linn. ſp.* 1052.
Hedyſarum monophyllum latifolium, ſiliculis plurimis, ſpica longa digeſtis. *Burm. zeyl.* 113. *t.* 49. *f.* 2.
Hedyſarum indicum, folio ſingulari acuminato. *Tourn. inſt.* 401.
Onobrychis gangetica monophyllos, ſiliculis ſingularibus lævibus, foliatim per internodia diſcriminatis. *Plukn. alm.* 270. *t.* 50. *f.* 3.
Onobrychis zeylanica, folio ſingulari oblongo rotundo. *Raj. ſuppl.* 453.
Phaſeolus montanus. *Rumph. amb.* 6. *p.* 146. *t.* 66.
Habitat in India.

Hæc quod foliaturam præcedenti propingua, qua ambæ ſæpius variant.

HE-



1. HEDYSARUM reniforme.
2. ——— triquetrum.
3. ——— moniliforme.



1. HEDYSARUM reniforme.
2. ——— triquetrum.
3. ——— moniliforme.

HEDYSARUM (*vaginale*) foliis ſimplicibus cordato-oblongis, petiolis ſimplicibus, ſtipulis vaginalibus. *Linn. ſp.* 1052. *Fl. zeyl.* 287.
Geniſta articulata repens, foliis craſſiuſculis planis acutis. *Burm. zeyl.* 104. *t.* 49. *f.* 1.
Hedyſarum monophyllum repens, ſiliculis glabris non crenatis. *Herm. zeyl.* 33.
Habitat in Zeylona.

HEDYSARUM (*triquetrum*) foliis ſimplicibus cordato-oblongis, petiolis alatis, ramis triquetris. *Linn. ſp.* 1052. *Fl. zeyl.* 286. *Tab.* 52. *f.* 2.
Hedyſarum zeylanicum, Aurantii folio. *Burm. zeyl.* 120.
Onobrychis zeylanica, Aurantii folio. *Petiv. ſicc.* 247. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 247.
Onobrychis zeylanica monophyllos, caule triangulo, petiolis foliorum alatis. *Burm. zeyl.* 176. *t.* 81.
Phaſeolus montanus ſeptimus. *Rumph. amb.* 6. *p.* 146.
Kitjingorang Javanis. cujus ſpecimina differunt, foliis lanceolatis uti in noſtra figura, & ovatis uti in illa parentis.
Habitat in India.

HEDYSARUM (*ſtrobiliferum*) foliis ſimplicibus, bracteis ſtrobilorum cordatis obtuſis. *Linn. ſp.* 1053. *Fl. zeyl.* 287. *t.* 3.
Onobrychis Indiæ orientalis, Fagi foliis alternis, ſiliculis ſpica longa diſpoſitis. *Petiv. muſ.* 788. *Raj. ſuppl.* 234.
Carpinus zeylanica ſiliculoſa, ſive arbuſcula zeylanica ſiliculoſa carpino ſimilis. *Burm. zeyl.* 54.
Ringan-Ringan Javanis.
Habitat in India.

HEDYSARUM (*diphyllum*) foliis binatis petiolatis, floralibus ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 1053. *Fl. zeyl.* 291.
Hedyſarum bifolium, ſiliculis aſperis geminis inarticulatis. *Burm. zeyl.* 114. *t.* 50. *f.* 1.
Hedyſarum indicum bifolium repens, floſculis luteis, ſiliquis aſperis villoſis. *Hartogh. herb.*
Plantula repens indica, binis in ramulorum extremitate foliolis, floſculis luteis trifolii, ſeminibus latis. *Herm. zeyl.* 58.
Nelam-mari. *Rheed. mal.* 9. *p.* 161. *t.* 82.
Habitat in Indiis.

HEDYSARUM (*pulchellum*) foliis ternatis, bracteis ſtrobilorum orbiculatis conjugatis. *Linn. ſp.* 1053. *Fl. zeyl.* 292.
Hedyſarum trifoliatum fruteſcens, flore & fructu inter duo foliola abſconditis. *Burm. zeyl.* 116. *f.* 52.
Onobrychis maderaſpatana triphylla, ſiliculis eleganter foliaceis. *Raj. ſuppl.* 234.

Onobrychis indica triphyllos, foliis amplis mucronatis, ſiliquis parvis, in ſpicam longam ex alis inter bina foliola circinnata arcte conniventia reconditis. *Plukn. amalth.* 161. *t.* 433. *f.* 7.

Arbuscula zeylanica trifolia, ſiliculis Carpino ſimilibus, folliculis incluſis. *Herm. zeyl.* 58.

Appa appa Beſaer Javanis.

Habitat in India.

HEDYSARUM (*junceum*) foliis ternatis lanceolatis, leguminibus uniarticulatis rhombeis, pedunculis lateralibus ſubumbellatis. *Linn. ſp.* 1053. *Fil. dec.* 1. *t.* 4.

Habitat in India.

Tab. 51. *f.* 2. HEDYSARUM (*ſpartium*) foliis ſimplicibus ternatiſque, leguminibus articulatis hiſpidis, floſculis ſubgeminis.

Spartium perſicum monophyllum & triphyllum. *Garzin. herb.*

Habitat in India.

Planta albicans ſubtomentoſa. *Caul.* fruticoſi ſtriati dichotomi *Stip.* breviſſimæ obtuſæ. *Fol.* ſolitaria & ternata oblonga tomentoſa. *Fl.* ſparſi ſubpedicellati gemini vel & ſolitarii. *Calyx* breviſſimus quinque dentatus, *Corolla* lutea, *ungue* longitudine calycis, *limbo* plano. *Legum.* orbiculato-compreſſum, *ſetis* rubris hiſpidum, figura ac in *Hedyſaro diphyllo*, articulis tribus monoſpermis.

HEDYSARUM (*umbellatum*) foliis ternatis, pedunculis umbelliferis, caule fruticoſo. *Linn. ſp.* 1053. *Fl. zeyl.* 293.

Hedyſarum trifoliatum arboreſcens, floribus ex alis foliorum, ſiliquis copioſis glabris. *Burm. zeyl.* 115. *t.* 51.

Trifolium zeylanicum arboreſcens, ſiliquis compreſſis articulatis, floribus albis. *Herm. zeyl.* 21.

Folium crocodili. *Rumph. amb.* 4. *p.* 112. *t.* 52.

Habitat in India.

HEDYSARUM (*biarticulatum*) foliis ternatis, caule ſuffruticoſo, leguminibus biarticulatis. *Linn. ſp.* 1054. *Fl. zeyl.* 296.

Hedyſarum triphyllum, ſiliculis glabris peltatis geminis inarticulatis. *Burm. zeyl.* 114. *t.* 50. *f.* 2.

Hedyſarum zeylanicum anguſtifolium triphyllum, ſiliculis compreſſis articulatis. *Herm. muſ. zeyl.* 51.

Onobrychis zeylanica trifolia minor perennis. *Raj. ſuppl.* 457.

Habitat in India.

HEDYSARUM (*heterocarpon*) foliis ternatis, floribus ſpicatis, leguminibus articulatis, infimo monoſpermo, ſtipulis ſetaceis. *Linn. ſp.* 1054. *Fl. zeyl.* 298.


Hedyſarum trifoliatum, ſiliculis inferioribus ſolitariis, ſuperioribus articulatis *Burm. zeyl.* 117 *t.* 53 *f.* 1.

Hedyſarum triphyllum zeylanicum rotundifolium. *Herm. zeyl.* 35.

Habitat in Zeylona.

HE-

T. 53.



1. HEDYSARUM *lineatum*.
2. ———————— *lagopoides*.



1. HEDYSARUM *lineatum*.
2. ——— *lagopoides*.

P. 167.



1. HEDYSARUM *capitatum*.
2. ——— *stipulaceum*.

HEDYSARUM (*viſcidum*) foliis ternatis, leguminibus membranaceis lævibus integris, caule ramiſque hiſpidis. *Linn.* 1054. *Fl. zeyl.* 295.
Hedyſarum trifoliatum viſcoſum, Phaſeoli folio ſubrotundo, ſiliculis compreſſis hirſutis. *Herm. zeyl.* 36.
Phaſeolus viſcoſus, ſpicato flore ac fructu villoſo. *Burm. zeyl.* 187. *t.* 84. *f.* 1?
Habitat in Zeylona.

HEDYSARUM (*lineatum*) foliis ternatis ovalibus lineatis, racemis axillaribus, floribus pendulis. *Linn. ſp.* 1059. ubi deſcr. *Tab.* 53. *f.* 1.
Dauro-apapa Javanis.
Habitat in India.

HEDYSARUM (*viridiflorum*) foliis ternatis acutiuſculis, caule erecto, racemis longiſſimis erectis. *Linn. ſp.* 1055. *Gron. virg.* 109.
Onobrychis americana, floribus ſpicatis, foliis ternis caneſcentibus, ſiliculis aſperis. *Plukn. alm.* 276. *t.* 308. *f.* 5.
Hedyſarum trifoliatum ſpicatum, foliis acuminatis. D. *Pryon.*
Hedyſarum triphyllum fruticoſum ſupinum, flore purpureo. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 118. *f.* 2.
Habitat in Java & Virginia.

HEDYSARUM (*capitatum*) foliis ternatis ſubrotundis tomentoſis, racemis capitatis, calycibus glabris. *Tab.* 54. *f.* 1.
Hedyſarum trifoliatum arboreſcens, floribus ſpicatis, foliis ſubrotundis ſubtus lanuginoſis. *Burm. zeyl.* 115.
Onobrychis Indiæ orientalis triphylla, foliis ſubrotundis venoſis, averſa parte tenui viridique lanugine tectis. *Plukn. amalth.* 161. *t.* 433. *f.* 3.

Caul. fruteſcentes ſimplices albicantes. *Fol.* terna ſubrotunda integerrima tomentoſa, *petiolis* folii medii ſtipulatis. *Stipulæ* binæ lanceolatæ emarcidæ ad alas foliorum, e quibus *Pedunculi* racemoſi ante floreſcentiam capitato-conici.

HEDYSARUM (*hamatum*) foliis ternatis nervoſis nudis, ſpicis ſeſſilibus, leguminibus diſpermis obtectis acumine uncinatis. *Linn. ſp.* 1056.
Trifolium procumbens zeylanicum hirſutum, loti facie. *Burm. zeyl.* 226. *t.* 106. *f.* 2.
Trifolium veſicarium repens, Phaſeoli foliis hirſutis. *Herm. zeyl.* 42.
Trifolium procumbens, foliis ciliatis nervoſis, ſiliculis monoſpermibus acuminatis quinqueſtriatis. *Brown. jam.* 298.
Habitat in Zeylona & Jamaica.

HEDYSARUM (*triflorum.*) foliis ternatis obcordatis, caulibus procumbentibus, pedunculis unifloris ternis. *Linn. ſp.* 1057. *Fl. zeyl.* 97.
Hedyſarum trifoliatum repens, acetoſellæ folio glabro, caule hirſuto. *Burm. zeyl.* 119. *t.* 54. *f.* 2.

β He-

β Hedyſarum trifoliatum repens, folio ovali glabro, caule hirſuto, ſiliqua plana articulata. *Burm. zeyl.* 118. *t.* 54. *f.* 1.
Trifolium indicum majus cordatum, ſiliquis depreſſis articulatis. *Herm. zeyl.* 56.
Habitat in India.

Maxime differt foliatura, quæ in quibuſdam ſpeciminibus duplo major eſt, notatque *Herm.* in ejus *herb.* quod nitatur radice prælonga, fibras habente, innumeris bulbulis carnoſis albeſcentibus donatas, flores ex purpureo & cæruleo mixti.

Tab. 53. *f.* 2. HEDYSARUM (*lagopoides*) foliis ternatis obtuſis, ſpicis hirſutis. *Linn. ſp.* 1157. ubi deſcr.
Trifolium agreſte javanicum, ſeu cauda felis. D. *Kleinhof.*
Habitat in Java & China.

Tab. 54. *f.* 2. HEDYSARUM (*ſtipulaceum*) caule procumbente, foliis ternatis obcordatis, ramulis ſtipulaceis, floribus ſolitariis.
Hedyſarum Perſicum & malabaricum. *Garcin. herb.*
Crecit in Perſia.

Caul. procumbentes flexuoſi glabri, ad genicula *ſtipulis* lanceolatis amplexicaulibus, *Rami* alterni ad ſingulum geniculum patentiuſculi, circa medium declinati, *ſtipulis* plurimis oppoſitis lanceolatis brevibus ſetaceis. *Fol.* terna obcordata glabra, linea longitudinali plicata. *Flor.* ſolitarii axillares vel oppoſitifolii, *leguminibus* compreſſis glabris obtuſis bi & tetraſpermis falcatis.

Tab. 52. *f.* 3. HEDYSARUM (*moniliforme*) caulibus procumbentibus ſtipulaceis, foliis orbiculatis ſolitariis, leguminibus moniliformibus, articulis globoſis.
Collecta Coromandeli.

Radix perennis lignoſa. *Caul.* ſpithamei plures proſtrati, *ramis* ſparſis. *Stipulæ* bipartitæ ſtriatæ ſetaceæ plurimæ. *Fol.* ſimplicia petiolata orbiculata obtuſa lævia. *Capitula* axillaria. *Legumina* ſæpius faſciculata pedunculata, ornithopi figura, *articulis* quinque globoſis pubeſcentibus toruloſis adhærentibus, magnis ratione foliorum.

Tab. 55. *f.* 1. HEDYSARUM (*proſtratum*) caulibus proſtratis, foliis pinnatis, capitulis lateralibus ſubſeſſilibus, leguminibus ovato-cylindricis diſpermibus indiviſis.
Collecta Coromandeli.

Caul. ſpithamei diffuſi lignoſi glaberrimi teretes ramoſi. *Fol.* pinnata foliolis 5. *v.* 7. cuneiformibus glabris cinereis. *Stipulæ* membranaceæ patulæ bifidæ. *Floſculi* pedunculati terni & quini, calycibus perſiſtentibus ariſtatis. *Leg*: minima ovato cylindrica non interrupta toruloſa acuminata biſperma lævia, piſtillo recto mucronata. *Semina* minima reniformia.

HE-



1 . HEDYSARUM prostratum .
2 . ——— siliquosum .



1 . **HEDYSARUM** *proſtratum* .
2 . ——————— *ſiliquoſum* .

HEDYSARUM (*ſiliquoſum*) foliis ternatis ovalibus, ſtipulis ſetaceis, ſpicis terminalibus, leguminibus integerrimis. *Tab.* 55. *f.* 2.
Trifolium montanum, ekkor meong javanis. D. *Kleinhof*, qui ex Java miſit.

Convenit externa forma cum capitato, *Stipulæ* autem in hocce lanceolatæ erectiuſculæ ſetaceæ; *Floreſc*: *Spica* paniculata terminalis, *leguminibus* integerrimis planis glabris, ſingulo loculo extus linea obliqua diſtincto.

HEDYSARUM (*crinitum*) foliis pinnatis, racemis oblongis, pedunculis inflexis, calycibus hirtis, leguminibus ſubrotundis compreſſis inflexis. *Tab.* 56.
Habitat in Java, unde absque nomine miſſum.

Caul. fruticoſi lignoſi teretes lineati geniculati. *Fol.* pinnata cum impari, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis. *Stipulæ* binæ ad exortum foliorum lanceolatæ, foliolorum ſetaceæ. *Floreſcentia* ſpicata pedalis. *Pedunculi* ſparſi incurvi, *pilis* albis ſimplicibus lanati. *Calyces* in apice pedunculi hirti. *Coroll.* obliqua flexuoſa. *Leg.* inflexa ſubrotunda.

ÆSCHYNOMENE (*grandiflora*) caule arboreo, floribus maximis, leguminibus filiformibus. *Linn. ſp.* 1060.
Robinia. *Linn. ſp.* 1. *p.* 722.
Sesban affinis arbor Indiæ orientalis. *Breyn. prodr.* 1. *p.* 47. *Comm. mal.* 244.
Galegæ affinis malabarica arboreſcens, ſiliquis majoribus umbellatis. *Raj. hiſt.* 1734.
Emerus ſiliquis glabris longiſſimis, Turi Turi javanis. *D. Pryon.*
Turia. *Rumph. amb.* 1. *p.* 188. *t.* 76.
Agaty. *Rheed. mal.* 1. *p.* 95. *t.* 51.
Habitat in India.

ÆSCHYNOMENE (*arborea*) caule arboreo lævi, leguminum articulis ſemi cordatis glabris. *Linn. ſp.* 1060. *Roy. lugdb.* 384.
Habitat in India.

ÆSCHYNOMENE (*aſpera*) caule herbaceo ſcabro, leguminum articulis medio ſcabris. *Linn. ſp.* 1060. *Fl. zeyl.* 298. *Roy. lugdb.* 384.
Hedyſarum annuum majus zeylanicum, Mimoſæ foliis. *Tourn. inſt.* 402. *Burm. zeyl.* 119.
Mimoſa non ſpinoſa major zeylanica. *Breyn. cent.* 51. *t.* 52. *Raj. hiſt.* 912.
Turie rava Malaice javanis.
Habitat in Zeylona & Java.

ÆSCHYNOMENE (*indica*) caule herbaceo lævi, foliolis obtuſis, leguminibus hinc toroſis obtuſis. *Linn. ſp.* 1061. *Roy. lugdb.* 385. *n.* 4.
Æſchynomene flore papilionaceo, ferri equini ſiliquis. *Raj. app.* 481.
Cajatus. *Rumph. amb.* 4. *p.* 64. *t.* 24.
Neli-tali. *Rheed. mal.* 9. *p.* 31. *t.* 18.
Habitat in India.

ÆSCHYNOMENE (*Sesban*) caule herbaceo lævi, foliolis obtuſis, leguminibus cylindricis æqualibus. *Linn. ſp.* 1061.
Æſchynomene mitis, ſeu mimoſa anguſtiore ſiliqua, foliis perexiguis, maderaſpatana. *Plukn.* 252. *t.* 5. *f.* 2.
Galega ægyptiaca ſiliquis propendentibus longiſſimis & anguſtiſſimis. *Herm. lugdb.* 267.
Galega ægyptiaca ſiliquis articulatis. *Bauh. pin.* 352.
Sesban ex inſula zeylon. *Breyn. prod.* 1. *p.* 47. *Burm.* 214.
Sesban. *Alpin. ægypt* 81. *t.* 82.
Habitat in India & Ægypto.

ÆSCHYNOMENE (*pumila*) caule herbaceo lævi, foliolis acuminatis, leguminibus hinc ſerratis medio ſcabris. *Linn. ſp.* 1061. ubi deſcr.
Hedyſarum minus annuum zeylanicum, mimoſæ foliis. *Linn. Fl. zeyl.* 551. *Burm. zeyl.* 120.
Onobrychis annua zeylanica minor, ſiliquis articulatis aſperis. *Herm. lugdb.* 458. *Raj. hiſt.* 481.
Herba catta zeylanica, ſiliquis latis compreſſis minoribus. *Breyn. cent.* 47.
Niti todda-valli. *Rheed. mal.* 9. *p.* 35. *t.* 20.
Habitat in India.

INDIGOFERA (*tinctoria*) leguminibus arcuatis incanis, racemis folio brevioribus. *Linn. ſp.* 1061. *Fl. zeyl.* 273. *Mill. ic. t.* 34.
Colutea indica humilis, ex qua indigo, folio viridi. *Herm. zeyl.* 32. *Burm. zeyl.* 69.
Iſatis indica, foliis roriſmarini, glaſti affinis. *Bauh. pin.* 113.
Indigo benghalenſis. *Garcin. herb.*
Indicum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 220. *t.* 80.
Ameri. *Rheed. mal.* 1. *p.* 101. *t.* 54.
Anil. ſ. Nil inodorum color. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 945.
β Colutea ſiliquoſa maderaſpatana ad nodos caulium ſiliquis bigemellis. *Plukn.* 113. *t.* 165. *f.* 5.
Habitat in Indiis.

INDIGOFERA (*hirſuta*) leguminibus pendulis lanatis tetragonis. *Linn. ſp.* 1062. *Fl. zeyl.* 272.
Aſtragalus ſpicatus, ſiliquis pendulis hirſutis, foliis ſericeis. *Burm. zeyl.* 37. *t.* 14.
Aſtragalus indicus ſpicatus, ſiliquis copioſis deorſum ſpectantibus non ſalcatis polylobis. *Herm. herb.*
Katu Tagera. *Rheed. mal.* 9. *p.* 55. *t.* 30. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 455.
Habitat in India.

IN-

t. 58.



HEDYSARUM crinitum.



HEDYSARUM *crinitum*.

INDIGOFERA (*glabra*) leguminibus horizontalibus teretibus, foliis pinnatis ternatiſque. *Linn. ſp.* 1062. *Fl. zeyl.* 274.
Colutea ſiliquoſa glabra, ternis quiniſve foliis, maderaſpatana, ſemine rubello. *Plukn. alm.* 113. *t.* 166. *f.* 1.
Aſtragalus zeylanicus tenellus, viciæ foliis ſubrotundis. *Burm. zeyl.* 39.
Nir pullari. *Rheed. mal.* 9. *p.* 67. *t.* 36.?
Habitat in India.

INDIGOFERA (*trifoliata*) leguminibus ſubſeſſilibus compreſſis pendulis, foliis ternatis lanceolatis. *Linn. ſp.* 1062.
Habitat in India.

INDIGOFERA (*argentea*) leguminibus ſubſeſſilibus toruloſis, foliis ternis quiniſque orbiculatis.
Coronilla perſica argentea. *Garcin. herb.*
Habitat in Perſia.
Planta ſericeo-tomentoſa. *Caul.* fruteſcentes teretes. *Fol.* terna & quina ſeſſilia orbiculata, linea longitudinali plicata. *Legumina* ex proprio ramulo vel bina vel quaterna ſubſeſſilia minima ex albo tomentoſa, apicibus ſeta incurva.

GALEGA (*villoſa*) leguminibus retrofalcatis villoſis pendulis racemoſis lateralibus, foliolis glabris lanceolatis. *Linn. ſp.* 1063. *Fl. zeyl.* 299.
Securidaca maderaſpatenſis, ſiliquis falcatis fulvis & villoſis plurimis, circum ramulos ſtellatim poſitis. *Plukn. alm.* 399. *t.* 59. *f.* 6.
β Coronilla zeylanica ſiliquis fuſcis hirſutis piloſis, flore albo. *Burm. zeyl.* 78. *t.* 33.
Colutea indica platycarpos, flore albo amplo. *Herm. zeyl.* 54.
Habitat in India.

GALEGA (*maxima*) leguminibus ſtrictis adſcendentibus glabris, ſtipulis lanceolatis, foliolis oblongis glabris ſtriatis. *Linn. ſp.* 1063.
Cracca. *Linn. Fl. zeyl.* 300.
Vicia foliis glabris venoſis oblongis, floribus gemellis. *Burm. zeyl.* 228. *f.* 2. *t.* 108.
Habitat in Zeylona.

GALEGA (*purpurea*) leguminibus ſtrictis adſcendentibus glabris racemoſis terminalibus, ſtipulis ſubulatis, foliis oblongis glabris. *Linn. ſp.* 1063.
Cracca. *Linn. Fl. zeyl.* 301.
Coronilla zeylanica herbacea, flore purpuraſcente. *Burm. zeyl.* 77. *t.* 32.
Aſtragalus zeylanicus purpureus ſpicatus elegans. *Herm. zeyl.* 33.
Habitat iu Zeylona.

GALEGA (*tinctoria*) ſpicis lateralibus pedunculatis, leguminibus ſtrictis pendulis, foliolis emarginatis ſubtus villoſis. *Linn. ſp.* 1063.
Cracca. *Linn. Fl. zeyl.* 302.
Altragalus zeylanicus ſericeus, ſiliquis oblongis, floribus carneis. *Herm. zeyl.* 34.
Habitat in Zeylona.

GALEGA (*ſenticoſa*) leguminibus binis lateralibus glabris, foliolis emarginatis ſubtus ſericeis, caule fruticoſo. *Linn. ſp.* 1063.
Cracca. *Linn. Fl. zeyl.* 303.
Coronilla ſurattenſis. *Garcin. herb.*
Habitat in Zeylona.

GALEGA (*barba jovis*) leguminibus ſolitariis glabris axillaribus, foliis oblongis, ſtipulis ſubulatis.
Barba Jovis bombayenſis incana. *Garcin herb.*
Ornithopodium majus e maderaſpatan, foliis lanugine argenteis. *Plukn. phyt.* 275. *t.* 52. *f.* 1.
Habitat in India.

Planta albicans tomentoſa. *Caul.* ſuffruteſcentes. *Fol.* pinnata, foliolis oblongis obtuſis integerrimis. *Stipulæ* ad ortum petiolorum incraſſatæ ſubulatæ. *Fl.* ſubpetiolati. *Legum.* ſolitaria glabra.

GALEGA (*Colutea*) leguminibus racemoſis ſtrictis adſcendentibus rugoſis, foliolis obovatis ſericeis.
Colutea ſiliquoſa enneaphyllos Indiæ orientalis, ſiliquis & foliis averſa parte pubeſcentibus. *Plukn.* 112. *t.* 166. *f.* 3.
Habitat in India.

ASTRAGALUS (*chinenſis*) cauleſcens ſtrictus glaber, floribus racemoſis pendulis, leguminibus ovatis inflatis utrinque mucronatis. *Linn. ſp.* 1066. *Fil. dec.* 1. *t.* 3.
Habitat in China.

Tab. 49. f. 2. PSORALEA (*corylifolia*) foliis ſimplicibus ovatis. *Linn. ſp.* 1075.
Dorycnium. *Roy. lugdb.* 389. *n.* 2.
Loto-affinis Coryli folio. *Dodart. act.* 4. *p.* 289. *t.* 289. *Plukn. alm.* 277. *t.* 96. *f.* 5.
Lotus zurattenſis. *Garcin. herb.*
Habitat in India.

PSORALEA (*enneaphylla*) foliis pinnatis, ſpicis axillaribus. *Linn. ſp.* 1076. *Jacq. amer.* 27.
Colutea enneaphyllos lotoides, ſiliquis conglomeratis. *Plukn. alm.* 113. *t.* 166. *f.* 2.
Habitat in Indiis.

TRIFOLIUM (*M. indica*) leguminibus racemoſis nudis monoſpermis, caule erecto. *Linn. ſp.* 1077. *Fl. zeyl.* 552.
Melilotus lutea Indiæ Orientalis erecta, folliculis rotundis parvis. *Plukn. alm.* 246. *t.* 45. *f.* 4.
β Melilotus indica hortenſis ſativa, floribus odoratis albis. *Burm. zeyl.* 157.
Me-

Melilotus humilis erecta, floribus exiguis odoratis albis. *Plukn. alm.* 247. *t.* 45. *f.* 5.
Swendadi-pullu. *Rheed. mal.* 9. *p.* 75. *t.* 40.
Habitat in India.

LOTUS (*peregrinus*) leguminibus ſubbinatis linearibus compreſſis nutantibus. *Linn. ſp.* 1090.
Lotus ſiliquis geminis peregrina. *Boerh. lugdb.* 2. *p.* 38.
Trifolium indicum, flore rubro. *D. Kleinhof.*
Habitat in Europa & India.

Caul. ſuffruteſcentes teretes glabri. *Fol.* terna linearia, *bract.* lanceolatæ, *legum.* ſolitaria & bina linearia compreſſa glaberrima nutantia.

LOTUS (*perſicus*) leguminibus ternis terminalibus toruloſis, foliis ternis quinisve lineari-lanceolatis piloſis. *Tab.* 49. *f.* 3.
Lotus perſicus tomentoſus. *Garcin. herb.*
Habitat in Perſia.

Caul. ſpithamei teretes villoſi. *Fol.* terna & quina lineari-lanceolata piloſa. *Legum.* terminalia toruloſa uncinata.

TRIGONELLA (*indica*) leguminibus ſeſſilibus ſubſolitariis ſubfalcatis, foliolis integerrimis, caule diffuſo. *Linn. ſp.* 1095. *Fl. zeyl.* 285.
Lotus maderaſpatanus villoſus, Ornithopodii ſiliqua ſingulari. *Plukn. alm.* 266. *t.* 200. *f.* 7.
Aſtragalus minimus repens triphyllus, ſiliquis falcatis. *Herm. zeyl.* 33. *Burm. zeyl.* 39.
Lotus indicus, ſiliquis acinaciformibus. *Garcin. herb.*
Habitat in India.

POLYADELPHIA PENTANDRIA.

CITRUS (*Limon*) petiolis linearibus. *Linn. ſp.* 1100.
Limonia malus ſilveſtris zeylanica, fructu pumilo, ſeu Limones pumili ſylveſtres. *Burm. zeyl.* 43. *t.* 65. *f.* 1.
Limonellus cum varietatibus. *Rumph. amb.* 2. *p.* 106. *t.* 29. *&c.*
Malus Limonia acida. *Bauh. pin.* 436.
Crandang malaice Javanis.
Habitat in India & Europa.

CITRUS (*Aurantium*) petiolis alatis. *Linn. ſp.* 1100. *Fl. zeyl.* 304. *Roy. lugdb.* 266. *n.* 2.
Malus Aurantia regia dulcis zeylanica. *Herm. zeyl.* 68. *Burm. zeyl.* 39.
Malus Aurantia major. *Bauh. pin.* 436.

β Aurantium, quæ malus Aurantia indica, fructu omnium maximo Pumpelmus dicto, medulla palleſcente & rufeſcente. *Herm. lugdb.* 405. *Burm. zeyl.* 39.
Limon decumanus, Pompelmos dictus. *Rumph. amb.* 2. *p.* 95. *t.* 25. *&c.*
Jerrek liepis Javanis.
Habitat in utrisque Indiis.

CITRUS (*trifoliata*) foliis ternatis. *Linn. ſp.* 1101.
Sſii s-karatas. *Kæmpf. amoen. p.* 801. *t.* 802.
Habitat in Japonia.

POLYANDRIA.

HYPERICUM (*monogynum*) floribus monogynis, ſtaminibus corolla longioribus, calycibus coloratis, caule fruticoſo. *Linn. ſp.* 407. *Mill. dict. t.* 151. *f.* 2.
Habitat in China.

SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

57. HIERACIUM (*javanicum*) foliis lanceolatis amplexicaulibus denticulatis, pedunculis unifloris, calycibus glabris.
Sonchus flore purpureo in Java inventus. *Garcin. herb.*

In noſtro ſpecimine inferiora æque ac ſuperiora folia amplexicaulia, uti in figura depicta ſunt.

LAPSANA (*japonica*) calycibus obovatis glabris, foliis radicalibus petiolatis lanceolatis, ſcapo ſubunifolio quadrifloro.
Hieracium japonicum. *D. Kleinhof.*
β Hieracium aſphodeli foliis acuminatis montanum. *Bocc. muſ.* 147. *t.* 106.
Sonchus aphyllocaulos anguſto & oblongo folio. *Plukn. phyt.* 354. *t.* 62. *f.* 4.
Habitat in Japonia.

Rad. præmorſa radiculis fibroſis. *Fol.* radicalia erecta, petiolis longiſſimis dilatatis in folia excurrentibus, lanceolata integerrima. *Scapus* erectiuſculus teres, in cujus medio foliolum, ſuperne bifidus, pedunculis bifloris. *Cal.* ovatus glaberrimus foliolis æqualibus lineari-lanceolatis, ad cujus baſin *ſquammæ* inæquales imbricatæ. *Cor.* lutea ligulata.

CARTHAMUS (*tinctorius*) foliis ovatis integris ſerrato-aculeatis. *Linn. ſp.* 1162.
Carthamus ſativus ſive carthamus officinarum. *Bauh. pin.* 378.
Cnicus indicus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 215. *t.* 79.
Cnicus vulgaris. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 152.
Habitat in Ægypto & India.

BI-

57

T. 57.



1. HIERACIUM *javanicum*.
2. LAPSANA *japonica*.
3. SICYOS *garcini*.



1. HIERACIUM *javanicum*.
2. LAPSANA *japonica*.
3. SICYOS *garcini*.

BIDENS (*nodiflora*) foliis oblongis integerrimis unidentatis, caule dichotomo, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 1165. ubi deſcr.
Bidens nodiflora, Brunellæ folio. *Dillen. elth.* 52. *t.* 44. *f.* 2.
Habitat in Benghala.

BIDENS (*piloſa*) foliis pinnatis ſubpiloſis, caulis geniculis barbatis, calycibus involucro ſimplici, ſeminibus divergentibus. *Linn. ſp.* 1166.
Bidens latifolia hirſutior, ſemine anguſtiore radiato. *Dill. elth.* 51. *t.* 43. *f.* 51.
Adjerான-u'an Javanis.
Habitat in Indiis.

Differt foliis ternatis & quinatis, in ſupremo caulis aliquando ſimplicibus.

BIDENS (*bipinnata*) foliis bipinnatis inciſis, calycibus involucratis, corollis ſemiradiatis, ſeminibus divergentibus. *Linn. ſp.* 1166.
Chryſanthemum americanum, Coridis Indi folio. *Herm. par.* 123. *t.* 123.
Chryſanthemum chinenſe, foliis pluriſariam diviſis Halicacabi peregrini æmulis. *Plukn. phyt. t.* 22. *f.* 4.
Habitat in China & Virginia.

CACALIA (*Kleinia*) caule fruticoſo compoſito, foliis lanceolatis planis, petiolorum cicatricibus obſoletis. *Linn. ſp.* 1168.
Kleinia foliis lanceolatis planis, caule lævi ventricoſo. *Linn. H. Cliff.* 395.
Cacalianthemum folio Nerii glauco. *Dill. elth.* 61. *t.* 54. *f.* 2.
Frutex Indiæ orientalis, Lavendulæ folio. *Bauh. pin.* 401.
Habitat in India & Canariis.

CACALIA (*ſonchifolia*) caule herbaceo, foliis lyratis amplexicaulibus dentatis. *Linn. ſp.* 1169. Kleinia. *Linn. Fl. zeyl.* 305.
Chondrilla zeylanica minor marina, folio ſinapios. *Burm. zeyl.* 61.
Senecio maderaſpatanus ſinapios folio, floribus parvis luteis. *Plukn. amalth.* 192. *t.* 444. *f.* 1. & 227. *f.* 3.
Sonchus Amboinenſis. *Rumph.* 5. *p.* 297. *t.* 103. *f.* 1.
Tagolina Luzonum, flore purpureo. *Petiv. gaz. t.* 80. *f.* 13.
Chamæmelum ſubrotundo folio. *D. Pryon.*
Muel ſchavi. *Rheed. mal.* 10. *p.* 135. *t.* 68.
Habitat in India.

Differt magnitudine, *caule* palmari & ſeſquipedali, *foliis* inferioribus ovatis, petiolis longis ſimplicibus, mediis lyratis ſuperioribus, amplexicaulibus dentatis, ut ex ſpeciminibus javanicis apparet.

CACALIA (*incana*) caule herbaceo, foliis lanceolatis dentatis. *Linn. ſp.* 1169. ubi deſcr.
Habitat in India.

ETHU-

ETHULIA (*Conyzoides*) floribus paniculatis. *Linn. Fil. dec.* 1. *p.* 1. *t.* 1. *ſpec.* 1171.
Habitat in India.

ETHULIA (*ſparganophora*) floribus ſeſſilibus lateralibus. *Linn. ſp.* 1171.
Sparganophoros Virgæ aureæ folio, floribus e foliorum alis, absque pediculis. *Vaill. act.* 368.
Struchium. *Brown. jam.* 312. *t.* 34. *f.* 2.?
Habitat in Indiis.

Tab. 58. *f.* 1. ETHULIA (*divaricata*) pedunculis oppoſitifoliis unifloris, foliis linearibus dentatis decurrentibus, caule divaricato.
Podou talei Incolis Coromandeli. *D. Outgaerden.*

Planta ſeſquipollicaris, ramulis ſimplicibus divaricatis.

EUPATORIUM (*ſcandens*) caule volubili, foliis cordatis dentatis acutis. *Linn. ſp.* 1171. *Roy. lugdb.* 156. *n.* 4.
Conyza ſcandens, ſolani folio anguloſo. *Plum. ic.* 99.
Clematitis novum genus Cucumeris folio virginianum. *Plukn. alm.* 108. *t.* 163. *f.* 3.
Habitat in Virginia & Java.

Tab. 58. *f.* 2. EUPATORIUM (*cordatum*) caule volubili, foliis petiolatis cordatis integerrimis, floribus paniculatis.
Volubilis. *D. Kleinhof.*
Habitat in Java & Vera Cruce.

Caul. volubiles glaberrimi, ramulis divaricatis oppoſitis. *Fol.* petiolata cordata inferiora ſolitaria, ſuperiora oppoſita. *Flor.* terminales paniculati ſingulo calyce quatuor, *pappo* ruberrimo.

EUPATORIUM (*zeylanicum*) foliis ovato-haſtatis petiolatis dentatis. *Linn. ſp.* 1172. *Fl. zeyl.* 306.
Eupatorium zeylanicum, foliis dentatis ad pediculos breves auriculatis. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 99.
Cacalia foliis auriculatis ſerratis ſupra nigricantibus infra lanugine alba obductis. *Burm. zeyl.* 52. *t.* 21.
Cacalia indica odorata. *Herm. zeyl.* 5.
Jacobæa ſenecionis flore zeylanica odorata. *Raj. ſuppl.* 3. *p.* 188.
Habitat in Zeylona.

EUPATORIUM (*chinenſe*) foliis ovatis petiolatis ſerratis. *Linn. ſp.* 1172.
Habitat in China.

EU-



1. ETHULIA *divaricata*.
2. EUPATORIUM *cordatum*.
3. ARTEMISIA *minima*.
4. CONYZA *ivæfolia*.

EUPATORIUM (*Dalea*) foliis lanceolatis venoſis obſolete ſerratis glabris, calycibus quadrifloris, caule fruticoſo. *Linn. ſp.* 1171.
Dalea fruticoſa, foliis oppoſitis oblongis anguſtis ſubſerratis utrinque productis, racemis terminalibus. *Brown. jam.* 314. *t.* 34. *f.* 1.
Salvia ſylveſtris Daun ſombong incolis dicta. *D. Pryon.*
Habitat in Java & Jamaica.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

ARTEMISIA (*vulgaris*) foliis pinnatifidis planis inciſis ſubtus tomentoſis, racemis ſimplicibus, floribus ovatis; radio quinquefloro. *Linn. ſp.* 1188.
Artemiſia vulgaris major. *Bauh. pin.* 137.
Artemiſia latifolia. *Rumph. amb.* 5. *p.* 261. *t.* 91. *f.* 2.
Artemiſia chinenſis, cujus mollugo Moxa dicitur. *Plukn. phyt.* 50. *t.* 15. *f.* 1.
Katu-tsjetti-pu. *Rheed. mal.* 10. *p.* 89. *t.* 45.
Habitat quoque in India.

ARTEMISIA (*chinenſis*) foliis ſimplicibus tomentoſis obtuſis lanceolatis, inferioribus cuneiformibus trilobis. *Linn. ſp.* 1190. ubi deſcr.
Artemiſia foliis radicalibus a caulinis diverſis. *Gmel. ſib.* 2. *p.* 127. *t.* 61. *f.* 1. 2.
Abſinthium maritimum ſinarum, Lavendulæ folio, pulchrioribus corymbis, inodorum, ſapore aromatico. *Plukn. amalth.* 3. *p.* 353. *f.* 5.
Salvia chinenſis *D. Kleinhof.*
Habitat in China & Java.

ARTEMISIA (*maderaſpatana*) foliis ſimplicibus lyrato-ſinuatis, caulibus procumbentibus, floribus pedunculatis ſolitariis globoſis oppoſitifoliis. *Linn. ſp.* 1190. ubi deſcr.
Abſinthium maderaſpatanum ſenecionis incani folio, corymbis ſolitariis in ramulorum faſtigio ſpecioſis. *Plukn. amalth.* 3. *t.* 353. *f.* 3.
Abſinthium minus odoratum gangeticum, floribus chamæmeli ſolitariis e foliorum alis. *Plukn. alm.* 2. *t.* 1. *f.* 2.
Nelampata. *Rheed. mal.* 10. *p.* 97. *t.* 49.
Habitat in India.

ARTEMISIA (*minima*) foliis cuneiformibus repandis, caule procumbente, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 1190. *Tab.* 58. *f.* 3.
Habitat in China.

GNAPHALIUM (*indicum*) herbaceum, foliis lanceolatis, caule herbaceo ramoſiſſimo diffuſo, corymbis inæqualibus. *Linn. ſp.* 1200. *Fl. zeyl.* 307.
Gnaphalium latiore folio minus ramoſum, capitulis palleſcentibus. *Plukn. alm.* 172. *t.* 187. *f.* 5.
Marcoelundoe ſaccabatti Coromandeli incolis.
Habitat in India & Cap. *B. Spei.*

CARPESIUM (*abrotanoides*) floribus lateralibus. *Oſb. it. t.* 10. *Linn. ſp.* 1204. ubi deſcr.
Habitat in China.

BACCHARIS (*indica*) foliis obovatis denticulatis petiolatis. *Linn. ſp.* 1205. ubi deſcr.
Eupatorio affinis planta zeylanica, folio ulmi. *Breyn. cent.* 142. *t.* 70.
Sonchus javanicus. *Rumph. amb. lib.* 8. *c.* 78.
Bolontas javanis. *D. Kleinhof.*
Habitat in Java.

BACCHARIS (*braſiliana*) foliis obovatis integris ſcabris ſeſſilibus ſubtus venoſis. *Linn. ſp.* 1205. ubi deſcr.
Tremate. *Marcgr. braſ.* 81.
Habitat in Braſilia.

CONYZA (*decurrens*) foliis decurrentibus lanceolatis ſerrulatis, caule ſubdichotomo, floribus axillaribus ſeſſilibus glomeratis. *Linn. ſp.* 1206. ubi deſcr.
Habitat in India.

CONYZA (*bifoliata*) foliis ovalibus dentatis, pedunculis diphyllis, bracteis oppoſitis. *Linn. ſp.* 1207.
Eupatoria conyzoides integro Jacobææ folio molli & incano Indiæ orientalis. *Plukn. alm.* 140. *t.* 177. *f.* 1.
Habitat in India.

CONYZA (*anthelmintica*) foliis lanceolato-ovatis ſerratis nudiuſculis, pedunculis ſubunifloris. *Linn. ſp.* 1207.
Baccharoides. *Linn. Fl. zeyl.* 418.
Conyza indica virgæ aureæ foliis, magno flore purpuraſcente. *Vaill. act.* 358.
Scabioſa conyzoides, foliis latis dentatis, ſemine amaro lumbricos enecante. *Burm. zeyl.* 210. *t.* 95.
Scabioſa zeylanica, capitulis folioſis, ſemine amaro lumbricos enecante. *Herm. zeyl.* 66.
Cattu-shiragam. *Rheed. mal.* 2. *p.* 39. *t.* 24.
Habitat in India.

CONYZA (*balſamifera*) foliis lanceolatis ſubtus tomentoſis, petiolis etiam ſerrato dentatis. *Linn. ſp.* 1208.
Conyza odorata. *Rumph.* 6. *t.* 24. *f.* 1.
Conyza banthamica Helenii folio. *Garcin. herb.*
Conyza odorata, ſeu Helenium alterum ſalviæ odorem ſpirans. *Cluſ. exot. l.* 4. *c.* 23. *p.* 92.

Co-

Conyza arbor zeylanica, ſubrotundo folio maxime tomentoſo. *Plukn. amalth.* 64 *Burm. zeyl.* 74.
Sombong malaice Javanis, ubi loco ſalviæ adhibetur & ſub hoc nomine occurrit, pluresque varietates in *Rumph. herb.* recenſentur 6. *l.* 10. *p.* 56.

CONYZA (*cinerea*) foliis oblongis, floribus paniculatis. *Linn. ſp.* 1208.
Senecioides. *Linn. Fl. zeyl* 419.
Conyza indica inodora minor, flore purpureo papposo. *Herm. zeyl.* 2. flore albo pappoſo. *Herm. herb.*
Senecio indica, foliis ternis crenatis. *Burm. zeyl.* 211. *t.* 96. *f.* 1.
Senecio indicus, Atriplicis folio. *Moris. hiſt. ſ.* 7. *t.* 1. *f.* 7.
Eupatorium anguſtiore folio bermudenſe, floribus flaveſcentibus. *Plukn. alm.* 141. *t.* 243. *f.* 3.
Olus ſcrofinum. *Rumph. amb.* 6. *t.* 14. *f.* 1.
Gnaphalium incanum, foliis oblongis undulatis ſerratis inferioribus lanceolatis ſuperioribus linearibus, flore rigido ex albo cinereo. Bunjun Bunjun Javanis. *D. Kleinhof*, quæ magnitudine inprimis foliorum valde diverſa.
Habitat in India.

CONYZA (*odorata*) foliis ovatis ſerratis ſubtomentoſis acutis, caule corymboſo, corollis ſubgloboſis. *Linn. ſp.* 1208.
Conyza odorata minor erecta purpuraſcens corymboſa, foliis ovatis villoſis. *Brown. jam.* 318.
Conyza arboreſcens purpurea, folio Verbaſci dentato. *Plum. ic. t.* 97.
Conyza major odorata ſive Baccharis, floribus purpureis nudis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 258 *t.* 152 *f.* 1.
β Eupatoria conyzoides maderaſpatana, foliis glabris, flore purpuraſcente. *Plukn. alm.* 141. *t.* 177. *f.* 2.
Salvia ſylveſtris ſeu ſombong uran. *D. Kleinhof.*
Nari-Patſia. *Rheed. mal.* 10. *p.* 23. *t.* 62.
Habitat in Indiis.

CONYZA (*chinenſis*) foliis lanceolato-ovatis reflexo ſerratis ſubtus tomentoſis, floribus terminalibus congeſtis. *Linn. ſp.* 1208.
Senecio amboinenſis. *Rumph. amb.* 6. *p.* 36. *t.* 14. *f.* 2.
β Conyza fruticoſa Ciſti odore, floribus pallide purpureis ſummitatibus ramulorum inſidentibus, capitulis & ſemine majoribus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 257. *t.* 151. *f.* 3. quæ cum quibusdam Javanicis ſpeciminibus optime convenit.
Herba flore nodoſo Boejon Knopoernip incolis dicta *D. Kleinhof.* cujus varietates ſunt foliis ovatis ſubintegerrimis, lanceolatis, oblongis, ſerratis, oppoſitis & alternis, floribus terminalibus & axillaribus.
Habitat in China & Java.

CONYZA (*hirſuta*) foliis ovalibus integerrimis ſcabris ſubtus hirſutis. *Linn. ſp.* 1209.
Aſter marilandicus Ptarmicæ capitulis, flore albo, Baccharidis monſpelienſium folio & effigie. *Plukn. mant.* 29. *t.* 340. *f.* 14.
Sambang Baſſaer Javanis.
Habitat in Java & China.

Differunt miſſa ſpecimina foliis lanceolatis integerrimis & denticulatis tomentoſis, pluresque varietates vid. apud *Rumph. amb.* 6. *l.* 10. *c.* 41. *p.* 55.

Tab. 59. *f.* 1. CONYSA (*lacera*) foliis ſublyratis laceris tomentoſis, floribus nutantibus.
Pitoe lintjar. Javanis.

Caul. ſimpliciſſimus tomentoſus, *foliis* alternis ſublyratis laceris, *pedunc.* breviſſimi axillares gemini & terminales paniculati ex albo piloſi nutantes.

Tab. 58. *f.* 4. CONYSA (*ivæfolia*) foliis alternis lanceolatis repando-dentatis.
Habitat in Java.

ERIGERON (*indicum*) foliis lanceolatis dentatis, calyce ſquarroſo.
Habitat in Java.
Caul. pedales. *Fol.* dentata ovato-lanceolata. *Flor.* terminales, *Cal.* hirtis.

Tab. 59. *f.* 2. ERIGERON (*Piſonis*) caule fruticoſo, foliis ovato oblongis inæqualiter repandis petiolatis.

Abſque nomine in Herb. Piſonis, quod in Braſilia collectum, occurrit. *Caul.* ſeſqui pedalis glaberrimus. *Fol.* alterna patentia petiolata oblongo cordata ſinuata repando-ſerrata. *Flor.* terminales ſingulo pedicello ſex ſeptemve, *calycibus* patentibus, *pappo* albicante.

ERIGERON (*denticulatum*) foliis obovatis, apicibus ſerratis, corymbo terminali.
Conyza javanica in ſunda collecta. *Garcin. herb.*
Rad. fibroſa. *Caul.* ſpithameus erectus teres glaber lineatus indiviſus. *Fol.* obovata ſerrata acuminata. *Fl.* corymboſi terminales numeroſi, *pappo* rubicundo.

SENECIO (*divaricatus*) corollis nudis, foliis lanceolatis dentatis ſcabris, ramulis floriferis divaricatis. *Linn. ſp.* 1215. ubi deſcr.
Tjonge Javanis, cujus ſuccus ex foliis expreſſus in Otalgia auribus inſtillatur.
Habitat in Java & China.

SENECIO (*Pſeudo China*) corollis nudis, ſcapo ſubnudo longiſſimo. *Linn. ſp.* 1217. *Roy. lugdb.* 164. *n.* 8.
Senecio maderaſpatanus Rapi folio, floribus maximis, cujus radix a nonnullis China dicitur. *Dill. elth.* 345. *t.* 258. *f.* 335.
Tigelkio Javanis.
Habitat in Java.

SE-



1. CONYZA *lacera*.
2. ERIGERON *pisonis*.



1. CONYZA *lacera*.
2. ERIGERON *pisonis*.

SENECIO (*biflorus*) corollis nudis, foliis ovatis denticulatis, ſcapo ſubnudo, pedunculis bifloris.
Blontas China. Javanis.
Habitat in Java.

Fol. radicalia ſublyrata ſuperiora ovata petiolata glabra, dentibus æqualibus remotis, *ſcapus* erectus bifolius pedalis ſulcatus ſuperne bifidus, diviſuris bifloris, *bracteæ* lineares, *flores* nudi, *calyc.* glaberrimi pappo albo, *cor.* lutea.

SENECIO (*auriculatus*) corollis nudis, foliis lanceolatis amplexicaulibus denticulatis, pedunculis trifloris.
Habitat in Java.

SENECIO (*tenuifolius*) corollis revolutis, foliis pinnatifidis, pinnis cornutis apice bifidis, caule herbaceo.
Jacobæa tenuifolia. *Garcin. herb.*
Habitat in Java.

Caul. herbacei ſubdichotomi erectiuſculi triangulares ſulcati glaberrimi. *Fol.* pinnatifida, *laciniis* inſtar Cornu Cervi ramoſis apice bifidis. *Pedunc.* terminales pollicares bifidi uniflori, *flor.* nudis. *Cal.* laciniæ lineares longæ, *Coroll.* aurantii coloris, *pappo* albiſſimo.

SENECIO (*coronopifolius*) corollis radiantibus revolutis, foliis linearibus pinnatifido dentatis, caule herbaceo.
Jacobæa javanica Coronopi folio. *Garcin. herb.*
Habitat in Java.

Rad. albicans perpendicularis *Caul.* plurimi ſemipedales, ramulis ex infimo caulis erectiuſculis glaberrimis. *Fol.* ſparſa linearia bipollicaria denticulis brevibus pinnatifida. *Pedunc.* terminales filiformes ſubuniflori foliis longiores, *floribus* nudis. *Cal.* glaberrimus, *laciniis* linearibus. *Cor.* revoluta lutea, *pappo* albiſſimo.

ASTER (*indicus*) foliis ovato oblongis ſerratis, floralibus ovali-lanceolatis integerrimis, ramulis unifloris. *Linn. ſp.* 1230.
Aſter conyzoides Indiæ orientalis ramoſior, caulibus ſparſis. *Plukn. alm.* 57. *t.* 149. *f.* 4.
Aſter javanicus. *Garcin. herb.*
Habitat in Java & China.

ASTER (*chinenſis*) foliis ovatis angulatis dentatis petiolatis, calycibus terminalibus patentibus folioſis. *Linn. ſp.* 1332. *Roy. lugdb.* 169. *n.* 22.
Aſter Chenopodii folio annuus, flore ingenti ſpecioſo. *Dill. elth.* 38. *t.* 34. *f.* 38.
Habitat in China.

In Hortis multiplici florum colore quam maxime luxuriat.

INULA (*indica*) foliis amplexicaulibus cordato-lanceolatis, pedunculis filiformibus, floribus ſubgloboſis. *Linn. ſp.* 1237. ubi deſcr.
Conyza minor Indiæ orientalis. *Plukn. mant.* 55. *t.* 378. *f.* 2. & 149. *f.* 3.
Jacobæa perfoliata, folio longo acuto auriculato. *Burm. zeyl.* 124. *t.* 55. *f.* 2.
Helenium ramoſum, caulibus ſparſis Calthæ arvenſis folio. *Vaill. act.* 575.
β Inula foliis ſeſſilibus oblongis acuminatis denticulatis, quibus a præcedenti differt.
Habitat in India.

ARNICA (*Tuſſilaginea*) foliis radicalibus reniformibus denticulatis ſubtomentoſis, caulinis lanceolatis integerrimis.
Doronicum Tuſſilaginis folio ex inſula cheuſan, flore magno ſingulari. *Plukn. amalth.* 71. *t.* 390. *f.* 6.
Herba Japan. *D. Kleinhof* qui ex Java miſit.
Folia in noſtro ſpecimine reniformia, ſcapus triflorus, quibus a *Plukn.* figura differt.

TAGETES (*patula*) caule ſubdiviſo patulo. *Linn. ſp.* 1249. *Roy. lugdb.* 180. *n.* 1.
Tanacetum africanum ſeu flos africanus. *Bauh. pin.* 132.
Flos africanus. *Dod. pempt.* 255.
β Tagetes indicus minor, multiplicato flore. *Tourn. inſt.* 488.
Tagetes minor, flore fulvo maculato. *Dill. elth.* 273. *t.* 279. *f.* 361.
Habitat in India atque in Mexico.

TAGETES (*erecta*) caule ſimplici erecto, pedunculis nudis unifloris. *Linn. ſp.* 1249. *Roy. lugdb.* 180. *n.* 2.
Tanacetum africanum majus, ſimplici flore. *Bauh. pin.* 133.
Caryophyllus indicus. *Camer. epit.* 406. &c.
Habitat in India & Mexico.

CHRYSANTHEMUM (*indicum*) foliis ſimplicibus ovatis ſinuatis angulatis ſerratis acutis. *Linn. ſp.* 1253.
Matricaria ſinenſis, minore flore, petalis & umbone ochroleucis. *Plukn. amalth.* 142. *t.* 430. *f.* 3.
Matricaria ſinenſis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 259. *t.* 91. *f.* 1.
Tsjetti-pu. *Rheed. mal.* 10. *t.* 44.
β Chryſanthemum maderaſpatanum, oxyacanthæ foliis cæſiis ad marginem ſpinoſis, calyce argenteo. *Plukn. alm.* 101. *t.* 160. *f.* 6.
Matricaria indica latiore folio, flore pleno. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 33.
Matricaria ſinenſis, flore monſtroſo. *Vaill. act.* 1720. *p.* 368. *Linn. Fl. zeyl.* 421.
Matricaria zeylanica hortenſis, flore pleno. *Raj. ſupp.* 224.
Habitat in India.
Laciniæ foliorum valde differunt.

AN-



1. BUPTHALMUM *garcini*.
2. SPHŒRANTHUS *africanus*.
3. LOBELIA *pumila*.
4. SENECIO *tenuifolius*.
5. ——— *coronopifolius*.



1. BUPTHALMUM garcini.
2. SPHŒRANTHUS africanus.
3. LOBELIA pumila.
4. SENECIO tenuifolius.
5. ——— coronopifolius.

ANTHEMIS (*Garcini*) caule fruticoſo, foliis ſubcuneiformibus truncatis eroſo dentatis tomentoſis, calyce folioſo. *Tab.* 60. *f.* 1.
Bupthalmum perſicum. *Garcin. herb*
Caul. fruticoſus glaber lineatus albicans, cicatriculis ſtipulaceis. *Fol.* petiolata cuneiformia apice truncata dentata cum eroſione tomentoſa; *Calycis* acuminata magis eroſa denticulis obtuſioribus. *Stipulæ* in caule ex petiolis foliorum deciduorum. *Cal.* laciniis oblongis.

SIGESBECKIA (*orientalis*) petalis ſeſſilibus, calycibus exterioribus linearibus majoribus patentibus. *Linn. ſp.* 1269. *H. Cliff.* 412. *t.* 23.
Bidenti ſimilis, foliis latiſſimis ſerratis. *Buxb. cent.* 3. *p.* 29. *t.* 52.
Cichorio affinis Lapſana ſinica menthaſtri foliis, calyce fimbriato hiſpido. *Plukn. amalth.* 58. *t.* 380. *f.* 2.
Moſſelina *D. Kleinhof.*
Habitat in China & Java.

VERBESINA (*chinenſis*) foliis alternis petiolatis ovato-lanceolatis ſerratis. *Linn. ſp.* 1270. ubi deſcr.
Habitat in China.

VERBESINA (*Pſeudo-Acmella*) foliis lanceolatis ſubſerratis, pedunculis flore longioribus. *Linn. ſp.* 1270. *Fl. zeyl.* 308.
Bidens zeylanica, flore luteo, meliſſæ folio, Acmella dicta. *Seb. theſ.* 1. *p.* 19. *t.* 10. 11.
Scabioſa indica, capitulis folioſis minor. *Burm. zeyl.* 210.
Chryſanthemum maderaſpatanum latifolium, ſcabioſæ capitulis parvis. *Plukn. alm.* 99. *t.* 159. *f.* 4.
Acmella maderaſpatenſis, folio breviore. *Petiv. ſicc.* 291. *no.* 13.
Habitat in Zeylona.

VERBESINA (*Acmella*) foliis oblongo-ovatis trinerviis ſubdentatis petiolatis, pedunculis elongatis axillaribus, floribus conicis. *Linn. ſp.* 1271. *Fl. zeyl.* 309.
Ceratocephalus ballotes folio. *Vaill. act.* 600. *Burm. zeyl.* 58.
Bidens zeylanica, flore luteo, meliſſæ folio, Acmella dicta. *Seb. muſ.* 1. *p.* 19. *t.* 9. 10.
Chryſanthemum bidens ſeu Bidens zeylanica, flore luteo, Lamii folio, Acmella dicta. *Raj. ſuppl.* 228. *Breyn. prodr.* 3. *t.* 48.
Senecio Indiæ orientalis, Ocymi majoris folio profunde crenato. *Plukn. alm.* 343. *t.* 315. *f.* 2.
ABCdaria. *Rumph. amb.* 6. *p.* 145. *t.* 65.
Habitat in India.

VERBESINA (*Lavenia*) foliis ovatis trinerviis glabris petiolatis, feminibus tricornibus. *Linn. ſp.* 1271. *Fl. zeyl.* 310.
Eupatoriophalacron ſcrophulariæ aquaticæ foliis oppoſitis. *Burm. zeyl.* 95. *t.* 42.

Eu-

Eupatoriophalacron ſcrophulariæ folio trinervi. *Vaill. act. paris* 1720. *p.* 421.
Conyza zeylanica latifolia dentata, flore albo. *Hartogh. herb.*
Chryſanthemum aquaticum ſcrophulariæ folio Lavenia dictum. *Raj. ſuppl.* 217.
Pu-tumba. *Rheed. mal.* 10. *p.* 125. *t.* 63.
Matra-marelo portal; Sakſok Javanis.
Habitat in Zeylona.

VERBESINA (*biflora*) foliis oblongo-ovatis triplinerviis acuminatis ſerratis, pedunculis geminis bifloris. *Linn. ſp.* 1272.
Ecliptica. *Rumph. amb.* 6. *p.* 43. *t.* 18. *f.* 1.
Vallia-manga-nari. *Rheed. mal.* 10. *p.* 79. *t.* 40.
Orang-aring ſeu Daun ſopati Javanis.
Habitat in India.

VERBESINA (*alba*) foliis lanceolatis ſerratis ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 1272.
Eupatoriophalacron balſaminæ fæminæ folio, flore albo diſcoide. *Dill. elth.* 138. *t.* 113. *f.* 137. *Vaill. act.* 597.
Scabioſa conyzoides americana latifolia, capitulis & floribus albis parvis. *Plukn. alm.* 335. *t.* 109. *f.* 1. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 47. *ſ.* 6. *t.* 13. *f.* 16.
Bidens latifolia indica. *Garcin. herb.*
Habitat in India.

VERBESINA (*proſtrata*) foliis lanceolatis ſerratis, floribus alternis geminis ſubſeſſilibus. *Linn. ſp.* 1272.
Eupatoriophalacron menthæ arvenſis folio. *Dill. elth.* 139. *t.* 113. *f.* 138. *Vaill. act.* 598.
Chryſanthemum maderaſpatanum menthæ arvenſis folio & facie, floribus bigemellis ad alas, pediculis curtis. *Plukn. alm.* 100. *t.* 118. *f.* 5.
β Cajenneam. *Rheed. mal.* 10. *p.* 81. *t.* 41.
Habitat in India.

VERBESINA (*calendulacea*) foliis lanceolatis obtuſiuſculis, pedunculis longis unifloris, calycibus ſimplicibus. *Linn. ſp.* 1272. *Fl. zeyl.* 311.
Caltha flore ſolitario ex alis foliorum longiſſimo pedunculo prodeunte. *Burm. zeyl.* 52. *t.* 22. *f.* 1.
Eupatoriophalacron foliis anguſtis rarius dentatis, flore radiato. *Vaill. act.* 1720. *p.* 920.
Chryſanthemum zeylanicum, foliis anguſtis rarius dentatis aſperis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 212.
Pee-cajoni. *Rheed. mal.* 10. *p.* 83. *p.* 42.
Habitat in India.

HE-

HELIANTHUS (*annuus*) foliis omnibus cordatis trinervatis, floribus cernuis. *Linn. ſp.* 1276. *Roy. lugdb.* 180. *n.* 1.
Helenium indicum maximum. *Baub. pin.* 276.
Herba maxima. *Dod. pempt.* 264.
Chryſis. *Renealm. ſpec.* 84. *t.* 83.
Habitat in Peru & Java, unde ſæpius miſſa ſemina.

POLYGAMIA SEGREGATA.

ELEPHANTOPUS (*ſcaber*) foliis oblongis ſcabris. *Linn. ſp.* 1313. *Roy. lugdb.* 131.
Elephantopus erectus, foliis oblongo-ovatis rugoſis ſerratis, floralibus cordiformibus ternatis, capitulis remotis terminalibus. *Brown. jam.* 312.
Elephantopus Conyzæ folio. *Dill. elth.* 126. *t.* 106. *f.* 126.
Bidens frutefcens, foliis oblongis utrimque acuminatis venoſis & lanuginoſis. *Breyn. ic.* 32. *t.* 24.
Echinophoræ indicæ affinis, ſemine & floribus in capitulis lævibus, in caulium cymis. *Plukn. alm.* 132. *t.* 388. *f.* 6.
Scabioſa cærulea javanica Bontii, incolis Tampack delima. *Barrl. ic.* 826.
Ana-ſchovadi. *Rheed. mal.* 10. *p.* 13. *t.* 7.
Habitat in Indiis.

SPHÆRANTHUS (*indicus*) pedunculis criſpatis. *Linn. ſp.* 1314. *Fl. zeyl.* 312. *Roy. lugdb.* 145.
Sphæranthus purpurea alata ſerrata. *Burm. zeyl.* 220. *t.* 94. *f.* 3.
Sphæranthus folio oblongo major. *Vaill. act. paris* 1719. *p.* 382.
Scabioſa indica major, caule & pediculis folioſis. *Plukn phyt.* 335. *t.* 312. *f.* 6.
Adaca-manjen. *Rheed. mal.* 10. *p.* 85. *t.* 43. *Raj. ſuppl.* 241.
Patala moedi Javanis.
Habitat in Africa, Aſia.

SPHÆRANTHUS (*africanus*) pedunculis lævibus. *Linn. ſp.* 1314. *Tab. 60. f. 2.*
Sphæranthus folio oblongo minor. *Vaill. act.* 347.
Scabioſa minor, alato caule, maderaſpatana. *Plukn. alm.* 335. *t.* 108. *f.* 7. *Raj. ſuppl.* 235.
Sphæranthus minor *D. Pryon*, cujus folia obovata crenata petiolata, caulis & pedunculi nudi nec alati, capitula ſphærica minora quam in africano.
β Varietas caule alato, pedunculis lateralibus lævibus, capitulis ſphæricis.
Habitat in Africa & India Orientali.

SPHÆRANTHUS (*amaranthoides*) pedunculis breviſſimis glabris, capitulis conicis.
Amaranthoides fruticoſum, Eryngii capitulis purpureis ex ejusdem coloris alati caulis geniculis prodeuntibus. *Plukn. amalth.* 13. *t.* 357. *f.* 6.
Codice karandei Incolis Coromandeli.
Habitat in locis aquoſis Indiæ inter Oryzam.

Caul. ſpithameus alatus rubro-fuſcus triangulatus. *Fol.* alterna erecta decurrentia oblonga. *Floreſcentia capitulum* ovato-conicum obtuſum paleaceum.

SYNGENESIA MONOGAMIA.

LOBELIA (*Plumierii*) fruteſcens, foliis ovali-oblongis integerrimis. *Linn. ſp.* 1317. ubi deſcr. *Fl. zeyl.* 313. *Osb. it.* 275.
Lobelia fruteſcens, Portulacæ folio. *Plum. gen.* 21. *ic.* 165. *f.* 1. *Catesb. carol.* 1. *p.* 79. *t.* 79.
Habitat in utrisque Indiis.

LOBELIA (*zeylanica*) caulibus procumbentibus, foliis ovatis ſerratis, inferioribus obtuſis, ſuperioribus acutis, pedunculis unifloris, capſulisque ſubvilloſis. *Linn. ſp.* 1322. ubi deſcr.
Campanula zeylanica, ſenecionis folio, flore purpureo. *Seb. theſ.* 1. *p.* 37. *t.* 22. *f.* 12. *Burm. zeyl.* 53.
Habitat in India.

Tab. 60. *f.* 3. LOBELIA (*pumila*) caule procumbente, foliis oppoſitis ovatis integerrimis, panicula terminali.
Mannalie ranken incolis Coromandeli.

Planta palmaris. *Caul.* teres glaberrimus. *Fol.* oppoſita petiolata ſubovata integerrima. *Flor.* terminales paniculati minimi.

VIOLA (*enneaſperma*) caule baſi ramoſiſſimo, foliis lanceolato-linearibus integerrimis diſtantibus, calycibus poſtice æqualibus. *Linn. ſp.* 1327. *Fl. zeyl.* 317.
Herba indica, flore monopetalo labiato, capſula e rotundo trilaterali octoſperma. *Raj. ſuppl.* 402.
Nelam-paranda. *Rheed. mal.* 9. *p.* 117. *t.* 60.

VIOLA (*ſuffruticoſa*) caule procumbente, foliis lanceolatis ſubſerratis confertis, calycibus poſtice æqualibus. *Linn. ſp.* 1327. *Fl. zeyl.* 318.
Rubeola zeylanica, foliis latioribus, Ratmul dicta. *Burm. zeyl.* 208.
Habitat in Zeylona.

IMPATIENS (*chinenſis*) pedunculis unifloris ſolitariis, foliis oppoſitis ovatis, nectariis arcuatis. *Linn. ſp.* 1328. ubi deſcr.
Habitat in China.

IMPATIENS (*latifolia*) pedunculis unifloris ſolitariis, foliis ovatis, ſerraturis lanceolatis, nectariis flore longioribus. *Linn. ſp.* 1328. ubi deſcr.
Balſamina fæmina impatiens latifolia, flore hexapetalo, ſeminibus piloſis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 637.
Vaſti-onapu. *Rheed. mal.* 9. *p.* 91. *t.* 48.
Habitat in India.

IMPATIENS (*oppoſitifolia*) pedunculis unifloris aggregatis, foliis oppoſitis linearibus. *Linn. ſp.* 1328. *Fl. zeyl.* 314.
Dipetalos indica purpuro-cærulea ſiliquoſa, foliis longis anguſtis ex adverſo binis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 404.
Kondam-pallu. *Rheed. mal.* 9. *p.* 57. *t.* 31.
Habitat in Zeylona & Malabara.

IMPATIENS (*cornuta*) pedunculis unifloris aggregatis, foliis lanceolatis, nectariis flore longioribus. *Linn. ſp.* 1328. *Fl. zeyl.* 316.
Balſamina latifolia, floris calcari longiſſimo. *Burm. zeyl.* 41. *t.* 16. *f.* 1.
Balſamina zeylanica latifolia, floſculis incarnatis, fructu Hirundinis facie. *Herm. zeyl.* 30.
Habitat in Zeylona.

IMPATIENS (*Balſamina*) pedunculis unifloris ſubaggregatis, foliis lanceolatis ſuperioribus alternis, nectariis flore brevioribus. *Linn. ſp.* 1328.
Lacca herba. *Rumph. amb.* 5. *p.* 274. *t.* 90.
Tilo-onapu ſ. Nolengu. *Rheed. mal.* 9. *p.* 101. *t.* 52.
Habitat in India.

IMPATIENS (*triflora*) pedunculis trifloris ſolitariis, foliis anguſto-lanceolatis. *Linn. ſp.* 1329. *Fl. zeyl.* 315.
Balſamina anguſtifolia floribus ternis communi pediculo ortis. *Burm. zeyl.* 41. *t.* 16. *f.* 2.
Balſamina erecta ſ. femina, perſicæ anguſto folio, zeylanica. *Herm. par. bat.* 105. *t.* 105.
Noli me tangere anguſtiſſimo folio. *Herm. zeyl.* 19.
Habitat in Zeylonæ paludoſis.

ORCHIS (*ſuſannæ*) bulbis indiviſis, nectarii alis amplioribus ciliatis. *Linn. ſp.* 1330.
Orchis amboinenſis, floribus albis fimbriatis. *Herm. parad.* 209. *t.* 209. *Raj. ſuppl.* 588.
Flos ſuſannæ. *Rumph. amb.* 5. *p.* 286. *t.* 99. *f.* 2.
Habitat in Amboina.

ORCHIS (*cubitalis*) bulbis indiviſis, nectarii labio trifido filiformi, intermedio ovato: cornu germinibus breviore. *Linn. ſp.* 1333. *Fl. zeyl.* 320.
Orchis caule cubitali, ſpica parva longa rara. *Burm. zeyl.* 176. *Herm. zeyl.* 23.
Habitat in Zeylona.

ORCHIS (*ſtrateumatica*) bulbis faſciculatis, nectarii labio bilobo integerrimo, cornu longitudine germinis. *Linn. ſp.* 1336. *Fl. zeyl.* 319.
Orchis caule ad ſummum folioſo. *Herm. zeyl.* 22. *Burm. zeyl.* 176.
Habitat in Zeylona.

EPIDENDRUM (*Vanillâ*) ſcandens, foliis ovato oblongis nervoſis ſeſſilibus caulinis, cirrhis ſpiralibus. *Linn. ſp.* 1347. *Roy. lugdb.* 13. *n.* 3.
Vanilla flore viridi & albo, fructu nigricante. *Plum. gen.* 25. *ic.* 188.
Vanillas piperis arbori jamaicenſis innaſcens. *Plukn. alm.* 381. *t.* 320. *f.* 4.
Vanille. *Merian. ſurin.* 25. *t.* 25.
Volubilis ſiliquoſa Plantaginis folio. *Catesb. car.* 3. *p.* 7. *t.* 7.
Lobus aromaticus ſubfuſcus, therebinthi corniculis ſimilis. *Bauh. pin.* 404.
Lobus oblongus aromaticus. *Cluſ. exot.* 72. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 180.
Angurek-warna. *Kæmpf. amoen.* 867. *t.* 869. *f.* 2.
Paraſiticum in utriusque Indiæ arboribus habitat.

EPIDENDRUM (*Flos aëris*) caule ſcandente tereti ſubramoſo, foliis lanceolatis aveniis, petalis linearibus obtuſis. *Linn. ſp.* 1348.
Kotong-ging. *Kæmpf. amoen.* 868. *t.* 869. *f.* 1.
Angrec-cambang, ſeu flos Araneæ. *D. Kleinhof.*
Paraſiticum habitat in Java & Japonia.

EPIDENDRUM (*tenuifolium*) foliis caulinis ſubulatis canaliculatis. *Linn. ſp.* 1348.
Anomala indica, Orchidis vel Elleborines flore pulcherrimo verſicolore, foliis anguſtis carinatis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 590.
Tſierou mau-maravara. *Rheed. mal.* 12. *p.* 11. *t.* 5.
Habitat in India.

EPIDENDRUM (*ſpatulatum*) foliis caulinis oblongis alternis obtuſis aveniis, nectarii labio bifido divaricato. *Linn. ſp.* 1348.
Helleborine ampliſſimo vario folio. *Plum. ſp.* 9. *ic.* 180. *f.* 2.

Or-

Angræcum album minus. *Rumph. amb. 6. p. 94. t. 44. f.* 1.
Ponnampou maravara. *Rheed. mal.* 12. *p.* 7. *t.* 3.
Orchis Epidendros ſalamaccenſis viſci folio Petiv. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 589.
Orchis palmata anguſtifolia minor odoratiſſima. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 223. *f.* 7.
Angrec Poeti. *Javanis.*
Habitat in India.

EPIDENDRUM (*furvum*) caulescens, foliis imbricatis lanceolatis, racemis axillaribus. *Linn. ſp.* 1348.
Angræcum octavum ſ. furvum. *Rumph. amb. 6. p.* 104. *t.* 46. *f.* 1.
Orchis abortiva aizoides, ſpica florum brevi, floribus minoribus lineis rubris undantibus radiatis. *Raj. hiſt* 3. *p.* 590. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 222. *f.* 8.
Thalia-maravara. *Rheed. mal.* 12. *p.* 9. *t.* 4.
Habitat in India.

EPIDENDRUM (*ovatum*) foliis caulinis ovatis acutis nervoſis amplexicaulibus, ſcapis paniculatis. *Linn. ſp.* 1349.
Herba ſupplex major ſecunda ſ. fæmina. *Rumph. amb. 6. p.* 111. *t.* 51. *f.* 1.
Orchis abortiva latifolia malabarica, clitoride flore luteo piloſo. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 223. *f.* 9. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 590.
Anantali maravara. *Rheed. mal.* 12. *p.* 15. *t.* 7.
Habitat in India.

EPIDENDRUM (*articulatum*) caule articulato dependente radicante, foliis lanceolatis, nectario cymbæformi.
Planta ſtapeliæ ſimilis, trunco Manghæ adhærens & excreſcens, flore albo, *D. Pryon.*
Herba ſupplex quinta. *Rumph. amb. 6. p.* 111. *t.* 51. *f.* 2.
In India ex arboribus dependet.

EPIDENDRUM (*caninum*) caulescens, foliis ovatis aveniis integerrimis, nectario conico.
Angræcum caninum. *Rumph. amb. 6. p.* 105. *t.* 47. *f.* 1.
Angrec utan. *Javanis.*
Habitat in India.

EPIDENDRUM (*aloifolium*) foliis radicalibus oblongis obtuſis ſuperne latioribus. *Linn. ſp.* 1350.
Orchis abortiva, flore majore rubro, folio Aloes. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 224. *f.* 10.
Kanſpram-maravara. *Reed. mal.* 12. *p.* 16. *t.* 8.
Paraſiticum in Malabariæ arboribus habitat.

EPIDENDRUM (*ſcriptum*) foliis ovato-oblongis trinerviis, floribus racemoſis maculatis. *Linn. ſp.* 1351.
Angræcum ſcriptum. *Rumph. amb. 6. p.* 95. *t.* 42.
Habitat in Amboina.

EPIDENDRUM (*retuſum*) foliis radicalibus, apice bifariam retuſis, floribus racemoſis maculatis. *Linn. ſp.* 1351.
Orchis abortiva aizodes malabarienſis, flore odoratiſſimo variegato, intus aviculam repræſentante Commel. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 220. *f.* 5.
Anſieli-Maravara. *Rheed. mal.* 12. *p.* 1. *t.* 1.
Habitat in India.

EPIDENDRUM (*amabile*) foliis radicalibus lato-lanceolatis aveniis, petalis lateralibus orbiculatis. *Linn. ſp.* 1351.
Angræcum album majus. *Rumph. amb.* 6. *p.* 99. *t.* 43.
Habitat in India.

EPIDENDRUM (*tuberoſum*) foliis lato-lanceolatis nervoſis membranaceis bulbo innatis, ſcapo vaginato, nectario cymbæformi bifido. *Linn. ſp.* 1352.
Angræcum terreſtre primum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 112. *t.* 52. *f.* 1.
Helleborine purpurea, tuberoſa radice. *Plum ſpec.* 9. *ic.* 186. *f.* 2.
Habitat in Indiis.

EPIDENDRUM (*enſifolium*) caule tereti lævi, foliis enſiformibus. petalis lanceolatis glabris, labio recurvato latiore. *Linn. ſp.* 1352.
Habitat in China.

EPIDENDRUM (*moniliforme*) caule tereti articulato ſtriato moniliformi nudo ſimpliciſſimo, foliis linearibus acutis. *Linn. ſp.* 1352.
Fu-Ran. *Kæmpf. amoen.* 864. *t.* 864.
Paraſiticum habitat in rupibus & arboribus Japoniæ.

TETRANDRIA.

NEPENTHES (*deſtillatoria*). *Linn. ſp.* 1354. *Fl. zeyl.* 321.
Utricaria vegetabilis zeylanenſium. *Plukn. alm.* 391. *t.* 237. *f.* 3.
β Bandura zeylanica in extremo foliorum folliculum peniformem expanſum habens. *Burm. zeyl.* 42. *t.* 17.
Planta zeylanica, cujus foliorum extremus folliculus peniformis ſe expandit. *Herm. zeyl.* 37.
Priapus vegetabilis monorchis, Bandura Cingalenſium. *Amm. char. pl.* 529.
Planta mirabilis deſtillatoria. *Grim. E. N. C. an.* 1. *dec.* 2. *p.* 363. *f.* 363.
Cantharifera. *Rumph. amb.* 5. *p.* 121. *t.* 59. *f.* 2.
Habitat in Zeylona.

ARIS-

ARISTOLOCHIA (*indica*) foliis cordato-oblongis, caule volubili, pedunculis multifloris. *Linn. ſp.* 1362. *Fl. zeyl.* 333.
Ariſtolochia longa indica aromatica. *Burm. zeyl.* 32.
Ariſtolochia Clematitis indica odorata. *Herm. prodr. app.*
Carelu-vagon. *Rheed. mal.* 8. *p.* 48. *t.* 25.
Habitat in India.

ARISTOLOCHIA (*anguicida*) foliis cordatis acuminatis, caule volubili fruticoſo, pedunculis ſolitariis, ſtipulis cordatis. *Linn. ſp.* 1362. *Jacq. americ.* 30. *t.* 144.
Ariſtolochia zeylanica, biſtortæ folio breviore. *Burm. zeyl.* 33.
Ariſtolochia mexicana, folio acutiore. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 509. *ſ.* 12. *t.* 17. *f.* 7.
Habitat in Indiis.

PISTIA (*ſtratiotes*) foliis obcordatis. *Linn. ſp.* 1365. *Fl. zeyl.* 322. *Jacq. hiſt. t.* 148.
Piſtia aquatica villoſa, foliis obovatis ab imo venoſis, floribus ſparſis, foliis inſidentibus. *Brown. jam.* 329.
Nymphæa minima maderaſpatenſis, foliis alas papilionum referentibus. *Plukn. alm.* 267. *t.* 207. *f.* 6.
Stratiotes ægyptia Dioſcoridis. *Veſl. ægypt.* 44. *t.* 45. *Alp. ægypt.* 106. *t.* 108. *Petiv. gazoph. t.* 5. *f.* 12.
Lenticula paluſtris, ſive ſtratiotes aquatica, foliis ſedo majore latioribus. *Bauh. pin.* 362. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 15. *t.* 2. *f.* 2.
Kadda-palli. *Rheed. mal.* 11. *p.* 63. *t.* 32.
Anaſa-Tamarei incolis Coromandeli, planta aquatica. *D. Outgaerde.*
Habitat in India utraque & Ægypto.

DECANDRIA.

KLEINHOVIA (*Hoſpita*). *Linn. ſp.* 1365. ubi deſcr.
Catti-marus. *Rumph. amb.* 3. *p.* 177. *t.* 113.
Catti-mahar *Javanis*, ſub quo nomine ſæpius ex India miſſa fuit cura expertiſſimi & amiciſſimi *Kleinhovii*, (in cujus honorem & memoriam hæc arbor a *Cl. Linnæo* dicta) qui indefeſſo labore Botanices ſtudium, illo quo in Java degit tempore, coluit, hortum prope Bataviam extruxit, ſtirpes plurimas, ex China aliiſque Indiæ plagis allatas, ibi coluit quas una cum ſeminibus amicis diſtribuit, & ſic laudabili inſtituto hortos raris nec antea viſis nec cognitis plantis ditavit, hinc ſummo jure Ejus nomini ſacratur hæc ſtirps, ſperandumque, quod vita ipſi protrahatur in ſeram ſenectutem, ut illa, quæ antea ſub zona torrida magno labore collegit, elaborare & publici juris facere queat, atque operibus ſuis poſteritati & illis, qui has terras petunt, inſervire & conducere poſſit.

HE-

HELICTERES (*Iſora*) foliis cordatis ſerratis, fructu compoſito contorto. *Linn. ſp.* 1366.
Helicteres arbor Indiæ orientalis, ſiliqua varicoſa & funiculi in modum contortuplicata. *Plukn. alm.* 181. *t.* 245. *f.* 2.
Frutex indicus, fructu e ſtili apice egreſſo ſextuplici, funiculo in ſpiram convoluto conſtante. *Raj. hiſt.* 1765.
Fructus regis. *Rumph. auct. amb.* 32. *t.* 17. *f.* 1.
Iſora murri. *Rheed. mal.* 6. *p.* 55. *t.* 30.
Habitat in Indiis

HELICTERES (*anguſtifolia*) foliis lanceolatis integerrimis, fructu ovato recto. *Linn. ſp.* 1366. ubi deſcr.
Habitat in China.

POLYANDRIA.

GREWIA (*orientalis*) foliis ſublanceolatis. *Linn. ſp.* 1367. *Fl. zeyl.* 324. *Roy. lugdb.* 477. *n.* 2.
Frutex baccifer malabaricus, fructu plano rotundo piloſo tetrapyreno. *Raj. hiſt.* 1624. *Plukn. phyt.* 275. *t.* 50. *f.* 4.
Pai-paroea ſ. Couradi. *Rheed. mal.* 5. *p.* 91. *t.* 46.
β Frutex ceramicus. *Rumph.* 4. *p.* 124. *t.* 60. Angrung Javanis.
Habitat in India.

ARUM (*pentaphyllum*) acaule, foliis quinatis. *Linn. ſp.* 1368.
Arum pentapyllum indicum. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 540. *ſ.* 13. *t.* 5. *f.* 27.
Rhomphal planta Indiæ orientalis. *Zanon. hiſt.* 205.
Habitat in India.

ARUM (*macrorhizon*) acaule, foliis peltatis cordatis repandis, baſi bipartitis. *Linn. ſp.* 1369. *Fl. zeyl.* 327. *Roy. lugdb.* 7. *n.* 6.
Arum maximum macrorhizon zeylanicum. *Herm. par.* 73. *t.* 73. *Burm. zeyl.* 34.
Arum zeylanicum maximum, flore odorato. *Herm. zeyl.* 63.
Habitat in zeylona.

ARUM (*Colocaſia*) acaule, foliis peltatis ovatis repandis, baſi ſemibidis. *Linn. ſp.* 1368. *Roy. lugdb.* 7. *n.* 3.
Arum maximum Ægyptium, quod vulgo Colocaſia. *Bauh. pin.* 195.
Arum ægyptiacum. *Col. ecphr.* 2. *p. t.* 1. *Rumph. amb.* 5. *p.* 313. *t.* 109.
Colocaſiæ. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 75. *Burm. zeyl.* 69.
Habitat in Indiæ & Ægypti locis paludoſis.

ARUM (*eſculentum*) acaule, foliis peltatis ovatis integerrimis, baſi ſemibifidis. *Linn. ſp.* 1369. *Roy. lugdb.* 7. *n.* 4.
Arum minus Nymphææ folio eſculentum. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 167. *t.* 106. *f.* 1.
Braſſica braſiliana, foliis Nymphææ. *Bauh. pin.* 111.
Caladium aquatile. *Rumph. amb.* 5. *p.* 318. *t.* 110. *f.* 1.
Habitat in Indiis.

ARUM

ARUM (*divaricatum*) acaule, foliis cordato-haſtatis divaricatis. *Linn. ſp.* 1369. *Fl. zeyl.* 325.
Arum zeylanicum minus ſagittariæ folio. *Burm. zeyl.* 34. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 583.
Arum minus ſagittariæ folio ex inſulis Barbados. *Plukn. phyt.* 51. *t.* 149. *f.* 2.
Nelenſchena major. *Rheed. mal.* 11. *p.* 39. *t.* 20.
Habitat in India.

ARUM (*trilobatum*) acaule, foliis ſagittato-trilobis, flore ſeſſili. *Linn. ſp.* 1369. *Fl. zeyl.* 326.
Arum trilobato folio humilius & minus zeylanicum. *Herm. par.* 79. *t.* 78.
Arum humile zeylanicum latifolium, piſtillo coccineo. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 97. *t.* 51. *Mill. dict. t.* 52. *f.* 2.
Ariſarum amboinicum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 320. *t.* 110. *f.* 2.
Dracunculus indicus, folio trifido. *Tourn. inſt.* 161. *Burm. zeyl.* 89.
Habitat in Zeylona.

ARUM (*ovatum*) acaule, foliis ovato-oblongis, ſpatha ſcabra. *Linn. ſp.* 1371.
Arum aquaticum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 312. *t.* 108.
Arum indicum Lapathi foliis criſpatis. *Hiſt. oxon.*
Aro congener paluſtris malabarica, folio Nymphææ. *Raj. ſuppl.* 586.
Karin pola. *Rheed. mal.* 11. *p.* 45. *t.* 23.
Habitat in India.

DRACONTIUM (*ſpinoſum*) foliis ſagittatis, pedunculis petioliſque aculeatis. *Linn. ſp.* 1372. *Fl. zeyl.* 328.
Arum zeylanicum ſpinoſum, ſagittæ foliis. *Herm. par.* 75.
Arum zeylanicum maximum ſpinoſum, radice longa repente. *Burm. zeyl.* 34.
Arum minus zeylanicum, ſagittariæ foliis. *Raj. ſuppl.* 575.
Habitat in Zeylona.

POTHOS (*pinnata*) foliis pinatifidis. *Linn. ſp.* 1374.
Appendix laciniata. *Rumph amb.* 5. *p.* 489. *t.* 183. *f.* 2.
Habitat in Amboina.

POTHOS (*ſcandens*) foliis petiolo foliaceo minoribus, caule radicante. *Linn. ſp.* 1347. *Fl. zeyl.* 329.
Potha. *Burm. zeyl.* 197.
Appendix duplo folio. *Rumph. amb.* 5. *p.* 490. *t.* 184. *f.* 1. 2. 3.
Frutex paraſiticus, Aurantii fere foliis, flore carens. *Raj. app.* 654.
Ana-parua. *Rheed. mal.* 7. *p.* 75. *t.* 40.
Habitat in India.

COIX (*Lacryma Jobi*) feminibus ovatis. *Linn. ſp.* 1378. *Fl. zeyl.* 330.
Lacryma Jobi. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 216. *Burm. zeyl.* 137.
Milium ſolis. *Bont. jav.* 152.
Lithoſpermum arundinaceum. *Bauh. pin.* 258.
Ova piſcium. *Rumph. amb.* 5. *p.* 191. *t.* 75.
β Lachryma Jobi zeylanica omnium maxima. *Burm. zeyl.* 138.
Milium arundinaceum, ſemine, Lithoſpermi facie, maximo duriſſimo. *Herm. lugdb.* 426.
Lithoſpermum maximum arundinaceum zeylanicum. *Herm. zeyl.* 40.
Catri-conda. *Rheed. mal.* 12. *p.* 133. *t.* 70.
Habitat in Indiis.

TRIPSACUM (*dactyloides*) ſpicis androgynis. *Linn. ſp.* 1378.
Coix ſeminibus angulatis. *Roy. lugdb.* 72. *n.* 2.
Gramen Dactylon indicum eſculentum, ſpica articulata. *Ambr. phyt.* 1. *p.* 545. *t.* 546. 547. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 135. *ſ.* 8. *t.* 3. *f.* 11.
Gramen Dactylon maximum americanum. *Plukn. alm.* 178. *t.* 190. *f.* 2.
Seſamum perenne indicum, ſpica frumentacea *Zanon. hiſt.* 181. *t.* 68.
Habitat in Indiis.

CAREX (*ovata*) ſpica terminali ovata feminea.
Gaamen cyperoides Junci capitulis, ſeu gramen junceum erectum vel Holoſteum ſtrictiſſimis foliis glabris maderaſpatanum. *Plukn. amalth.* 113. *t.* 416. *f.* 1.
Gramen cyperoides minimum, ſpica ſimplici compacta, radice tuberoſa odorata. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 120. *t.* 79. *f.* 2.
Miſſa ex Java.

TRAGIA (*volubilis*) foliis cordato-oblongis, caule volubili. *Linn. ſp.* 1390. ubi deſcr.
Tragia ſcandens, foliis haſtatis ſerratis hiſpidis. *Brown. jam.* 336.
Tragia alia ſcandens, urticæ folio. *Plum gen.* 14. *ic.* 252. *f.* 2.
Urtica racemoſa ſcandens anguſtifolia, fructu tricocco. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 123. *t.* 82. *f.* 1.
Funis urens. *Rumph. amb.* 5. *p.* 13. *t.* 9.
Habitat in Indiis.

TRAGIA (*involucrata*) involucris femineis pentaphyllis pinnatifidis. *Linn. ſp.* 1391.
Acalypha. *Linn. Fl. zeyl.* 340. Croton. *Roy. lugdb.* 201. *n.* 5.
Ricinocarpos zeylanica hirſuta, foliis lanceolatis ſerratis. *Burm. zeyl.* 202. *t.* 92.
Urtica indica major tricoccos vehementer urens. *Herm. zeyl.* 18.
Urtica fruteſcens malabarica ſchorigeram dicta. *Raj. hiſt.* 160.
Schori-geram. *Rheed. mal.* 2. *p.* 73. *t.* 39.
Habitat in India.

TRA-

TRAGIA (*Mercurialis*) foliis ovatis *Linn. ſp.* 1391. *Fl. zeyl.* 334.
Mercurialis maderaſpatenſis tricoccos, acetabulis deſtituta. *Plukn. alm.* 248. *t.* 205. *f.* 4.
Ricinocarpos indica glabra, Mercurialis folio. *Burm. zeyl.* 205.
Ricinocarpos zeylanica urens, Mercurialis folio, floribus ex alis ſpicatis. *D. Pryon.*
Pee-cupameni. *Rheed. mal.* 10. *p.* 163. *t.* 82.
Habitat in Indiis.

TRAGIA (*Chamælea*) foliis lanceolatis obtuſis integerrimis. *Linn. ſp.* 1391. *Fl. zeyl.* 335.
Chamælea foliis linearibus, floſculis ſpicatis, echinato fructu. *Burm. zeyl.* 59. *t.* 25.
Tithymalus tenellus indicus, foliis linariæ raris. *Herm. mus. zeyl.* 33.
Tithymalus tenuifolius aquaticus, foliis raris. *Burm. zeyl.* 225.
Codi-avanacu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 63. *t.* 34.
Habitat in India.

HERNANDIA (*ſonora*) foliis peltatis. *Linn. ſp.* 1391. *Fl. zeyl.* 423. *H. Cliff.* 423.
Hernandia amplo Hederæ folio umbilicato. *Plum. gen.* 6.
Nux zeylanica, umbilicatis foliis. *Burm. zeyl.* 171.
Nux veſicaria oleoſa, foliis umbilicatis. *Plukn. alm.* 266. *t.* 208. *f.* 1.
Arbor regis. *Rumph. amb.* 2. *p.* 257. *t.* 85.
Balantine. *Petiv. gazoph. t.* 43. *f.* 1.
Habitat in Indiis.

HERNANDIA (*ovigera*) foliis ovatis, baſi petiolatis. *Linn. ſp.* 1392.
Arbor ovigera. *Rumph. amb.* 3. *p.* 193. *t.* 123.
Habitat in Amboina.

PHYLLANTHUS (*epiphyllanthus*) foliis lanceolatis ſerratis, crenis floriferis. *Linn. ſp.* 1393. *Roy. lugdb.* 200. *n.* 1.
Phyllanthus americana planta, flores e ſingulis foliorum crenis proferens. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 199. *t.* 102. *Catesb. car.* 2. *p.* 26. *t.* 26. *Seb. thes.* 1. *p.* 21. *t.* 13. *f.* 2.
β Xylophyllos ceramica. *Rumph. amb. auct.* 19. *t.* 12.
Habitat in utraque India.

Ante paucos annos in Horto noſtro hujus ſpeciei varietas ex Gallia fuit allata multo tenerior, caule & foliis rubicundis glaberrimis, venulis ruffis.

PHYLLANTHUS (*Niruri*) foliis pinnatis floriferis, floribus pedunculatis, caule herbaceo erecto. *Linn. ſp.* 1392. *Fl. zeyl.* 331.
Urinaria indica erecta vulgaris. *Burm. zeyl.* 230. *t.* 93. *f.* 2.
Herba mæroris alba. *Rumph. amb.* 6. *p.* 41. *t.* 17. *f.* 1.
Niruri barbadenſe, folio ovali ſubtus glauco, petiolis florum breviſſimis. *Mart. cent.* 9. *t.* 9.
Fruticulus capſularis hexapetalos, Caſiæ poëtarum foliis brevioribus. *Plukn. alm.* 159. *t.* 183. *f.* 5.
Viti ideæ adfinis, floribus parvis hexapetalis, in foliorum alis ſingulis, vaſculo ſeminali in ſex capſulas diviſo. *Raj. app.* 29.
Kirganelli. *Rheed. mal.* 10. *p.* 29. *t.* 15.
Daun-kotti Javanis.
Habitat in India.

Planta efficaciſſima ad pellendam urinam. *Herm. herb.*

PHYLLANTHUS (*urinaria*) foliis pinnatis floriferis, floribus ſeſſilibus, caule herbaceo procumbente. *Linn. ſp.* 1393. *Fl. zeyl.* 332.
Urinaria indica ſupina, cauliculis rubentibus. *Burm. zeyl.* 231.
Vitis Idææ adfinis indica minor. *Raj. dendr.* 29.
Herba moeroris rubra. *Rumph. amb.* 6. *p.* 41. *t.* 17. *f.* 2.
Fruticulus capſularis hexapetalos brevioribus foliis & auguſtis. *Plukn. alm.* 150. *t.* 183. *f.* 6.
Tsjera-Kirganeli. *Rheed. mal.* 10. *p.* 8. *t.* 16.
Habitat in India.

PHYLLANTHUS (*maderaſpatenſis*) foliolis alternis cuneiformibus mucronatis. *Linn. ſp.* 1393. *Roy. lugdb.* 200. *n.* 2.
Nirouri maderaſpatenſis, ſennæ folio longiore. *Petiv. Gaz.*
Frutex baccifer, foliis Lini vel Caſiæ Poëticæ, maderaſpatenſis. *Plukn. phyt.* 159. *t.* 31. *f.* 2.
Habitat in India.

PHYLLANTHUS (*emblica*) foliis pinnatis floriferis, caule arboreo, fructu baccato. *Linn. ſp.* 1393. *Fl. zeyl.* 333.
Myrobalanus emblica. *Bauh. pin.* 445. *Rumph. amb.* 7. *p.* 1. *t.* 1.
Myrobalanus emblica, foliis ſecuridacæ. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 79.
Nellika. *Zanon. hiſt.* 159. *t.* 6.
Nelli-camarum. *Rheed. mal.* 1. *p.* 69. *t.* 38.
Habitat in India.

UR-

URTICA (*balearica*) foliis oppoſitis cordatis ſerratis, amentis fructiferis globoſis. *Linn. ſp.* 1395.
Urtica pilulifera, foliis cordatis circumſerratis. *Hall. helv.* 27.
Habitat in India.

URTICA (*canadenſis*) foliis alternis cordato-ovatis, amentis ramoſis diſtichis erectis. *Linn. ſp.* 1397. *Roy. lugdb.* 210. *n.* 4.
Urtica canadenſis racemoſa mitior ſ. minus urens. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 34. *ſ.* 11. *t.* 25. *f.* 2.
URTICA (*capitata*) foliis alternis cordatis, glomerulis ſpicatis *Linn. ſp.* 1397. ubi deſcr.
Habitant in Canada & Java.

URTICA (*æſtuans*) foliis alternis cordatis, racemis dichotomis, fructibus corymboſo-orbiculatis *Linn. ſp.* 1397. ubi deſcr.
Rameum majus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 214. *t.* 79. *f.* 1.
Habitat in Indiis.

URTICA (*interrupta*) foliis alternis ovato-cordatis ſerratis petiolo ſubbrevioribus, ſpicis ſolitariis interruptis. *Linn. ſp.* 1398. *Fl. zeyl.* 336.
Urtica ſativa ſpicata, foliis floribuſque petiolis longiſſimis donatis. *Burm. zeyl.* 232. *t.* 110. *f.* 1. 2.
Lupulo vulgari ſimilis Indiæ orientalis, floribus in ſpicam ex origine foliorum prodeuntem *Plukn. alm.* 229. *t.* 201. *f.* 5.
β Urtica pilulifera, foliis majoribus, longiſſimis pediculis, foliolis minoribus pediculis brevibus donatis. *Burm. zeyl.* 231. *t.* 110. *f.* 1.
Batti-ſcorigeram. *Rheed. mal.* 1. *p.* 75. *t.* 40.
Latang malaice Javanis.
Habitat in India.

URTICA (*nivea*) foliis alternis ſuborbiculatis utrinque acutis ſubtus tomentoſis. *Linn. ſp.* 1398. *Roy. lugdb.* 210. *n.* 5.
Urtica racemifera maxima ſinarum, foliis ſubtus argentea lanugine villoſis. *Plukn. amalth.* 212.
Habitat in India & China.

URTICA (*longifolia*) foliis alternis lanceolatis ſerratis, glomerulis cymoſis.
Morus parvus montanus, folio oblongo ſerrato. *D. Kleinhof.*
Habitat in Java.

URTICA (*candicans*) foliis ovalibus crenatis ſubtus candicantibus, racemis axillaribus cymoſis.
Moumineram Javanis.
Habitat in Java.

URTICA (*caudata*) foliis ovatis ſerratis, ſpica axillari caudata.
Habitat in Java.

TREVIA (*nudiflora*) *Linn. ſp.* 1661.
Arbor racemoſa malabarica, fructu triquetro. *Commel. Fl. mal.* 30.
Canſchi. *Rheed. mal.* 1. *p* 76. *t.* 42.
Habitat in arenoſis Malabariæ.

MORUS (*alba*) foliis oblique cordatis lævibus. *Linn. ſp.* 1398. *Roy. lugdb.* 211. *n.* 2.
Morus fructu albo. *Bauh. pin.* 459.
Morus candida. *Dod. pempt.* 810.
Habitat in China.

MORUS (*papyrifera*) foliis palmatis, fructibus hiſpidis. *Linn. ſp.* 1399.
Morus ſativa, foliis urticæ mortuæ, cortice papyrifero. *Kæmpf. amoen.* 471. *t.* 472.
Morus papyrifera ſativa japonica. *Seb. thes.* 1. *p.* 44. *t.* 28. *f.* 3.
Habitat in Japonia.

MORUS (*indica*) foliis ovato-oblongis utrinque æqualibus inæqualiter ſerratis. *Linn. ſp.* 1399. *Fl. zeyl.* 337.
Morus indica. *Rumph. amb.* 7. *p.* 8. *t.* 5.
Betulæ ſpecies, conis oblongis villoſis, foliis oblongis ſerratis. *Herm. zeyl.* 33. *Burm. zeyl.* 47.
Tinda-parua. *Rheed. mal.* 1. *p.* 87. *t.* 49.
Habitat in India.

PENTANDRIA.

XANTHIUM (*orientale*) caule inermi, foliis cuneiformi-ovatis ſubtrilobis. *Linn. ſp.* 1400. *Fl. zeyl.* 564. *Fil. dec.* 2. *t.* 17.
Xanthium elatius majus americanum, fructu ſpinulis aduncis munito. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 604. *ſ.* 15. *t.* 2. *f.* 2.
Xanthium ſeu lappa urukoſſa dicta. *Burm. zeyl.* 233.
Xanthium majus canadenſe. *Herm. lugdb.* 635.
Lappa canadenſis minori congener ſed procerior *Ray. hiſt.* 165.
Habitat in Zeylona, China, Japonia.

AMARANTHUS (*oleraceus*) glomeribus triandris pentandriſque, foliis ovatis obtuſiſſimis emarginatis rugoſis. *Linn. ſp.* 1403. ubi deſcr.
Amaranthus indicus nodiflorus, capitulis ex albo virideſcentibus. *D. Pryon.*
Blitum album majus *Bauh. pin.* 118. *Rumph. amb.* 5. *p.* 231. *t.* 82. *f.* 1.
Habitat in India.

AMA-

AMARANTHUS (*polygamus*) glomerulis diandris ſubſpicatis ovatis, floribus hermaphroditis femineiſque, foliis lanceolatis. *Linn. ſp.* 1403.
Blitum indicum album. *Rumph. amb.* 5. *p.* 231. *t.* 82. *f.* 2.
Habitat in India.

AMARANTHUS (*tricolor*) glomerulis triandris axillaribus ſubrotundis amplexicaulibus, foliis lanceolato-ovatis. *Linn. ſp.* 1403. *Roy. lugdb.* 419. *n.* 5.
Amaranthus folio variegato. *Bauh. pin.* 121.
Amaranthus tricolor. *Lob. ic.* 252.
Habitat in India.

AMARANTHUS (*melancholicus*) glomerulis triandris axillaribus ſubrotundis ſeſſilibus, foliis lanceolatis acuminatis. *Linn. ſp.* 1403.
Amaranthus folio variegato *C. Bauh.* colore obſcuriore ſeu mas. *Tourn. inſt.* 236.
Amaranthus verticillatus melancholicus, macula nigra in medio foliorum infectus. *Plukn. alm.* 27.
Habitat in India.

AMARANTHUS (*gangeticus*) glomerulis triandris ſubſpicatis ovatis, foliis lanceolato-ovatis emarginatis. *Linn. ſp.* 1403. ubi deſcr.
Habitat in India.

AMARANTHUS (*triſtis*) glomerulis triandris rotundatis ſubſpicatis, foliis ovato-cordatis emarginatis petiolo brevioribus. *Linn. ſp.* 1404. ubi deſcr.
Blitum indicum ſecundum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 231. *t.* 82. *f.* 2.
Habitat in Amboina & China.

AMARANTHUS (*mangoſtanus*) glomerulis triandris ſubſpicatis rotundatis, foliis rhombeis. *Linn. ſp.* 1404. *Amoen. acad.* 4. *p.* 294.
Habitat in India.

AMARANTHUS (*viridis*) glomerulis triandris, floribus maſculis trifidis, foliis ovatis emarginatis, caule erecto. *Linn. ſp.* 1405. ubi deſcr.
Amaranthus indicus nodiflorus, capitulis ex albo virideſcentibus. *D. Pryon.*
Blitum album minus *Bauh.* polyſpermum folio ſubrotundo. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 92. *f.* 1.
Blitum ſylveſtre ſpicatum. *Tourn. paris.* 2. *p.* 273.
Cararu. *Piſon. braſil.* 241. *t.* 241.
Habitat in Indiis.

AMA-

AMARANTHUS (*polygonoides*) glomerulis triandris axillaribus, foliis ovatis emarginatis, floribus femineis infundibiliformibus obtuſis. *Linn. ſp.* 1405.

Blitum polygonoides viride polyanthos. *Sloan. hiſt. jam* 1. *p.* 144. *t.* 92. *f.* 2.

Habitat in Zeylona & Jamaica.

AMARANTHUS (*caudatus*) racemis pentandris decompoſitis cylindricis pendulis longiſſimis. *Linn. ſp.* 1406. *Fl. zeyl.* 563. *Roy. lugdb.* 419. *n.* 1.

Amaranthus maximus. *Bauh. pin.* 120.

Blitum maximum perſicum, paniculis mollibus pendulis ſericeis. *Herm. zeyl.* 64. *Burm. zeyl.* 48.

Blitum majus peruvianum. *Clus. hiſt.* 2. *p.* 81.

Habitat in Zeylona & Perſia.

AMARANTHUS (*cruentus*) racemis pentandris decompoſitis remotis patulo-nutantibus, foliis lanceolato-ovatis. *Linn. ſp.* 1406.

Amaranthus ſinenſis, foliis variis. *Mart. cent.* 6. *t.* 6.

Habitat in China.

AMARANTHUS (*flavus*) ramis pentandris compoſitis, ſummo infimiſque nutantibus, foliis ovatis mucronatis. *Linn. ſp.* 1406. ubi deſcr.

Amaranthus ſpicis erectis, pediculis foliorum longiſſimis. *Rand.*

Amaranthus luteus, latiore folio. *D. Pryon.*

Habitat in India.

AMARANTHUS (*ſpinoſus*) racemis pentandris cylindricis erectis, axillis ſpinoſis. *Linn. ſp.* 1407. *Fl. zeyl.* 338. *Roy. lugdb.* 419. *n.* 2.

Amaranthus indicus ſpinoſus, ſpica herbacea. *Herm. lugdb.* 31. *t.* 31. *Burm. zeyl.* 18.

Amaranthus ſpinoſus, flore viridi, Baïam doeri Javanis. *D. Pryon.*

Blitum ſpinoſum. *Rumph. amb.* 5. 234. *t.* 83. *f.* 1.

Habitat in India.

ZIZANIA (*terreſtris*) panicula racemoſa. *Linn. ſp.* 1408.

Gramen paniculatum indicum, granis in calycibus foliosis rotundis nigris. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 617.

Katou-Tsjolam. *Rheed. mal.* 12. *p.* 113. *t.* 60.

Habitat in Malabariæ locis aridis.

HEPTANDRIA.

GUETTARDA (*ſpecioſa*) *Linn. ſp.* 1408. *Osb. it.* 275.

Haleſia arboreſcens, foliis ſubrotundis ſubtus argenteis, ſpicis florum bigeminis, ſuſtentaculis longis alaribus. *Brown. jam.* 205. *t.* 20. *f.* 1.

Habitat in Java & Jamaica.

PO-

SAGITTARIA (*ſagittifolia*) foliis ſagittatis acutis. *Linn. ſp.* 1410. *Roy. lugdb.* 493. *n.* 1.
Sagitta aquatica minor latifolia. *Bauh. pin.* 194.
Habitat in Europæ, Aſiæ & Americæ fluviis.

Aſiatica non differt niſi foliis magis nervoſis, lobis inferioribus productis.

SAGITTARIA (*obtuſifolia*) foliis ſagittatis obtuſis, caule ramoſo. *Linn. ſp.* 1410.
Sagittariæ foliis planta, glomerato fructu monopyreno, coriandri figura. *Plukn. alm.* 326. *t.* 220. *f.* 7.
Sagitta zeylanica. *Garcin. herb.*
Culitamara. *Rheed. mal.* 11. *p.* 93. *t.* 45.
Habitat in Malabara.

SAGITTARIA (*trifolia*) foliis ternatis. *Linn. ſp.* 1410.
Sagittaria chinenſis, foliis ternis longiſſimis. *Petiv. Gazoph.* 29. *t.* 19. *f.* 3.
Habitat in China.

THELIGONUM (*Cynocrambe*). *Linn. ſp.* 1411.
Cynocrambe Dioſcoridis. *Bauh. pin.* 122. *prodr.* 59. *t.* 59.
Cynocrambe Alſines foliis. *Barr. ic.* 335.
Parietariæ affinis cynocrambe dicta, floribus muſcoſis. *Plukn. alm.* 280.
Alſines facie planta nova. *Colum. phyt.* 121. *t.* 36.
Habitat in Europa & Aſia.

QUERCUS (*molucca*) foliis lanceolato-ovatis integerrimis glabris. *Linn. ſp.* 1412.
Quercus molucca. *Rumph. amb.* 3. *p.* 85. *t.* 56.
Habitat in Moluccis.

MONADELPHIA.

THUJA (*orientalis*) ſtrobilis ſquarroſis, ſquamis acuminatis reflexis. *Linn. ſp.* 1422. *Roy. lugdb.* 87. *n.* 2.
Habitat in China.

THUJA (*aphylla*) ſtrobilis quadrivalvibus, foliis turbinatis vaginantibus hinc mucronatis, frondibus imbricatis. *Linn. ſp.* 1422.
Sabina indica Tsjumama Tana incolis. *D. Kleinhof.*
Cupreſſus fructu quadrivalvi, foliis equiſeti inſtar articulatis. *Shaw. afric.* 188. *f.* 188.
Habitat in Aſia, Africa, Ægypto.

Tab. 64. f. 3. THUJA? (*javanica*) fronde tereti, ſquamis imbricatis, foliis turbinatis vaginantibus, ſummis lanceolatis.
Sabina indica. *D. Kleinhof.*
Habitat in Java.

Arbuſcula ſempervirens, facie Cupreſſi, folia imbricata breviſſima, in ſummo ramulorum plana ovato-lanceolata.


CYPRESSUS (*Thyoides*) foliis imbricatis, frondibus ancipitibus. *Linn. ſp.* 1422. *Kalm. it.* 2. *p.* 175. & 3. *p.* 114.
Cupreſſus nana marina, fructu cæruleo parvo. *Plukn. mant.* 61. *t.* 345. *f.* 1.
Frutex arboreſcens, folio æmulante ſabinam, guſtu fere nullo. ſindana incolis. *D. Pryon.*
Habitat in Java & Canada.

PLUKENETIA (*volubilis*) *Linn. ſp.* 1423. ubi deſcr.
Plukenetia ſcandens, hederæ foliis ſerratis, fructu tetragono. *Plum. gen.* 47. *ic.* 226.
Sajor volubilis, fructibus corniculatis. *Rumph. amb.* 1. *p.* 149. *t.* 79. *f.* 2.
Habitat in Indiis.

ACALYPHA (*virginica*) involucris femineis cordatis inciſis, foliis ovato-lanceolatis, petiolo longioribus. *Linn. ſp.* 1423. *Fl. zeyl.* 342. *Brown. jam.* 346. *n.* 2. *t.* 36. *f.* 2.
Mercurialis tricoccos hermaphroditica ad foliorum juncturas julifera. *Plukn. phyt.* 248. *t.* 99. *f.* 4.
Ricinocarpos indica hirſuta, fructus in parvis acetabulis gerens, foliis urticæ vulgaris. *Burm. zeyl.* 204.
Prakku tupu Javanis.
Habitat in Zeylona & Virginia.

ACALYPHA (*indica*) involucris femineis cordatis ſubcrenatis, foliis ovatis petiolo brevioribus. *Linn. ſp.* 1424. *Fl. zeyl.* 341.
Mercurialis zeylanica tricoccos cum acetabulis. *Herm. lugdb.* 686. *t.* 687.
Mercurialis maderaſpatenſis acetabulata, folio rotundo minore. *Petiv. cat. n.* 198.
Ricinocarpos indica glabra, fructus in acetabulis gerens. *Burm. zeyl.* 203.
Cupameni. *Rheed. mal.* 10. *p.* 165. *t.* 81.
β Urtica minor urens ſpicata, folio ſubrotundo ſerrato, fructu tricocco. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 125. *t.* 82. *f.* 3.
Wellia-cupameni. *Rheed. mal.* 10. *p.* 165. *t.* 82.
Habitat in Indiis.

ACA-



1 . *ACALYPHA hispida* .
2 . ———— *spiciflora* .



1. ACALYPHA *hiſpida*.
2. ————— *ſpiciflora*.

ACALYPHA (*hiſpida*) pedunculis filiformibus nudis piloſis, involucris ſetaceis, foliis petiolatis ovatis dentatis. *Tab. 61. f. 1.*
Cauda felis *Rumph. amb.* 4. *p.* 82. *t.* 36.
Watta-Taly. *Rheed. mal.* 5. *p.* 63. *t.* 32.
Amaranthus arboreſcens, Cauda felis longa, Tambang Javanis. D. *Pryon*, qui notat, quod flores ſpecificum præbeant remedium in Diarrihæa & omni morbo ex laxitate vaſorum orto, ſi cum aqua coquantur vel in conſerva adhibeantur.
Habitat in India.

In omnibus ſpeciminibus Javanicis pedunculi erecti, nec dependentes uti in *Rumphii* figura.

ACALYPHA (*ſpiciflora*) pedunculis interrupte ſpicatis, foliis ovatis ſuperne eroſis denticulatis. *Tab. 61. f. 2.*
Tithymalus parvus Indiæ orientalis Herniariæ foliis, Collar-pawly malabarorum. *Plukn. amalth.* 202. *t.* 449. *f.* 3.
β Acalypha erecta virgultoſa, foliis ovatis-acuminatis atque crenatis, ſpicis uniformibus alaribus. *Brown. jam* 346. *t.* 36. *f.* 2.
Pee-Tjierou-ponnagam. *Rheed. mal.* 5. *p.* 45. *t.* 23.
γ Ricinocarpos zeylanica urens, floribus ex alis ſpicatis. *Burm. zeyl.* 205. *t.* 93. *f.* 1.
Cauda Felis agreſtis alba. *Rumph. amb.* 4. *p.* 84. *t.* 37. *f.* 2.
Patsjotti. *Rheed. mal.* 5. *p.* 9. *t.* 5.
Habitat in India utraque.

β. γ. Haſce ut varietates addidi, cum ſpicæ in miſſis ſpeciminibus cum data figura conveniunt, foliis vero duplo majoribus nec tam profunde dentatis adeo differunt, ut facile pro nova ſpecie haberi poſſent.

CROTON (*variegatum*) foliis lanceolatis integerrimis glabris pictis petiolatis. *Linn. ſp.* 1424.
Codiæum chryſoſtichum. *Rumph. amb.* 4. *p.* 65. *t.* 25.
Tsjeri-maram. *Rheed. mal.* 6. *p.* 109. *t.* 61.
Dauen-Hellebardies Javanis.
β Codiæum teniosum. *Rumph. amb.* 4. *p.* 68. *t.* 26.
γ Codiæum ſylveſtre. *Rumph. amb.* 4. *p.* 69. *t.* 27.
Habitat in Amboina.

Frutex altitudine decem pedum excreſcit, figura & pictura foliorum maxime variat, ob quorum elegantiam in hortis colitur, ubi tamen raro floret.

CROTON (*ſebiferum*) foliis rhombeo-rotundatis utrinque mucronatis integerrimis glabris. *Linn. ſp.* 1425. *Osb. it.* 245.
Ricinus chinenſis ſebifera, populi nigræ folio. *Petiv. gazoph.* 53. *t.* 34. *f.* 3.
Euonymo affinis ſinarum, populi nigræ folio tricapſularis, granis nigris candidiſſima ſubſtantia obductis, ſebifera. *Plukn. amalth.* 76. *t.* 390. *f.* 2.
Boelon Bawans Javanis.
Habitat in China & Java.

CROTON (*Tiglium*) foliis ovatis glabris acuminatis ſerratis, caule arboreo. *Linn. ſp.* 1426. *Fl. zeyl.* 343.
Ricinoides indica, folio lucido, fructu glabro, grana Tiglia officinis dicto. *Burm. zeyl.* 200. *t.* 90.
Ricinus arbor indica cauſtica purgans. *Herm. zeyl.* 15.
Pinus indica, nucleo purgante. *Bauh. pin.* 492.
Granum moluccum. *Rumph. amb.* 4. *p.* 98. *t.* 42.
Cadel-avanacu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 61. *t.* 38.
Habitat in India.

CROTON (*lacciferum*) foliis ovatis tomentoſis ſerrulatis petiolatis, calycibus tomentoſis. *Linn. ſp.* 1426. *Fl. zeyl.* 344.
Ricinoides aromatica arbor circeæ foliis hirſutis, floribus ſpicatis major. *Burm. zeyl.* 201. *t.* 91.
Ricinus arbor indica aromatica ſubhirſuta Laccam in granis fundens, fructibus ſubhirſutis minimis *Hermanni. Moris. hiſt.* 3. *p.* 349.
Ricinus aromaticus ſpicatus, folio circeæ, ſpinis ad imum duplicatis armato, laccam in granis fundens. *Plukn. alm.* 320.
Arbor zeylanica aromatica acris Laccam fundens major. *Herm. zeyl.* 46.
Halecus terreſtris. *Rumph. amb.* 3. *p.* 197. *t.* 127.
Tartar fructu baccifero, pulpa interiore nigra. *D. Pryon.*
Habitat in India.

Javanicæ folia carnoſa tomento molliſſimo intus albicante extus viridi venoſa.

Tab. 62. *f.* 1. CROTON (*tinctorium*) foliis rhombeis repandis, capſulis pendulis, caule herbaceo. *Linn. ſp.* 1425. *Roy. lugdb.* 532. *n.* 6.
Ricinoides, ex qua paratur Tourneſol Gallorum. *Niſſol. act.* 1712. *p.* 337. *t.* 17.
Habitat Monſpelii & in Indiis.

Figuram ex Garcini herbario deſumſi, quod in Java collectum.

CROTON (*aromaticum*) foliis cordatis ſcabris ſubſerratis petiolatis, caule arboreo. *Linn. ſp.* 1427. *Fl. zeyl.* 345.
Ricinoides arbor aromatica circeæ foliis media. *Burm. zeyl.* 202.
Ricinus indicus fruteſcens, laccam fundens, medius *Hermanni. Raj. hiſt.* 3. *p.* 113.
Arbor zeylanica aromatica acris Laccam fundens media. *Herm. zeyl.* 46.
Halecus litorea. *Rumph. amb.* 3. *p.* 196. *t.* 126.
Frutex flore ſpicato & conglomerato. *D. Kleinhof.*
Habitat in Zeylona.

CROTON (*flavens*) foliis cordatis oblongis integerrimis utrinque tomentoſis, ramulis denſius tomentoſis. *Linn. ſp.* 1426.
Croton fruticoſum & villoſum, foliis cordatis acuminatis, ramulis craſſius tomentoſis. *Brown. jam.* 347.

Al-

64


T. 64.



1. CROTON castanæfolium.
2. ——— oblongum.
3. THUJA javanica.



1 . CROTON castaneifolium .
2 . ——— oblongum .
3 . THUJA javanica .



1. CROTON *hastatum*.
2. RICINUS *speciosus*.



1. CROTON *haſtatum*.
2. RICINUS *ſpecioſus*.



1. CROTON *tinctorium*.
2. ——— *racemosum*.
3. MARSILEA *cormandelica*.

Althæa fructu rambutum æmulante, ajam ajam Javanis. *D. Kleinhof.*
Habitat in Jamaica & Java.
Javanicæ folia magna lato-cordata acuminata tomentoſa ſubtus flaveſcentia, venis reticu-laribus.

CROTON (*moluccanum*) foliis cordatis angulatis ſcabris ſubtus tomentoſis. *Linn. ſp.* 1427. *Fl. zeyl.* 346.
Nux Juglans moluccana bifida. *Burm. zeyl.* 170.
β Ricinus dulcis arboreſcens, foliis populi nigri argenteis. *Plukn. phyt.* 320. *t.* 220. *f.* 5.
Habitat in Java, Moluccis & Zeylona.

CROTON (*haſtatum*) foliis trilobo-haſtatis lanceolatis dentatis. *Linn. ſp.* 1427. *Tab.* 63. *f.* 1.
Ricinus aſperior Alceæ Venetæ foliis aliquatenus accedens. *Plukn. alm.* 320. *t.* 220. *f.* 2.
β Ricinoides malabarica ſurattenſis *Garcin. herb.* quæ foliis integerrimis tomentoſis, cujusque figuram produco.
Habitat in Suratta.

CROTON (*lobatum*) foliis inermi ſerratis, inferioribus quinquelobis, ſuperioribus trilobis. *Linn. ſp.* 1427. *Fl. zeyl.* 347. *Roy. lugdb.* 201.
Ricinoides herbaceum, foliis trifidis & quinquefidis ſerratis. *Martyn. cent.* 46. *t.* 46.
Habitat in Indiis.

CROTON (*ſpinoſum*) foliis palmatis quinquelobis trilobisque ſpinoſo-ſerratis, floribus cauli adſperſis ſubſeſſilibus. *Linn. ſp.* 1427. *Fl. zeyl.* 238.
Ricinus maderaſpatanus quinquefidis durioribus foliis ad marginem ſpinoſis. *Plukn. alm.* 320. *t.* 108. *f.* 3.
Habitat in India.

CROTON (*urens*) foliis ternatis ſerratis lanceolatis. *Linn. ſp.* 1428.
Ricinus urens cannabinis foliis triphyllos. *Plukn. alm.* 320. *t.* 120. *f.* 6.
Habitat in India.

CROTON (*Polot*) foliis obovatis integerrimis nervoſis ſcabris.
Folium urens ſ. Polot. *Rumph. amb.* 3. *p.* 217. *t.* 141.
Blacka Tupoe Javanis.
Habitat in Amboina & Java.
Varietatem hujus ex Java accepimus, quæ foliis molliſſimis tomentoſis denticulatis, venis lucidis differt.

CROTON (*caſtaneifolium*) foliis ovatis denticulatis acuminatis.
β Katou-Patsjotti. *Rheed mal.* 5. *p.* 13. *t.* 7. *Tab.* 64. *f.* 1.
Habitat in Java.
Arbor. ramis cortice fuſco. *Folia* alterna glaberrima, denticulis æqualibus in ſummo caulis bina. *Spicæ* terminales, floſculis alternis.

CROTON (*oblongum*) foliis oblongo-ovatis integerrimis. *Tab.* 64. *f.* 2.

Tab. 62. *f.* 2. CROTON (*racemoſum*) foliis ovatis ſubſerratis tomentoſis, racemis terminalibus nudis.

β Benel. *Rheed. mal.* 5. *p.* 7. *t.* 4.

Haſce quatuor abſque nominibus ex Java accepimus.

JATROPHA (*moluccana*) foliis ovatis integerrimis ſubdentatis. *Linn. ſp.* 1428. *Fl. zeyl.* 328.

Nux moluccana, folio inſtar Ricini, ſemine nigro. *Herm. zeyl.* 34. *Burm. zeyl.* 170.

Habitat in Zeylona & Moluccis.

JATROPHA (*Curcas*) foliis cordatis angulatis. *Linn. ſp.* 1429. *Roy. lugdb.* 202. *n.* 1.

Jatropha aſſurgens ficus folio, flore herbaceo. *Brown. jam.* 348.

Ricinus americanus major, ſemine nigro. *Bauh. pin.* 432.

Ricinus agreſtis vel americanus, foliis in pauciores lacinias diſtinctis Djarak Coſta Javanis. *D. Pryon.* qui notat; ſemen hujus nigrum non maculatum alvum adeo ſollicitat, ut pars unius ſeminis dimidia ano & cato purget.

Habitat in Indiis.

JATROPHA (*urens*) foliis palmatis dentatis aculeatis. *Linn. ſp.* 1429. *Roy. lugdb.* 202.

Ricinus tithymaloides americanus lacteſcens & urens, floribus albis. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 19. *t.* 10.

Ricinus lacteſcens, Fici foliis, ſpinulis mordaceis armatis. *Plukn. alm.* 320. *t.* 220. *f.* 3.

Habitat in Indiis.

JATROPHA (*goſſypifolia*) foliis quinquepartitis: lobis ovatis integris: ſetis glanduloſis ramoſis. *Linn. ſp.* 1428. *Roy. lugdb.* 202. *n.* 5.

Ricinus minor, ſtaphyſagriæ folio, flore pentapetalo purpureo. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 129. *t.* 84.

Ricinus americanus perennis, floribus purpureis, ſtaphyſagriæ foliis. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 17. *t.* 9. *Merian. ſurin.* 38. *t.* 38.

Ricinus indicus piloſus trifidus ſ. quinquefidus, floribus atropurpureis. *Plukn. phyt.* 320. *t.* 56. *f.* 2. & *t.* 220. *f.* 4.

Illy ammanoek incolis Coromandeli.

Habitat in India utraque.

RICINUS (*communis*) foliis peltatis ſubpalmatis ſerratis. *Linn. ſp.* 1430. *Fl. zeyl.* 339.

Ricinus vulgaris. *Bauh. pin.* 439. *Moris.* 3. *p.* 347. *ſ.* 10. *t.* 3. *f.* 1.

Ricinus albus & ruber. *Rumph. amb.* 4. *p.* 92. & 97. *t.* 41. *Merian. ſur.* 30. *t.* 30.

Ricinus albus Daun Djarak incolis dictum. *D. Pryon.*

Avanacu ſeu citavanacu. *Rheed. mal.* 2. *p.* 57. *t.* 32.

Habitat in utraque India.

RI-

RICINUS (*Tanarius*) foliis peltatis repandis. *Linn. ſp.* 1430.
Tanarius minor. *Rumph. amb.* 3. *p* 190. *t.* 121.
Habitat in Amboina.

RICINUS (*Mappa*) foliis peltatis indiviſis. *Linn. ſp.* 1430.
Folium Mappæ. *Rumph. amb.* 3. *p.* 172. *t.* 108.
Habitat in Indiis.

RICINUS (*ſpecioſus*) foliis peltatis palmato-digitatis, foliolis lanceolatis dentatis petiolatis. *Tab. 63. f. 2.*
Djarak gorito Javanis.
Habitat in Java.

STERCULIA (*Balanghas*) foliis ovatis integerrimis alternis petiolatis, floribus paniculatis. *Linn. ſp.* 1430. *Fl. zeyl.* 350.
Cydonia arbor Balanghas dicta. *Burm. zeyl.* 48.
Nux malabarica ſulcata mucilaginoſa fabacea. *Plukn. alm.* 266.
Nux Juglans zeylanica minor bifida, flore puniceo. *Burm. zeyl.* 170.
Clompanus minor. *Rumph. amb.* 3. *p.* 169. *t.* 107.
Cavalam. *Rheed. mal.* 1. *p.* 89. *t.* 49.
Habitat in Malabara & Amboina.

STERCULIA (*fœtida*) foliis digitatis. *Linn. ſp.* 1431. *Fl. zeyl.* 349.
Merda Papaveris ſeu lignum ſtercoris. *Grim. zeyl.* 98.
Nux zeylanica, folio multifido digitato, flore merdam olente. *Burm. zeyl.* 169. *Plukn. alm.* 266. *t.* 208. *f.* 3.
Nux juglans zeylanica magna bifida, flore puniceo, ſtercus humanum redolente, nucleis ovalibus. *Herm. zeyl.* 5.
Clompanus major. *Rumph. amb.* 3. *p.* 168. *t.* 107.
Karil. *Rheed. mal.* 4. *p.* 75. *t.* 36.
Habitat in India.

SYNGENESIA.

TRICHOSANTHES (*Anguina*) pomis teretibus oblongis incurvis. *Linn. ſp.* 1432. *Roy. lugdb.* 262.
Anguina ſinenſis, flore albo elegantiſſimo, fructu oblongo intorto. *Michel. gen.* 12. *t.* 9. *Mill. dict.* *t.* 32.
Cucurbita chinenſis, fructu longo anguino vario, flore candido capillamentis tenuiſſimis ornato. *Till. piſ.* 49. *t.* 22.
Habitat in China.

TRI-

TRICHOSANTHES (*nervifolia*) pomis ovatis acutis, foliis cordatis oblongis trinerviis dentatis. *Linn. ſp.* 1432.
Momordica flore fiſtuloſo radiato albo, Hederæ folio, malabarica. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 74. *Burm. zeyl.* 162.
Balſamina cucumerina, foliis integris cordiformibus, floribus filamentoſis, fructu cucumerino oblongo viridi. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 337.
Tota-pivi. *Rheed. mal.* 8. *p.* 33. *t.* 17.
Habitat in India.

TRICHOSANTHES (*Cucumerina*) pomis ovatis acutis, foliis cordatis angulatis. *Linn. ſp.* 1432.
Balſamina cucumerina, folio amplo, flore candido, fructu glabro. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 337.
Pada-Valam. *Rheed. mal.* 8. *p.* 39. *t.* 15.
Habitat in India.

TRICHOSANTHES (*punctata*) foliis quinquelobis inciſis obtuſis ſubtus glanduloſo-punctatis. *Linn. ſp.* 1432.
Habitat in India orientali.

MOMORDICA (*Balſamina*) pomis angulatis tuberculatis, foliis glabris patenti-palmatis. *Linn. ſp.* 1433. *Roy. lugdb.* 262. *n.* 1.
Balſamina rotundifolia repens ſeu mas. *Bauh. pin.* 306.
Habitat in India.

MOMORDICA (*charantia*) pomis angulatis tuberculatis, foliis villoſis longitudinaliter palmatis. *Linn. ſp.* 1433. *Fl. zeyl.* 351. *Roy. lugdb.* 262. *n.* 2.
Momordica zeylanica pampinea fronde, fructu longiore & breviore. *Tourn. inſt.* 103. *Burm. zeyl.* 161.
Momordica ſeu charantia Indiæ orientalis, fructu aurantio majore oblongo, ſeminibus albis. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 73. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 336.
Balſamina cucumerina indica, fructu majore flaveſcente. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 103. *t.* 54.
Charantia. *Dod. pempt.* 670.
Amara indica. *Rumph. amb.* 5. *p.* 410. *t.* 151.
Pandi pavel. *Rheed. mal.* 8. *p.* 17. *t.* 9.
β Momordica indica amara, fructu tuberoſo pyriformi rubente. *Burm. zeyl.* 162.
Cucumis puniceus zeylanicus minor, ſeminibus nigris. *Herm. lugdb.* 482.
Pavel. *Rheed. mal.* 8. *p.* 18. *t.* 10.
Papari utan Javanis, quæ convenit cum *Rumph. t.* 152. *f.* 1.

MOMORDICA (*Luffa*) pomis oblongis, ſulcis catenulatis, foliis inciſis. *Linn. ſp.* 1433. *Fl. zeyl.* 352. *Roy. lugdb.* 262. *n.* 3.
Cucumis ægyptius reticulatus ſeu Luffa Arabum. *Veſl. ægypt.* 199. *t.* 58. 59.
Pepo indicus reticulatus, ſeminibus albis, major. *Herm. lugdb.* 482. *Burm. zeyl.* 185.
Petola. *Rumph. amb.* 5. *p.* 405. *t.* 147.
Habitat in India & Ægypto.

MOMORDICA (*cylindrica*) pomis cylindricis longiſſimis. *Linn. ſp.* 1433.
Pepo indicus reticulatus, ſeminibus nigris. *Herm. lugdb.* 482. *Plukn. alm.* 286. *Burm. zeyl.* 186.
Pepo reticulatus & ſulcatus, ſemine nigro. *Herm. parad. bat. app.* 11. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 332.
Habitat in Zeylona & China.

MOMORDICA (*trifoliata*) pomis ovatis muricatis, foliis ternatis dentatis. *Linn. ſp.* 1434.
Poppya ſylveſtris. *Rumph. amb.* 5. *p.* 414. *t.* 152. *f.* 2.
Habitat in Amboina.

CUCURBITA (*lagenaria*) foliis cordatis denticulatis tomentoſis, baſi ſubtus biglanduloſis, pomis lignoſis. *Linn. ſp.* 1434. *Roy. lugdb.* 263. *n.* 1.
Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. *Bauh. pin.* 313.
Cucurbita lagenaria, flore albo. *Moris. hiſt.* 2. *p.* 23. *ſ.* 1. *t.* 5. *f.* 3. *Rumph. amb.* 5. *p.* 397. *t.* 144.
Habitat in Indiis.

CUCURBITA (*Pepo*) foliis lobatis, pomis lævibus. *Linn. ſp.* 1435. *Roy. lugdb.* 263. *n.* 2.
Cucurbita major rotunda, flore luteo, folio aſpero. *Bauh. pin.* 213.
Cucurbita indica rotunda. *Dalech. hiſt.* 616.
Pepo indicus. *D. Kleinhof.* qui convenit cum Cucurbita indica. *Rumph. amb.* 5. *p.* 398. *t.* 45.
Habitat in India.

CUCURBITA (*Citrullus*) foliis multipartitis. *Linn. ſp.* 1435. *Roy. lugdb.* 264. *n.* 3.
Anguria indica. *Rumph. amb.* 5. *p.* 400. *t.* 146.
Anguria Citrullus dicta. *Bauh. pin.* 312.
Citrullus folio colocynthidis ſecto, ſemine nigro. *Bauh. hiſt.* 2. *p.* 235.
Habitat in India & Italia.

CUCUMIS (*acutangulus*) foliis rotundato-angulatis, pomis acutangulis. *Linn. ſp.* 1436.
Cucumis longus indicus. *Grew. muſ.* 229. *t.* 17. *f.* 2.
Cucumis indicus ſtriatus, operculo donatus, corticoſo putamine tectus. *Plukn. alm.* 123. *t.* 172. *f.* 1.
Petola benghalenſis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 408. *t.* 149.
Habitat in Amboina, China.

CUCUMIS (*flexuoſus*) foliis angulato-ſublobatis, pomis cylindricis ſulcatis curvatis. *Linn. ſp.* 1437.
Cucumis flexuoſus. *Bauh. pin.* 310.
Bryonia foliis ſubrotundis anguloſis, flore albo, fructu oblongo rubro fere pentagono. *D. Pryon.*
Habitat in India.

CUCUMIS (*anguinus*) foliis lobatis, pomis cylindricis longiſſimis lævibus contortuplicatis. *Linn. ſp.* 1437.
Petola anguina. *Rumph. amb.* 5. *p.* 407. *t.* 148.
Habitat in Amboina.

CUCUMIS (*maderaſpatanus*) foliis cordatis integris denticulatis, pomis globoſis glabris. *Linn. ſp.* 1438.
Bryonia. *Linn. Fl. zeyl.* 356.
Bryonia folio anguloſo acuto glabro. *Burm. zeyl.* 48. *t.* 19. *f.* 1.
β Cucumis maderaſpatanus, fructu minimo. *Plukn. alm.* 133. *t.* 170. *f.* 3.
Habitat in India.

BRYONIA (*palmata*) foliis palmatis lævibus quinque partitis, laciniis lanceolatis repando-ſerratis. *Linn. ſp.* 1438. *Fl. zeyl.* 353.
Bryonia zeylanica, folio quinquepartito. *Burm. zeyl.* 49.
Habitat in Zeylona.

BRYONIA (*cordifolia*) foliis cordatis oblongis quinquangularibus dentatis ſcabris baſi bidentatis. *Linn. ſp.* 1438. *Fl. zeyl.* 354.
Vitis alba indica. *Rumph. amb.* 5. *p.* 448. *t.* 166.
β Bryonia foliis ſubrotundis anguloſis, Momordicæ facie. *Burm. zeyl.* 49. *t.* 19. *f.* 2.
Bryonia folio ſubrotundo anguloſo, flore albo. *D. Pryon.*
Habitat in Zeylona & Amboina.

BRYONIA (*laciniofa*) foliis palmatis ſcabris, laciniis lanceolatis ſerratis: lateralibus minimis. *Linn. ſp.* 1438. *Fl zeyl.* 355. *Roy lugdb.* 264. *n.* 4.
Bryonia zeylanica, foliis profunde laciniatis. *Herm. lugdb.* 95. *t.* 95. *Burm. zeyl.* 50.
Bryonia zeylanica, flore luteo, fructu rubro. *Herm. par. bat.* 103. *t.* 107.
Bryonia zeylanica, foliis in profundas lacinias diviſis, fructu minore. *Tourn. inſt.* 102.
Bryonia foliis anguloſis acutis ſcabris, floſculo luteo parvo, baccis elegantiſſime rubentibus. *D. Pryon.* Sajor ſelar Javanis.
Momordica minor Indiæ orientalis Bryoniæ facie, fructu glabro molli uvæ criſpæ magnitudine & effigie ſuavepurpuraſcente, lineis niveis ſtriato. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 74.
Nehoemella. *Rheed. mal.* 8. *p.* 37. *t.* 19.
Habitat in India.

SI-

SICYOS (*Garcini*) foliis quinquepartitis, laciniis cuneiformibus quinquefidis cum acumine, fructu ciliato.
Bryonia zeylanica in Tutokorin inventa. *Garcin. herb.*
Habitat in Zeylona.

GYNANDRIA.

ANDRACHNE (*fruticoſa*) erecta arborea. *Osb. it.* 228. *Linn. ſp.* 1440. ubi deſcr.
Habitat in China.

DIOECIA DIANDRIA.

SALIX (*chinenſis*) foliis lanceolatis ſubſerratis ſubtus nitidis, ſtipulis lanceolato-ſetaceis.
Salix chinenſis aquatica. *D. Kleinhof;* quæ Salici *viminali* proxime accedit.
Habitat in China & Java.

TRIANDRIA.

EXCOECARIA (*Agallocha*). *Linn. ſp.* 1451.
Arbor excæcans. *Rumph. amb.* 2. *p.* 237. *t.* 79 & 80.
Habitat in Amboina.
Inter Javanicas in herbario noſtro occurvit ſpecies ab illis *Rumph.* diverſa, *ſpica* ſimplici nuda pedali, *foliis* oblongis acuminatis, *calyce* triphyllo, *petalis* tribus oblongis, *ſtaminibus* tribus, *corolla* longioribus, *ſtylo* nullo; hinc ſi adeſſet fæmina, quæ cum hoc conveniret, pro nova habenda foret ſpecie.

TETRANDRIA.

VISCUM (*rubrum*) foliis lanceolatis obtuſis, ſpicis lateralibus. *Linn. ſp.* 1451.
Viſcum foliis longioribus, baccis rubris. *Catesb. car.* 2. *p.* 81. *t.* 81.
Viſcus arboreus montanus javanicus *D. Kleinhof.*
Habitat in Indiis.
Javanici ſpeciminis Folia numero octo ex uno centro proveniunt glaberrima, petiolis longiora.
VISCUM (*articulatum*) caule triquetro articulato, ramulis planiuſculis, baccis ad genicula ſeſſilibus.
Planta Anonæ arbori increſcens ex avium excrementis *D. Pryon.* Angrek Javanis.
Habitat in Java.
Media inter Viſcum opuntioides & verticillatum.
MYRICA (*aſplenifolia*) foliis lanceolato-pinnatifidis, ſinubus obliquis alternis, ſubtus ferrugineis.
Myrtus brabanticæ ſimilis americana, foliorum laciniis Asplenii modo diviſis Julifera ſimul & fructum gerens. *Plukn. alm.* 250. *t.* 100. *f.* 6.
Cardiaca mulleriana indica. *Bod.* a *Stapel* in *Theophr.* 320.
Habitat in Indiis.

ZANTHOXYLUM (*trifoliatum*) foliis ternatis. *Linn. ſp.* 1455. ubi deſcr.
Habitat in China.

ANTIDESMA (*alexiteria*). *Linn. ſp.* 1455. *Fl. zeyl.* 357.
Antideſma ſpicis geminis. *Burm. zeyl.* 22. *t.* 10.
Berberi dumetorum baccas ſimiles ferens arbor *Hermanni herb.*
Arbor indica ovali folio, floſculis plurimis in ſpicis, ſummo ramulo diſpoſitis acinifera. *Plukn. amalth.* 22. *t.* 339. *f.* 1.
Groſſularia zeylanica, baccis minoribus acidiuſculis. *Burm. zeyl.* 112.
Noelietali. *Rheed. mal.* 4. *p.* 19. *t.* 56.
Habitat in India.

Tab. 65. *f.* 1. IRESINE (*perſica*) foliis obovalibus, panicula terminali, ſpicis ſimplicibus longiſſimis.
Amaranthus perſicus paniculatus. *Garcin. herb.*
Habitat in Perſia.

Rami ſimplices lignoſi albicantes. *Fol.* alterna obovata obtuſa tomentoſa ſubpetiolata. *Panicula* terminalis, conſtans e *ſpicis* numeroſiſſimis alternis longis ex albo ſericeis.

Tab. 65. *f.* 2. IRESINE (*javanica*) foliis oblongis, ſpicis paniculatis compactis brevibus.
Amaranthus verticillatus minor benghalenſis, ſerpylli foliis incanis. *Plukn. phyt.* 27. *t.* 10. *f.* 3.
Ex ſeminibus javanicis enata per totam æſtatem floruit.

Caul. orgyalis, craſſitie pennæ cygninæ ſtrictus, *ramis* ex albo tomentoſis. *Fol.* alterna petiolata oblonga integerrima obtuſa cum acumine nitida lanata, venis ſubtus protuberantibus. *Floreſc.* ſpicata, *ſpicis* numeroſis alternis compactis brevibus, ſuperiore productiore *Cal. per.* pellucens nitidum. *Cor.* petala albiſſima, pilis ex ſericeo ſplendentibus. *Stam. filam.* erecta e viridi lucida, nectario inter ſtamina piloſo. *Semina* ſplendentia nigricantia, licet in nulla planta flores fæmininos obſervare potuerim, matura & fæcunda tamen profert ſemina.

CANNABIS (*ſativa*). *Linn. ſp.* 1457. *Roy. lugdb.* 221. *n.* 1.
Cannabis ſativa. *Bauh. pin.* 320.
Cannabis indica. *Rumph.* 5. *p.* 208. *t.* 77. *f.* 1 & 2.
Kalengi cansjava. *Rheed. mal.* 10. *p.* 119. *t.* 60. 61.
Ginji javanis.
Habitat in Europa & India.

ZANONIA (*indica*). *Linn. ſp.* 1457.
Penar-valli maſcula. *Rheed. mal.* 8. *p.* 39. *t.* 49.
Penar-valli femina. *Rheed. mal.* 8 *p.* 31. *t.* 47. 48.
Habitat in Malabaria.


SMI-

65

T. 65.



1. JRESINE persica.
2. ——— javanica.



1. JRESINE *persica*.
2. ——— *javanica*.

SMILAX (*zeylanica*) caule aculeato angulato, foliis inermibus: caulinis cordatis, rameis ovato-oblongis. *Linn. ſp.* 1459. *Fl. zeyl.* 364.
Smilax indica ſpinoſa, folio cinnamomi, Pſeudo-China quibusdam. *Burm. zeyl.* 217.
β Smilax virginiana, ſpinis innocuis armata, latis Canellæ foliis, radice arundinacea craſſa nodoſa & carnoſa. *Plukn. alm* 349. *t.* 110. *f.* 5.
Pſeudo-china amboinenſis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 437. *t.* 161.
Habitat in Zeylona & Virginia.

SMILAX (*china*) caule aculeato teretiuſculo, foliis inermibus ovato-cordatis quinque nerviis. *Linn. ſp.* 1459.
Smilax minus ſpinoſa, fructu rubicundo, radice virtuoſa China dicta ſ. Sankiva. *Kæmpf. amoen.* 781. *t.* 782.
Smilax ſarmentis ſpinuloſis ſinuoſis, foliis quinque nerveis utrimque cordatis. *Rumph. amb. auct. p.* 72. *t.* 30.
China radix. *Bauh. pin.* 896.
China michuacanenſis ſ. ſmilax aſpera minor. *Plum. ic.* 83.
Fruticulus convolvulaceus ſpinoſus ſinicus, floribus parvis umbellatis. *Plukn. amalth.* 101. *t.* 408. *f.* 1.
β China. *Boym. fl. ſinenſ. T.* quæ ab hacce differt.
Habitat in China & Japonia.

SMILAX (*lanceolata*) caule inermi tereti, foliis inermibus lanceolatis. *Linn. ſp.* 1461.
Smilax non ſpinoſa, baccis rubris. *Catesb. car.* 2. *p.* 84. *t.* 84.
Habitat in India & Virginia.

SMILAX (*indica*) caule inermi teretiuſculo, foliis cordatis acuminatis, cymis oppoſitifoliis.
Smilax viticulis aſperis, leni Canellæ folio ex India orientali. *Plukn. amalth.* 194.
Kari-vilandi. *Rheed. mal.* 7. *p.* 59. *t.* 31.
Habitat in Java & Malabaria.

Javanica differt a figura *H. mal. caule* inermi, *foliis* cordatis acuminatis.

DIOSCOREA (*pentaphylla*) foliis digitatis. *Linn. ſp.* 1462. *Fl. zeyl.* 363.
Ricophora pentaphyllos, caule ſpinoſo, fructu oblongo triquetro malabarica. *Plukn. alm.* 321.
Batatta indica, caule ſpinoſo, foliis digitatis, fructu triangulo cum tribus intus ſeminibus compreſſis. *Raj. app.* 133.
Ubium quinquefolium. *Rumph. amb.* 5. *p.* 359. *t.* 127.
Nureni-kelengi. *Rheed. mal.* 7. *p.* 67. *t.* 35.
Habitat in India.

DIOSCOREA (*triphylla*) foliis ternatis. *Linn. ſp.* 1462.
Rizophora ſeu inhame curaſſavica trifolia. *Herm. par. bat.* 371. *Plukn. alm.* 321.
Batatta ſylveſtris ſpinoſa trifolia, flore vidua verrucoſa, fructibus in ſpicis longis rarioribus triangularibus. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 133.
Ubium ſylveſtre. *Rumph. amb.* 5. *p.* 461. *t.* 128.
Tſiageri-nuren. *Rheed. mal.* 7. *p.* 63. *t.* 33.
Habitat in Indiis.

DIOSCOREA (*aculeata*) foliis cordatis, caule aculeato bulbifero. *Linn. ſp.* 1462.
Dioſcorea Indiæ orientalis, folio Tamni longiore, floribus ſpicatis, ſpicis plurimis ex uno pedunculo exeuntibus, ſcapo eorum medio geniculato. *Amman. herb.* 257.
Kattu-kelengu. *Rheed. mal.* 7. *p.* 71. *t.* 37.
β Combilium. *Rumph. amb.* 5. *p.* 357. *t.* 126.
Habitat in India.

DIOSCOREA (*alata*) foliis cordatis, caule alato bulbifero. *Linn. ſp.* 1462. *Fl. zeyl.* 260.
Rhizophora indica foliis Inhame rubra, caule alato, ſcammonii foliis nervoſis *Burm. zeyl.* 206.
Batatta ſylveſtris indica, foliis ſmilacis lævibus, caulibus alatis, flore vidua, pro fructu glandes tuberoſas ad exortum foliorum emittens. *Raj. app.* 144.
Volubilis rubra, caule membranulis exſtantibus alato, folio cordato nervoſo. *Sloan. hiſt.* 1. *p.* 139.
Uubium digitatum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 350. *t.* 121.
Katſiil-kelengu. *Rheed. mal.* 7. *p.* 71. *t.* 38.
Habitat in Indiis.

DIOSCOREA (*bulbifera*) foliis cordatis, caule lævi bulbifero. *Linn. ſp.* 1463. *Fl. zeyl.* 359.
Rhizophora zeylanica, ſcammonii folio ſingulari, radice rotunda. *Herm. par. bat.* 217. *t.* 217. *Burm. zeyl.* 207.
Rhizophora indica, Bryoniæ nigræ ſimilis, ad foliorum exortum verrucoſa. *Plukn. alm.* 321. *t.* 220. *f.* 6.

Batatta ſylveſtris, foliis ſmilacis nervoſis, flore vidua, fructu triangulari compreſſo diſpermo. *Raj. app.* 133.
Ubium pomiferum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 354. *t.* 124.
Katu-Katjil. *Rheed. mal.* 7. *p.* 69. *t.* 36.
Habitat in Indiis.

DIOS-

DIOSCOREA (*ſativa*) foliis cordatis alternis, caule lævi tereti. *Linn. ſp.* 1463. *Fl. zeyl.* 358. *Roy. lugdb.* 527.
Dioſcorea ſcandens, foliis Tamni, fructu racemoſo. *Plum. gen.* 9. *ic.* 117. *f.* 1.
Rhizophora indica ſive Inhame malabarica, folio rotundo in acutiſſimum apicem mucronato. *Plukn. alm.* 32.
Volubilis nigra, folio cordato nervoſo. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 140.
Mu-kelengu. *Rheed. mal.* 8. *p.* 97. *t.* 51.
Habitat in Indiis.

DIOSCOREA (*oppoſitifolia*) foliis oppoſitis ovatis acuminatis. *Linn. ſp.* 1463. *Fl. zeyl.* 361.
Inhame maderaſpatenſis, foliis binis pulchre venoſis. *Petiv. gaz.* 50. *t.* 31. *f.* 6.
Polygonatum ſcandens altiſſimum, Tamni foliis. *Plum. ic.* 117. *f.* 2.
β Ubium anguinum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 351. *t.* 122.
Habitat in Indiis.

DIOSCOREA (*peltata*) foliis peltatis ſubcordatis. *Linn. Fl. zeyl.* 362.
Smilax foliis peltatis cordato-oblongis, floribus minutiſſimis & copioſiſſimis. *Burm. zeyl.* 218. *t.* 101.
Mechoacannæ ſimilis, radix zeylanica aſthmatica. *Hermanni. herb.*
Planta ſcandens, folio convolvuli obtuſo umbilicato, kalujuſſan zeylonenſibus. *Herm. zeyl.* 21.
Habitat in Zeylona.

DIOSCOREA (*cylindrica*) foliis obtuſe cordatis angulatis, bulbis cylindricis.
Kappa-kelengu. *Rheed. mal.* 7. *p.* 95. *t.* 50.
Habitat in India.

DECANDRIA.

CARICA (*Papaja*) foliorum lobis ſinuatis. *Linn. ſp.* 1466. *Fl. zeyl.* 365. *Roy. lugdb.* 225. *n.* 1.
Carica fronde comoſa, foliis peltatis, lobis varie ſinuatis. *Brown. jam.* 360.
Papaja mas & fæmina. *Burm. zeyl.* 184. *Rumph. amb.* 1. *p.* 149. *t.* 50. *Boym. fl. ſinens. A. f. A.*
Papaja fructu oblongo melonis effigie. *Trew. Ehret. t.* 17. *Ehret. t.* 3. *f.* 1.
Ficus arbor utriuſque Indiæ, Platani foliis monopeteches. *Plukn. alm.* 145. *t.* 278. *f.* 1.
Arbor Platani folio, fructu Peponis magnitudine eduli. *Bauh. pin.* 131. *Merian. Surin.* 40. *t.* 40. & *t.* 62, 64.
Papaja-maram. *Rheed. mal.* 1. *p.* 21. *t.* 15. *f.* 2. & 13. *f.* 1.
Habitat in utraque Indiis.

SCHINUS (*indica*) foliis pinnatis, foliolis ovatis ſerratis impari æquali, petiolis alatis ſubcanaliculatis.
Habitat in India.

ME-

MENISPERMUM (*Cocculus*) foliis cordatis retuſis mucronatis, caule lacero. *Linn. ſp.* 1468.
Cocculus officinarum. *Bauh. pin.* 511. *Plukn. mantiſſ.* 52. *t.* 345. *f.* 2.
Arbor Ariſtolochiæ foliis maderaſpatenſis, fructu parvo Medicæ ad inſtar convoluto. *Plukn. alm* 43. *t.* 13. *f.* 2.
Tuba baccifera. *Rumph. amb.* 5. *p.* 35. *t.* 22.
Habitat in Java.

MENISPERMUM (*criſpum*) foliis cordatis exquiſitis, caule quadrangulo. criſpo. *Linn. ſp.* 1468.
Funis quadrangularis. *Rumph. amb.* 5. *p.* 83. *t.* 44. *f.* 2.
Habitat in Amboina.

MENISPERMUM (*orbiculatum*) foliis orbiculatis ſubtus villoſis. *Linn. ſp.* 1468.
Cocculi orientalis frutex convolvulaceus, orbiculatis foliis prona parte villoſis. *Plukn. amalth.* 61. *t.* 384. *f.* 6.
Habitat in India.

MENISPERMUM (*hirſutum*) foliis lanceolato-ovatis villoſis. *Linn. ſp.* 1469.
Cocculi indici altera ſpecies minor ſcandens vincæ pervincæ foliis villoſis. *Plukn. amalth.* 61. *t.* 384. *f.* 7.
Habitat in India.

MENISPERMUM (*myoſotidis*) foliis lineari-lanceolatis hirſutis. *Linn. ſp* 1469.
Cocculi indici ſpecies minima, Myſotidis hirſutis foliis & facie. *Plukn. amalth.* 62. *t.* 384. *f.* 3.
Habitat in India.

MENISPERMUM (*glabrum*) foliis cordatis acuminatis glabris.
Planta ſcandens, folio glabro craſſo cordato acuto, fructu rotundo rubro. Daun Tayonam incolis dicto. D. *Pryon.*
Cit-amerdu. *Rheed. mal.* 7. *p.* 39. *t.* 21.
Habitat in Java.

Caul. volubiles glaberrimi. *Fol.* petiolata cordata acuminata remotiuſcula glabra. *Racemi* ſimplices, *floſculis* alternis.

TAXUS (*nucifera*) foliis diſtantibus. *Linn. ſp.* 1472.
Taxus nucifera. *Kæmpf. amoen.* 814. *t.* 815.
Habitat in Japonia.

CLU-

CLUTIA (*pulchella*) foliis ovatis integerrimis, floribus lateralibus. *Linn. ſp.* 1475. *Roy. lugdb.* 202. *n.* 1.
Frutex æthiopicus, portulacæ folio, flore ex albo vireſcente *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 177. *t.* 91.
Herba fruteſcens. *D. Kleinhof.*
Habitat in Æthiopia & Java, unde miſſa.

CLUTIA (*retuſa*) foliis ovalibus retuſis, floribus racemoſis axillaribus. *Linn. ſp.* 1475. *Fl. zeyl.* 367.
Arbor foliis latis ſubrotundis venoſis, ſubtus glaucis, ſpicis longis. *Burm. zeyl.* 29.
Baccifera indica, fructu tetraſpermo in alis foliorum ſeſſili. *Raj. hiſt.* 1623.
Corni ſeu ſorbi ſpecies. *Bont. jav.* 103.
Scherunam-cottam. *Rheed. mal.* 2. *p.* 23. *t.* 18.
Habitat in India.

CLUTIA (*Eluteria*) foliis cordato-lanceolatis. *Linn. ſp.* 1376. *Fl. zeyl.* 366.
Eluteria. *Linn. H. cliff.* 486.
Ricinus dulcis arboreſcens americanus, populnea fronde argentea. *Plukn. alm.* 321. *t.* 220. *f.* 5. *Seb. theſ.* 1. *p.* 56. *t.* 35. *f.* 3.
Croton fruticuloſum erectum ſubvilloſum, foliis cordatis acuminatis, ſpicis terminalibus. *Brown. jam.* 347.
Ricinus arbor zeylanicus dulcis. *Burm. zeyl.* 206.
Habitat in Indiis.

POLYGAMIA MONOECIA.

MUSA (*paradiſiaca*) ſpadice nutante, floribus maſculis perſiſtentibus. *Linn. ſp.* 1477. *Fl. zeyl.* 467. *Roy lugdb.* 10.
Muſa cliffortiana. *Linn. muſ.* 1. *t.* 1. *Trew. Ehret. t.* 18. 19. 20.
Muſa ſerapionis, Ficus indica. *Burm. zeyl.* 164.
Muſa. *Cluſ. exot.* 229. *Rumph. amb.* 5. *p.* 125. *t.* 60. *Sterb. citric. t.* 4.
Palma humilis, longis latiſque foliis. *Bauh. pin.* 107.
Ficus indica & ſinica. *Boym. fl. ſinenſ. B. f. B.*
Bala. *Rheed. mal.* 1. *p.* 17. *t.* 12. 13. 14.
Habitat in India.

MUSA (*ſapientum*) ſpadice nutante, floribus maſculis deciduis. *Linn. ſp.* 1477.
Muſa ſpadice nutante, fructu breviore oblongo. *Brown. jam.* 361.
Muſa caudice maculato, fructu recto rotundo breviore odorato. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 147. *Trew. ehret* 4. *t.* 21. 22. 23.
Muſæ affinis altera. *Bauh. pin.* 580.
Ficus indica racemoſa, foliis venuſte venoſis, fructu minore. *Plukn. alm.* 145.
Habitat in Indiis.

MUSA (*Bihai*) ſpadice erecto, ſpathis perſiſtentibus. *Linn. ſp.* 1477.
Muſa ſpadice erecto, ſpathis rigidis amplexantibus diſtiche & alternatim ſitis. *Brown. jam.* 364.
Bihai ampliſſimis foliis, florum vaſculis variegatis. *Plum. gen.* 20.
Folium menſarium. *Rumph. amb.* 5. *p.* 140. *t.* 62. *f.* 2.
β Bihai ampliſſimis foliis, florum vaſculis coccineis. *Plum. gen.* 50. *ic.* 59.
Habitat in Indiis.

MUSA (*Trogloditarum*) ſpadice erecto, ſpathis deciduis. *Linn. ſp.* 1479.
Muſa uranoſcopus. *Rumph. amb.* 5. *p.* 137. *t.* 61.
β Muſa XI, Piſſang Batu. *Rumph. amb.* 5. *p.* 132.
Habitat in Moluccis.

OPHIOXYLUM (*ſerpentinum*). *Linn. ſp.* 1478. *Fl. zeyl.* 239. & 398.
Liguſtrum, foliis ad ſingula internodia ternis, Lignum Colubrinum officinis creditum. *Burm. zeyl.* 141. *t.* 64.
Clematis indica, perſicæ folio, fructu Periclymeni. *Bauh. pin.* 304.
Radix Muſtelæ. *Rumph. amb.* 7. *p.* 29. *t.* 16.
Habitat in Zeylona & Amboina.
Tota planta odorem & ſaporem ſambuci æmulatur & ab Indis inter alexiparmaca numeratur. *Herm. berb.*

CELTIS (*orientalis*) foliis oblique cordatis ſerratis, ſubtus villoſis. *Linn. ſp.* 1478. *Fl. zeyl.* 369.
Ulmus fructu baccato. *Linn. H. cliff.* 83.
Muntinghia folio ulmi aſpero, fructu minimo glomerato. *Plum. gen.* 41. *ic.* 206. *f.* 2.
Salvifolia arbor orientalis, foliis tenuiſſime crenatis. *Plukn. alm.* 329. *t.* 221. *f.* 4.
Baccifera indica racemoſa, florum ſtaminibus binis, acinis monopyrenis. *Raj. hiſt.* 1597.
Arbor Ghæduba dicta. *Burm. zeyl.* 26.
Mallam-toddali. *Rheed. mal.* 4. *p.* 83. *t.* 40.
Habitat in Indiis.

ANDROPOGON (*caricoſum*) ſpica ſolitaria imbricata, ſeminibus hirſutis, ariſtis nudis contortis. *Linn. ſp.* 1480.
Gramen caricoſum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 17. *t.* 7. *f.* 2.
Habitat in India.

ANDROPOGON (*contortum*) ſpica ſolitaria, floribus inferioribus muticis. *Linn. ſp.* 1480.
Ægilops maderaſpatana, glumis piloſis ariſtatis. *Scheuz. gram.* 92.
Gramen ſecalinum indicum, ſpica gracili tomentoſa, longioribus ariſtis ad ſe invicem intortis. *Plukn. alm.* 173. *t.* 191. *f.* 5. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 180. *ſ.* 8. *t.* 4. *fig. ult.*
Habitat in India.

AN-

ANDROPOGON (*ſchoenanthus*) paniculæ ſpicis conjugatis ovato-oblongis rachi pubeſcente, floſculis ſeſſilibus, ariſta tortuoſa. *Linn. ſp.* 1481. *Fl. zeyl.* 465.
Schoenanthum amboinicum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 181. *t.* 72. *f.* 2.
Juncus odoratus aromaticus. *Bauh. pin.* 11. *prodr.* 163.
Gramen Dactylon aromaticum multiplici panicula, ſpicis brevibus tomento candicantibus ex eodem pediculo binis. *Plukn. alm.* 175. *t.* 190. *f.* 1.
Gramen ad junceum accedens aromaticum majus ſyriacum. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 229. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 25.
Gramen Dactylon zeylanicum, radice tuberoſa aromatica dulci odorata. *Burm. zeyl.* 107.
β Ramacciam. *Rheed. mal.* 12. *p.* 137. *t.* 12.
Seree Javanis.
Habitat in India.

Ex hac deſtillatur *oleum Seree*, quod ad confortandum ſtomachum, cibis & condimentis gratum conciliandum odorem & ſaporem per totam Indiam adhibetur, vinumque ex *Palma ſaguero* præparatum ita conſervat, ut hac ope in alias tranſmitti poſſit regiones. *Herm. herb.*

ANDROPOGON (*dulce*) ſpica ſolitaria imbricata, floſculis muticis.
Cyperus dulcis. *Rumph. amb.* 6. *p.* 7. *t.* 3. *f.* 1.
β Gramen alopecuroides maderaſpatanum, ſpica quaſi geniculata molli. *Plukn. phyt.* 175. *t.* 190. *f.* 6.
Habitat in India.

ANDROPOGON (*Nardus*) paniculæ ramis ſupra decompoſitis proliferis. *Linn. ſp.* 1482.
Lagurus. *Linn. Fl. zeyl.* 45.
Arundo zeylanica farcta, odore & ſapore Calami aromatici. *Burm. zeyl.* 15.
Arundo indica odorata. *Grim. zeyl.* 120.
Calamus odoratus Matthioli. *Bauh. pin.* 17. *theatr.* 262.
Habitat in Zeylona.

ANDROPOGON (*faſciculatum*) ſpicis digitatis plurimis erectiuſculis articulatis lævibus; floſculis utrimque ariſtatis. *Linn. ſp.* 1483.
Andropogon majus, panicula ſparſa, ſpicis ſimplicibus utrinque ariſtatis. *Brown. jam.* 365.
Gramen Dactylon indicum, ſpicis villoſis ſubrubeſcentibus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 185. *ſ.* 8. *t.* 3. *f.* 15.
Gramen Dactylon majus, panicula longa, ſpicis plurimis nudis craſſis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 111. *t.* 69. *f.* 2.
Habitat in Indiis.

ANDROPOGON (*polydactylon*) ſpicis faſciculatis, petalis exterioribus ariſtatis, floſculis inferioribus ciliato-barbatis. *Linn. ſp.* 1483.
Gramen dactylon elatius, ſpicis plurimis tomentoſis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 111. *t.* 65. *f.* 2.
Dactylus purpureus hirſutus javanicus rompot. D. *Kleinhof.*
Habitat in Indiis.

HOLCUS (*ſpicatus*) glumis bifloris muticis, floribus geminis, penicillo involucratis, ſpica ovato-oblonga. *Linn. ſp.* 1483. ubi deſcr.
Panicum ſpica ſimplici æquali, pedunculis bifloris. *Roy. lugdb.* 54. *n.* 1.
Panicum indicum, ſpica obtuſa cærulea. *Bauh. pin.* 7. *theatr.* 522.
Gramen alopecuroides indicum maximum. *Raj. hiſt.* 1908.
Gramen paniceum ſylveſtre maximum Indiæ orientalis. *Plukn. alm.* 164. *t.* 32. *f.* 4.
Tenna. *Rheed. mal.* 12. *p.* 151. *t.* 79.

HOLCUS (*Sorghum*) glumis villoſis, ſeminibus ariſtatis. *Linn. ſp.* 1484.
Milium arundinaceum, ſubrotundo ſemine, ſorghum nominatum. *Bauh. pin.* 26. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 196. *ſ.* 8. *t.* 5. *f.* 7.
Sorgum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 194. *t.* 75. *f.* 1.
Habitat in India.

HOLCUS (*ſaccharatus*) glumis glabris, ſeminibus muticis. *Linn. ſp.* 1484.
Milium indicum, arundinaceo caule, granis flaveſcentibus. *Herm. lugdb.* 425.
Milium indicum, ſemine fuſco, juba larga. *Herm. muſ. zeyl.* 44. *Burm. zeyl.* 159.
Milium indicum ſacchariferum altiſſimum, ſemine ferrugineo. *Breyn. prodr.* 2.
Habitat in India.

HOLCUS (*latifolius*) glumis trifloris, floſculo primo inermi, duobus margine aculeatis, foliis ſubovatis. *Linn. ſp.* 1486. *Osb. it.* 247. ubi deſcr.
Habitat in India.

APLUDA (*mutica*) foliis lanceolatis, floſculis omnibus muticis. *Linn. ſp.* 1486. ubi deſcr.
Habitat in India.

APLUDA (*ariſtata*) foliis lanceolatis, floſculis maſculis muticis, ſeſſili terminali ariſtata. *Linn. ſp.* 1487.
Schoenanthus avenaceus procumbens maderaſpatenſis, Bupleuri folio. *Scheuz. gram.* 119.
Manda-poeloe herba arundinacea odorata, foliis gramineis, flore purpureo. D. *Outgaerden.*
Habitat in India.

ISCHÆ-

ISCHÆMUM (*muticum*) ſeminibus muticis. *Linn. ſp.* 1487. ubi deſcr.
Gramen arundinaceum indicum ſpicatum, ſpica ſquamoſa. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 604.
Tagadi. *Rheed. mal.* 12. *p.* 91. *t.* 49.
Habitat in Malabara.

ISCHÆMUM (*ariſtatum*) ſeminibus ariſtatis. *Linn. ſp.* 1487.
Habitat in China.

CENCHRUS (*lappaceus*) paniculæ ramis ſimpliciſſimis, corollis retrorſum hiſpidis, calycibus trivalvibus bifloris. *Linn. ſp.* 1488. ubi deſcr.
Habitat in India.

PARIETARIA (*zeylanica*) foliis oppoſitis oblongo-ovatis. *Linn. ſp.* 1492. *Fl. zeyl.* 371.
Parietaria zeylanica. *Herm. zeyl.* 30.
Habitat in Zeylona.

PARIETARIA (*indica*) foliis alternis lanceolatis integerrimis.
Herba memoriæ. *Rumph. amb.* 6. *p.* 29. *t.* 12. *f.* 2.
Rompot garang javanis, quæ floribus rubris.
β Kakarat javanis, quæ floribus albis, foliis latioribus, vix differt ab officinali, niſi fructu ſeſſili ſulcato.
Habitat in Java.

ATRIPLEX (*laciniata*) caule herbaceo, foliis deltoidibus dentatis ſubtus argenteis. *Linn. ſp.* 1494. *Roy. lugdb.* 218. *n.* 4.
Atriplex maritima lanciniata. *Bauh. pin.* 120.
Atriplex indica maritima. *D. v. Santen.*
Habitat in Europa, India, Virginia, ad littora.

ATRIPLEX (*littoralis*) caule herbaceo erecto, foliis omnibus linearibus integerrimis, (apice truncatis). *Linn. ſp.* 1494. *Roy lugdb.* 218. *n.* 3.
Allor Daun, ſajor coddak javanis. an diſtincta ab europæa.?
Habitat in Java.

ACER (*Platanus*) foliis quinquepartito-palmatis, lobis ovatis acuminatis, ſubtus tomentoſis.
Acer Platano ſimilis. *Garcin. herb.*
Habitat in India.
Platanoidi ſimilis, differt vero lobis foliorum majoribus integerrimis, vel denticulo uno & altero tomento ex cinereo ſplendente diſtinctis.

ACER (*javanicus*) foliis obovatis glaberrimis ſubtus tomentoſis, apice eroſis, nervo medio productiore acuminato.
Acer javanicus. *Garcin. herb.*
Habitat in Java.

BEGONIA (*obliqua*). *Linn. ſp.* 1497.
Begonia nivea & purpurea maxima, folio aurito. *Plum. ſp.* 21. *ic.* 45. *f.* 1.
Aceris fructu herba anomala, flore tetrapetalo albo. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 199. *t.* 127. *f.* 1. 2.
Rumex ſylveſtris ſcandens, foliis cordato-angulatis, ab altera parte majoribus. *Brown. jam.* 203.
Empetrum acetoſum. *Rumph. amb.* 5. *p.* 457. *t.* 169. *f.* 2.
Habitat in Indiis.

MIMOSA (*nodoſa*) inermis, foliis pinnatis bijugis, foliolis inferioribns minoribus, petiolo lineari. *Linn. ſp.* 1498.
Phaſeolus arboreus tetraphyllus zeylanicus. *Plukn. alm.* 294. *t.* 211. *f.* 5. *Burm. zeyl.* 192.
Habitat in Zeylona.

MIMOSA (*bigemina*) inermis, foliis bigeminis acuminatis. *Linn. ſp.* 1499. *Fl. zeyl.* 218.
Ceratiæ quodammodo affinis, majoribus & longioribus foliis ex India Orientali, fabis atro-nitentibus. *Plukn. alm.* 95.
Arbor indica ſiliquoſa, flore pentapetalo, ſiliquis in ſpicam contortis lanuginoſis. *Raj. hiſt.* 1746.
Katou-conna. *Rheed. mal.* 6. *p.* 21. *t.* 12.
Habitat in India.

MIMOSA (*cineraria*) aculeata, foliis conjugatis pinnatis: pinnis æqualibus, aculeis recurvis *Linn. ſp.* 1500.
Acacia maderaſpatana ſpinoſa Intſiæ accedens, cortice cinereo, ramis communi pediculo binis. *Plukn alm.* 4. *t.* 2. *f.* 1.
Mimoſa fruticoſa, ſpinis aduncis undique armata, cortice cinereo, foliis minutis pinnatis, ſpicis globoſis. *Brown. jam.* 252.
Habitat in Indiis.

MIMOSA (*caſta*) aculeata, foliis conjugatis pinnatis, partialibus trijugis ſubæqualibus. *Linn. ſp.* 1500.
Æſchynomene ſpinoſa latifolia, ſeu herba viva ſpinoſa latifolia, piloſo & ſubrotundo folio. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 55. *t.* 28.
Habitat in India.

MIMOSA (*ſcandens*) inermis, foliis conjugatis, cirrho terminali, foliolis bijugis. *Linn. ſp.* 1501. ubi deſcr.
Gigalobium ſcandens claviculatum. *Brown. jam.* 362.
Lens phaſeoloides, foliis ſubrotundis oppoſitis, flore ſpicato pentapetalo, lobis latiſſimis, fructu orbiculato fuſco. *Burm. zeyl.* 139.

Pha-

Phaſeolus utriuſque indiæ arboreus, alatis foliis, fructu magno cordiformi, lobis longiſſimis nodoſis, plerumque intortis. *Plukn. alm.* 295.
Faba marina. *Rumph. amb.* 5. *p.* 5. *t.* 4.
Perim-kaku-valli. *Rheed. mal.* 8. *p.* 59. *t.* 32. 33. 34.
Puſætha. *Linn. Fl. zeyl.* 644.
Habitat in Indiis.

MIMOSA (*Entada*) inermis, foliis bipinnatis cirrho terminatis, partialibus quinquejugis. *Linn. ſp.* 1502. *Fl. zeyl.* 219.
Acacia ſcandens ſpicata, ſiliquis latis. *Plum. ic.* 12.
Herba indica capreolata orobi foliis. *Raj. hiſt.* 3. *p.* 660.
Entada. *Rheed. mal.* 9. *p.* 151. *t.* 67.
Habitat in Indiis.

MIMOSA (*Lebbeck*) inermis, foliis bipinnatis quadrijugis, pinnis ovali-oblongis, floribus monadelphis faſciculatis, caule arboreo. *Linn. ſp.* 1503.
Acacia non ſpinoſa indiæ orientalis, coluteæ foliis, floribus ſtamineis amplis, ſiliqua cruſtacea gemella colorata. *Plukn. mant.* 2. *t.* 331. *f.* 1.
Catu wagghei incolis coromandeli.
Habitat in India & Ægypto.

MIMOSA (*virgata*) inermis, foliis bipinnatis, ſpicis decandris, inferioribus caſtratis maſculis, caule erecto angulato. *Linn. ſp.* 1502. *Fl. zeyl.* 505.
Mimoſa orientalis non ſpinoſa, rarioribus ramis, floribus ſpicatis. *Plukn. alm.* 252. *t.* 307. *f.* 4.
Mimoſa herba zeylanica, ſiliquis anguſtis glabris, media. *Burm. zeyl.* 160.
Nitu-todda vaddi. *Rheed. mal.* 9. *p.* 35. *t.* 20.
Habitat in India.

MIMOSA (*vaga*) inermis, foliis bipinnatis, pinnis exterioribus majoribus incurvatis pubeſcentibus. *Linn. ſp.* 1503.
Arbor ſiliquoſa braſiliana, ſiliqua tortuoſa fruteſcens, Fraxinellæ foliis. *Breyn. cent.* 1. *t.* 15.
Guabi-pocaca-biba. *Marcgr. braſ.* 111. *Piſ. braſ.* 170. ubi fig.
Habitat in Indiis.

MIMOSA (*cinerea*) ſpinis ſolitariis, foliis bipinnatis, floribus ſpicatis. *Linn. ſp.* 1505. *Fl. zeyl.* 215.
Acacia ſpinoſa ex alis ſpicata, foliis pennas avium referentibus. *Burm. zeyl.* 3. *t.* 2.
Acacia zeylanica, flore ſpicato pappoſo, colore ex albo, luteo & rubicundo eleganter variegato. *Herm. zeyl.* 24.
β. Acacia maderaſpatana minutiſſimis foliis, aculeis ferocibus alternis, frondoſa, cortice cinereo. *Plukn. alm.* 3. *t.* 121. *f.* 5.
Habitat in India.

MI-

MIMOSA (*horrida*) ſpinis ſtipularibus, longitudine foliorum, foliis bipinnatis, partialibus ſubſejugis, ramis lævibus. *Linn. ſp.* 1505.
Acacia maderaſpatenſis, foliis parvis, aculeis e regione binis prægrandibus horrida, caule cinereo. *Plukn. alm.* 3. *t.* 121. *f.* 4.
Habitat in Indiis.

MIMOSA (*tortuoſa*) ſpinis ſtipularibus, foliis bipinnatis quadrijugis, glandula inter infima, foliolis ſedecimjugis, ſpicis globoſis. *Linn. ſp.* 1505.
Mimoſa tortuoſa, aculeis rectis geminatis, foliis tenuiſſimis, ſpica globoſa, ſiliquis craſſis. *Brown. jam.* 251.
Habitat in Indiis.

MIMOSA (*cæſia*) aculeata, foliis bipinnatis, pinnis ovali-oblongis, oblique acuminatis. *Linn. ſp.* 1507. *Fl. zeyl.* 117.
Acacia zeylanica ſarmentoſa, flore luteo globoſo. *Burm. zeyl.* 3.
Acacia ſpinoſa Indiæ orientalis, foliis ſubtus cæſiis, floribus globoſis luteis. *Plukn. mant.* 1. *t.* 330. *f.* 3.
Acacia ſpinoſa, floſculis globoſis luteis. *D. Pryon.*
Habitat in India.

MIMOSA (*pennata*) aculeata, foliis bipinnatis numeroſiſſimis lineari-aceroſis, panicula aculeata, capitulis globoſis. *Linn. ſp.* 1507. *Fl. zeyl.* 216.
Acacia aculeata multiflora, foliis pennas avium referentibus. *Burm. zeyl.* 2. *t.* 1.
Acacia zeylanica elegans, Mimoſæ folio, flore albo. *Hartogh. herb.*
Acacia zeylanica, floribus rotundis albis pappoſis, in ſummitate ramulorum congeſtis. *Herm. zeyl.* 29.
Habitat in Zeylona.

MIMOSA (*Intſia*) aculeata, foliis bipinnatis, pinnis incurvis, caule angulato. *Linn. ſp.* 1508.
Acacia maderaſpatana ſpinoſa, pennis veluti lunulatis, nervo pinnularum ad unicum latus vergente. *Plukn. alm.* 4. *t.* 122. *f.* 2.
Intsjia. *Rheed. mal.* 6. *p.* 7. *t.* 4.
Habitat in India.

DIOECIA.

GLEDITSIA (*inermis*). *Linn. ſp.* 1509. *Duham arb.* 1. *p.* 266.
Acacia javanica non ſpinoſa, foliis maximis ſplendentibus. *Plukn. alm.* 6. *t.* 123. *f.* 3.
Acacia americana non ſpinoſa flore purpureo, ſtaminibus longiſſimis, ſiliquis planis villoſis. *Mill. ic. t.* 5.
Habitat in Java.

PISONIA (*mitis*) inermis. *Linn. ſp.* 1511.
Piſonia malabarica non ſpinoſa. *Amm. herb.* 582.
Katu kara-walli. *Rheed. mal.* 7. *p.* 33. *t.* 17.
Habitat in Malabara.

PA-

PANAX (*fruticoſum*) foliis ſupradecompoſitis dentato-ciliatis, caule fruticoſo. *Linn. ſp.* 1513. ubi deſcr.
Scutellaria tertia. *Rumph. amb.* 4. *p.* 78. *t.* 33.
Petroſelinum indicum Papida Papua Javanis dictum. D. *Kleinhof.*
Habitat in Java & Moluccis.

Foliatura mire ludit. *Flos* ſuperus. *Cal.* quinquedentatus. *Cor.* petala oblonga quinque. *Stam.* quinque. *Stili* duo. *Fruct.* diſpermus, quibus ab *Aralia* differre videtur.

POLYOECIA.

FICUS (*Sycomorus*) foliis cordatis ſubrotundis integerrimis. *Linn. ſp.* 1513. *Roy. lugdb.* 211. *n.* 2.
Ficus folio mori, fructum in caudice ferens. *Bauh. pin.* 459.
Ficus indica, Tiliæ folio ſubtus albo & villoſo polyrhizos. *Plukn. phyt.* 144. *t.* 178. *f.* 3.
Sycomorus. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 124. *f.* 1. 2.
Sycomorus, Ficus Pharaonis. *Cam. matth.* 103. *f.* 3.
Habitat in India & Ægypto.

FICUS (*religioſa*) foliis cordatis oblongis integerrimis acuminatis. *Linn. ſp.* 1513. *Fl. zeyl.* 372.
Ficus malabarienſis, folio cuſpidato, fructu rotundo parvo gemino. *Plukn. alm.* 144. *t.* 178. *f.* 2.
Arbor zeylanica religioſa, foliis perpetuo mobilibus. *Burm. zeyl.* 29.
Arealu. *Rheed. mal.* 1. *p.* 47. *t.* 27.
β Arbor conciliorum. *Rumph. amb.* 3. *p.* 142. *t.* 91.
Antsjac Javanis.
Habitat in India.

FICUS (*benghalenſis*) foliis ovatis integerrimis obtuſis, caule inferne radicato. *Linn. ſp.* 1514. *Roy. lugdb.* 212. *n.* 4. *Trew. ehret. t.* 50.
Ficus benghalenſis, folio ſubrotundo, fructu orbiculato. *Commel. H. Amſt.* 1. *p.* 119. *t.* 62.
Ficus americana, latiore folio venoſo. *Plukn. phyt.* 144. *t.* 178. *f.* 1.
Habitat in Benghala & Malabara.

FICUS (*indica*) foliis lanceolatis integerrimis petiolatis, pedunculis aggregatis, ramis radicantibus. *Linn. ſp.* 1514.
Ficus indica, foliis mali cotoneæ ſimilibus, fructu ficubus ſimili. *Bauh. pin.* 457.
Ficus indica Theophraſti. *Tabern. hiſt.* 1370.
Katou-alou. *Rheed. mal.* 3. *p.* 73. *t.* 57.

β Ficus foliis lanceolatis integerrimis. *Roy. lugdb.* 212. *n.* 3.
Varinga latifolia. *Rumph. amb.* 3. *p.* 127. *t.* 84.
Tſiela. *Rheed. mal.* 3. *p.* 85. *t.* 63.
Habitat in Indiis.

FICUS (*racemoſa*) foliis ovatis acutis integerrimis, caule arboreo, fructu racemoſo. *Linn. ſp.* 1515.
Groſſularia domeſtica. *Rumph. amb.* 3. *p.* 136. *t.* 87. 88.
Alty-alu. *Rheed. mal.* 1. *p.* 43. *t.* 25.
Habitat in India.

FICUS (*pumila*) foliis ovatis acutis integerrimis, caule repente. *Linn. ſp.* 1515.
Ficus ſylveſtris procumbens, folio ſimplici. *Kæmpf. amoen.* 803. *t.* 804.
Varinga repens. *Rumph. amb.* 3. *p.* 134. *t.* 85.
Habitat in Amboina & Japonia.

FICUS (*ſeptica*) caule erecto, foliis ovatis acuminatis integerrimis, fructu ſolitario.
Ficus ſeptica. *Rumph. amb.* 3. *p.* 153. *t.* 96.
Handur-alu. *Rheed. mal.* 3. *p.* 77. *t.* 59.
Siri Bipar Javanis.
Habitat in India.

FICUS (*pyrifolia*) foliis ovatis acuminatis, margine ciliatis.
Ficus folio pyri ex Japan. D. *Kleinhof.*
Habitat in Japonia.

FICUS (*ampelos*) foliis ovato-oblongis integerrimis ſcabris, fructu parvo uvæformi.
Folium politorium. *Rumph. amb.* 4. *p.* 128. *t.* 63.
Tregam. *Rheed. mal.* 3. *p.* 79. *t.* 60.
Habitat in India.

FICUS (*montana*) foliis oblongis repando-ſerratis, fructu minimo.
Frutex montanus javanicus ſeu mori parvi montani, folio oblongo ſerrato. D. *Kleinhof.*
Habitat in India.

FICUS (*padana*) foliis cordato-ovatis ſubdenticulatis ſubtus tomentoſis, fructu rotundo villoſo.
Ficus Sumatrenſis venenatiſſima, fructus ferens rotundos villoſiſſimos. *Garcin. herb.* ubi notatur: omnium venenatiſſima, inventa in pago Padano prope Sumatram.

Folia pedalia magnitudine *Ficus benghalenſis.*

FI-

FICUS (*Tsjakela*) foliis ovato-oblongis integerrimis & crenatis.
Ficus ſurattenſis & β malabarica, mori folio. *Garcin. herb.*
Tsjakela. *Rheed. mal.* 3. *p.* 87. *t.* 64.
Habitat in Malabara.

FICUS (*groſſularioides*) foliis petiolatis ovatis baſi integris apice ſerratis, ſubtus e luteo albicantibus.
Ficus ſurattenſis, Groſſulariæ fructu flavo ac venenato. *Garcin. herb.*
β Valli-teregam. *Rheed. mal.* 3. *p.* 83. *t.* 62. quæ differt petiolis breviſſimis, qui in Garcini ſpecimine longitudine foliorum.
Habitat in Suratta.

CRYPTOGAMIA FILICES.

ONOCLEA (*ſenſibilis*). *Linn. ſp.* 1517.
Angiopteris. *Michel. gen.* 29.
Filix mariana Oſmundæ facie racemifera. *Plukn. mant.* 80. *t.* 204. *f.* 2.
Filix indica, Oſmundæ facie. *Breyn. cent.* 58. *t.* 56. *n.* 7.
Polypodium virginianum majus, Oſmundæ facie, tenerius. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 563. *ſ.* 14. *t.* 2. *f.* 10.
Filix indica, polypodii facie. *Mentz. pug.* 6. *t.* 10.
Habitat in utraque India.

OPHIOGLOSSUM (*pendulum*) frondibus linearibus longiſſimis indiviſis. *Linn. ſp.* 1518.
Scolopendria major. *Rumph. amb.* 6. *p.* 64. *t.* 37. *f.* 3.
Dependet ex arboribus in India.

OPHIOGLOSSUM (*ſcandens*) caule flexuoſo tereti, frondibus conjugatis pinnatis, foliolis utrinque ſpiciferis. *Linn. ſp.* 1518. *Fl. zeyl.* 374.
Filix ſcandens pulchra braſiliana. *Breyn cent.* 186. *t.* 96. *Petiv. t.* 64. *f.* 11.
Lonchitis ſcandens braſiliana, pinnulis eleganter laciniatis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 568. *ſ.* 14. *t.* 3. *f.* 15.
Adianthum volubile. *Rumph. amb.* 6. *p* 75. *t.* 32. *f.* 3.
Tſieru valli panna. *Rheed. mal.* 12. *p.* 65. *t.* 33.
β Ejus varietas eſt foliolis cordatis, ſpicis brevioribus.

OPHIOGLOSSUM (*flexuoſum*) caule flexuoſo angulato, frondibus diphyllis, pinnis trifido-palmatis. *Linn. ſp.* 1519. *Fl. zeyl.* 375.
Adianthum volubile majus. *Rumph. amb.* 6. *p.* 75. *t.* 32. *f.* 2.
Valli-panna. *Rheed. mal.* 12. *p.* 63. *t.* 32. cujus varietas: Adianthum folio vario *herb. Garcin.* quod differt frondibus bi & triphyllis anguſtioribus integerrimis.
Habitat in Malabara.

OPHIOGLOSSUM (*pedatum*) caule flexuoſo anguloſo, fronde pedata. *Tab.* 66. *f.* 1.
Filix ſcandens, foliis tripartitis. *D. Pryon.*
Habitat in Java.

OPHIOGLOSSUM (*circinnatum*) caule flexuoſo tereti, frondibus tri & tetraphyllis, pinnis lanceolatis glaberrimis ſtriatis.
Adianthum volubile polypoides. *Rumph. amb.* 6. *p.* 76. *t.* 33. *Petiv. gaz.* *t.* 64. *f.* 10.
Filix ſcandens, foliis conjugatis trifidis ſtriatis non ſerratis. *D. Pryon.*
Habitat in Amboina & Java.

Var: frondibus infimis geminis bi & tripartitis, mediis pinnes bijugis abſque impari, ſummis cum impari, quod inter hoc & flexuoſum locum mereri videtur.

OPHIOGLOSSUM (*vulgatum*) fronde ovata. *Linn. ſp.* 1518.
Ophiogloſſum vulgatum. *Bauh pin.* 354. *Plum. fil.* 35. *B. f.* 5.
Ophiogloſſum ſimplex. *Rumph. amb.* 6. *p.* 152. *t.* 68. *f.* 2.
Habitat in Europa & utraque India.

OSMUNDA (*zeylanica*) ſcapo caulino ſolitario, frondibus verticillatis lanceolatis indiviſis. *Linn. ſp.* 1519. *Fl. zeyl.* 273. ubi deſcr.
Oſmunda javanica. *Garcin. herb.*
Ophiogloſſum laciniatum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 153. *t.* 68. *f.* 3.
Habitat in Zeylona, Amboina, & Java.

ACROSTICUM (*lanceolatum*) frondibus lineari-lanceolatis, ſurculo ſcandente. *Linn. ſp.* 1523. *Fl. zeyl.* 380.
Phyllitis malabarica, foliis anguſtis, marginibus piloſis. *Petiv.* 3. *t.* 54. *f.* 8.
Tiri-panna. *Rheed. mal.* 12. *p.* 141. *t.* 74.
Paraſitica ex java, kakajar Lacki Lacki dicta. *D. v. Santen.*
Habitat in Indiæ arboribus putridis & ſaxis petroſis.

ACROSTICUM (*pectinatum*) nudum ſimpliciſſimum, ſpica ovata ſecunda adſcendente reflexa compreſſa. *Linn. ſp.* 1524. *Amoen. acad.* 1. *p.* 144. *f.* 4. & 5.
Juncus elegantiſſimus, capitulis pectinatis. *Plukn. alm.* 200. *t.* 95. *f.* 7.
Juncus africanus, pectinato capite. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 233. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 30.
Habitat in Africa & Zeylona.

ACROSTICUM (*longifolium*) frondibus lanceolatis obtuſiuſculis integerrimis, ſurculo reptante.
Aſplenium anguſtifolium e medio ad apicem ſeminiferum. *Petiv. gaz.* 310. *t.* 61. *f.* 2. & 4.
Filix reptans, folio ſolitario integro, ad Polypodium accedens. *D. Pryon.*
Habitat in Java.

ACROSTICUM (*heterophyllum*) frondibus integerrimis glabris petiolatis, ſterilibus ſubrotundis, fertilibus linearibus. *Linn. ſp.* 1523. *Fl. zeyl.* 378. *Amoen. acad.* 1. *p.* 148. *t.* 160. *f.* 2.
Filix malabarica. *Petiv. gazoph. t.* 53. *f.* 12.
Muſcus zeylanicus arboreus clavatus, foliis craſſis rotundis Lycopodii, fructu compreſſo. *Herm. zeyl.* 38.

Phyl-



1. *OPHIOGLOSSUM pedatum.*
2. *POLYPODIUM trapezioides.*
3. ———————— *radicans*
4. *ADIANTHUM truncatum.*



1. OPHIOGLOSSUM *pedatum*.
2. POLYPODIUM *trapezioides*.
3. ——————— *radicans*
4. ADIANTHUM *truncatum*.

Phyllitis repens ſcandenſve, foliis duplicibus, aliis latis & ſubrotundis, aliis longis & anguſtis. *Raj. hiſt. app.* 13.
Maretla-mala-maravara. *Rheed. mal.* 12. *p.* 57. *t.* 29.
Planta paraſitica, quæ foliis oblongatis ſuperiorem arboris partem adſcendit. *D. van Santen.*
Habitat in Zeylona, Malabara, Java.

ACROSTICUM (*punctatum*) frondibus cordato-lingulatis acuminatis integerrimis ſupra punctatis. *Linn. ſp.* 1524. ubi deſcr.
Habitat in China.

ACROSTICUM (*dichotomum*) nudum dichotomum, ſpicis ſecundis adſcendentibus reflexis compreſſis. *Linn. ſp.* 1524.
Filix Cochine. *Pet. gazoph. t.* 70. *f.* 12.
Habitat in China.

ACROSTICUM (*digitatum*) ſtipitibus nudis triquetris, fronde digitata lineari integerrima æquali. *Linn. ſp.* 1524. *Fl. zeyl.* 379. *Amoen. acad.* 1. *p.* 260. *f.* 1.
Planta pluribus foliis triquetris inſtar graminis cyperini ſummitate foliorum in plurima foliola biuncialia diviſis. *Herm. zeyl.* 27. *Burm. zeyl.* 194.
Habitat in Zeylona.

ACROSTICUM (*ſiliquoſum*) frondibus pinnatis; pinnis alternis ſurſum pinnulatis linearibus: inferioribus bipartitis. *Linn. ſp.* 1527. *Fl. zeyl.* 376. *Amoen. acad.* 1. *p.* 155. *t.* 160. *f.* 3.
Acroſticum maderaſpatanum, foliis laciniatis. *Petiv. muſ.* 741. *Raj. hiſt. app.* 72.
Filicis humilis ſpecies, ſegmentis longis & anguſtis. *Burm. zeyl.* 98.
Filix montana Javanica *D. Kleinhof.* cujus pinnæ denticulatæ.
Millefolium aquaticum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 176. *t.* 74. *f.* 1.
Planta ſiliquoſa bivalvis unicapſularis, ſiliquis in plurimos ramulos foliatos diffuſis, Crithmi marini ſegmenta quodammodo mentientibus. *Plukn. alm.* 298. *t.* 215. *f.* 3.
Habitat in Indiæ paludoſis.

ACROSTICUM (*thalictroides*) frondibus pinnatis, pinnis alternis utrinque pinnatifidis, ſterilibus latioribus. *Linn. ſp.* 1527. *Fl. zeyl.* 377. *t.* 4.
Thalictrum zeylanicum aquaticum. *Herm. zeyl.* 26. *Burm. zeyl.* 222.
Habitat in Zeylonæ aquoſis.

Javanicæ *frondes* exteriores ſteriles latiores, & magis diviſæ quam in icone *Fl. zeyl:* ex radice erigitur *ſcapus* ſimplex, longitudine frondis; frondibus fertilibus pinnatis linearibus infra fructificationem, quæ inrorta ut in *Acroſtico dichotomo.*

PTERIS (*piloſelloides*) frondibus ſterilibus obovatis, fertilibus lanceolatis longioribus, ſurculis reptantibus. *Linn. ſp.* 1530.
Habitat in India.

Adfinis *Acroſtico heterophyllo*, ſed folia obovalia, magis oblonga.

PTERIS (*grandifolia*) frondibus pinnatis: pinnis oppoſitis ovato-linearibus acuminatis integerrimis. *Linn. ſp.* 1531.
Phyllitis ramoſa ad margines pulverulenta. *Petiv. filic.* 127. *t.* 6. *f.* 15.
Lingua cervina latifolia, membrana tenui marginata. *Plum. filic.* 88. *t.* 106. *amer.* 6. *t.* 8.
Filix pinnis integris glabris non ſerratis oppoſitis, caule hirſuto *D. Pryon.*
Habitat in Indiis.

PTERIS (*vittata*) frondibus pinnatis, pinnis linearibus rectis, baſi rotundatis. *Linn. ſp.* 1532. *Osb. it. t.* 4.
Pteris ſimplex aſſurgens, foliis longioribus lanceolatis, petiolis brevibus. *Brown. jam.* 90.
Filix odorata luzonica. *Petiv. gazoph. t.* 63. *f.* 10.
Lonchitis major, pinnis longis anguſtiſſimisque. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 79. *t.* 34.
Filix non ramoſa, foliis pinnatis glaberrimis nervoſis læte virentibus. *D. Pryon*
Habitat in Indiis & China.

PTERIS (*pedata*) frondibus quinquangulis trifoliatis, pinnis pinnatifidis, lateralibus bipartitis. *Linn. ſp.* 1532.
Hemionitis profunde laciniata ad oras pulverulenta. *Plum. amer.* 24. *t.* 34. *Fil.* 130. *t.* 152.
Filix marginifera, Geranii folio. *Petiv. Filic.* 176. *t.* 8. *f.* 12.
Filix indica profunde laciniata. *D. Pryon.*
Habitat in Indiis.

PTERIS (*enſiformis*) fronde pinnata, pinnis ſuperioribus enſiformibus ſub-integerrimis, inferioribus oppoſitis ovatis auriculatis ſerratis.
Filix fronde pinnata, pinnis enſiformibus ſerratis, inferioribus oppoſitis inferne folio longo auctis. *Linn. Fl. zeyl.* 199.
Polypodium caule ſimplici, foliis ſimplicibus variis longis ſerratis. *Burm. zeyl.* 196. *t.* 87.
Filix pinnulis ſuperius anguſtis integris vix ſerratis, inferius ſerratis, & varie partitis. *D. Pryon.*
β Filicula cheuſamica, ſeu Hemionitis multifido folio tenuiſſime ſerrato, ad margines ſeminifero. *Plukn. amalth.* 94. *t.* 407. *f.* 2.
Habitat in Zeylona & Java.

PTERIS (*ſemipinnata*) frondibus ſubbipinnatis, foliolis lateralibus, loboque infimo ſemipinnatifidis. *Linn. ſp.* 1534. *Osb. it. t.* 3. *f.* 1. ubi deſcr.
Habitat in China.

BLECH-

BLECHNUM (*indicum*) frondibus pinnatis, pinnis alternis lanceolatis ſerratis, baſi auriculatis.
Filix Lonchitidis facie, alis denticulatis dupliciter auriculatis. *D. Pryon.*
Habitat in Java.
Differt ab occidentali; *pinnis* alternis brevioribus inferius auriculatis, ſuperius ſerrulatis.

BLECHNUM (*orientale*) frondibus pinnatis, pinnis linearibus alternis. *Linn. ſp.* 1535. ubi deſcr.
Habitat in China.

HEMIONITIS (*paraſitica*) frondibus ovatis acuminatis, ſurculis paleaceis repentibus. *Linn. ſp.* 1535.
Hemionitis paraſitica repens, foliis ovato acuminatis. *Brown. jam.* 95.
Filix folio ſolitario integro lato, caule repente. *D. Pryon.*
Phyllitis lineis maculata. *Petiv. Filic.* 9. *t.* 10. *f.* 3.
Habitat in Indiis.

ASPLENIUM (*nidus*) frondibus ſimplicibus lanceolatis integerrimis glabris. *Linn. ſp.* 1537. ubi deſcr.
Scolopendria Indiæ orientalis, Muſæ facie. *Breyn. cent.* 129. *t.* 99.
Phyllitis indica maxima, latiſſimis foliis planis, Muſæ facie. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 558. *ſ.* 14. *t.* 1. *f.* 15.
Habitat in Javæ ſummis arboribus.

ASPLENIUM (*arifolium*) frondibus ſimplicibus ovatis auriculatis ſinuoſis.
Aſplenium Luſonicum, ari folio. *Petiv. gaz. t.* 50. *f.* 12.
Patitsjivi-maravara. *Rheed. mal.* 12. *p.* 21. *t.* 10.
Habitat in India.
Javanicæ folia minus auriculata quam in *Petiverii* figura.

POLYPODIUM (*quercifolium*) frondibus ſterilibus brevioribus obtuſis ſinuatis; fructificantibus alternis pinnatis lanceolatis. *Linn. ſp.* 1547. *Fl. zeyl.* 382. *Hill. anat. t.* 10.
Polypodium exoticum, folio quercus. *Bauh. pin.* 359. *Burm. zeyl.* 195. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 564. *ſ.* 14. *t.* 2. *f.* 15.
Polypodium malabaricum, foliis biformibus. *Petiv. muſ.* 704. *Raj. ſuppl.* 57.
Polypodium indicum. *Cluſ. exot.* 88. *t.* 89. *Rumph. amb.* 6. *p.* 78. *t.* 36.
Panna-kelengo-marava. *Rheed. mal.* 12. *p.* 23. *t.* 11.
Habitat in India.

POLYPODIUM (*laciniatum*) frondibus pinnatifidis, laciniis inæqualibus.
Elettadi maravara. *Rheed. mal.* 12. *p.* 41. *t.* 20. 21.
Kakajar ſeu Tally kaffa Javanis.
Habitat in Java & Malabara.
In Javanica foliorum foramina non obſervantur.

PO-

POLYPODIUM (*ſcolopendria*) frondibus lanceolatis integris trilobis & quinquelobis, ſurculo repente.
Polypodium vario modo diviſum acutum & obtuſum. *Burm. zeyl.* 196. *t.* 86.
Polypodium indicum, ſcolopendriæ facie. *Breyn. cent.* 190. *t.* 98. *f.* 1. 2. 3.
Phyllitis indica, foliis mucronatis & obtuſioribus. *Moriſ. hiſt.* 3. *ſ.* 14. *t.* 1. *f.* 17.
Filix Hemionitis trifida & quinquefida, bullatis foliis, forte de genere Polypodii. *Plukn. mant.* 82. & *amalth.* 94. *phyt. t.* 404. *f.* 1. & 5.
Filix læte viridis, foliis glabris punctatis trifidis & quinquefidis malaice ſimbar minganang; javanice daun ſambang. *D. Pryon.*
Habitat in India.

POLYPODIUM (*unitum*) frondibus pinnatis, pinnis enſiformibus ſerratis, ſerraturis ſemiovatis ovato-nervoſis. *Linn. ſp.* 1548.
Filix zeylanica denticulata non ramoſa. *Burm. zeyl.* 98. *t.* 44. *f.* 1.
Filix pyramidalis maderaſpatana elegans, pinnulis ſerratis. *Petiv. muſ.* 10. *t.* 1. *f.* 55.
Filix bermudienſis non ramoſa petræa, pinnis acutioribus planis, hirſutie pubeſcentibus. *Plukn. phyt.* 244. *f.* 1. & *t.* 403. *f.* 1.
Filix non ramoſa major, ſurculis raris brevioribus pinnulis, crebris latis brevibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 90. *t.* 48.
Habitat in Indiis.

POLYPODIUM (*acutum*) fronde pinnata, pinnis enſiformibus lanceolatis ſerratis, baſi ſurſum angulatis. *Linn. Fl. zeyl.* 200.
Filix zeylanica, foliis integris in margine leviter dentatis. *Burm. zeyl.* 98.
Filix non ramoſa, pinnatis foliis integris ſerratis, ad baſin apophyſi parvo dentatis, ſubtus duplici ordine punctorum ferrugineorum agminatim inſignitis. *Plukn. alm.* 154. *t.* 285. *f.* 1.
Habitat in Zeylona.

POLYPODIUM (*auriculatum*) frondibus pinnatis, pinnis falcato-lanceolatis ſerratis: baſi truncatis ſurſum auritis. *Linn. ſp.* 1548. *Fl. zeyl.* 383.
Filix zeylanica Lonchitidis facie. *Breyn. cent.* 189. *t.* 44. *f.* 2. *Burm. zeyl.* 98. *t.* 44. *f.* 2.
Filix ſ. Lonchitis aſpera maxima indorum, *Plukn. alm.* 152. *t.* 30. *f.* 4.
Lonchitis aſpera zeylanica, alis falcatis leviſſime denticulatis & ſuperiore latere auriculatis. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 566.
Filix ſuperiore parte foliorum auriculata, caule hirſuto. *D. Pryon.*
β Adianthum. ſ. Trichomanes. Bermudenſe maximum, ſerratis foliis, auriculatum. *Plukn. phyt.* 9. *t.* 125. *f.* 1.
Filicifolia altera auriculata minor. *D. Pryon.*
Habitat in Java.

PO-

POLYPODIUM (*trapezioides*) frondibus pinnatis, pinnis oppoſitis ovatis denticulatis glabris, impari lanceolata longiſſima. *Tab.* 66. *f.* 2.

β Trichomanes majus nigrum, pinnis leviter dentatis Trapezii figura. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 35. *f.* 2. quæ foliis alternis.

Habitat in Java.

Habitu & magnitudine naturali depicta eſt.

POLYPODIUM (*radicans*) fronde pinnata radicante, pinnis oppoſitis ſubovatis obtuſis, ſuperiori latere latioribus. *Tab.* 66. *f.* 3.

Filix ſcandens, pinnulis auriculatis obtuſioribus. *D. Pryon.*

Filix zeylanica, foliis auriculatis brevibus obtuſis. *Burm. zeyl.* 98.

Habitat in Java.

Caul. radicantes ſcandentes, *frons* pinnata ſeſquipalmaris, *pinnulis* ovato-obtuſis lateri ſuperiori productis glabris integerrimis.

POLYPODIUM (*ſimile*) frondibus pinnatis, pinnis lanceolatis integerrimis diſtantibus, ſupremis minoribus punctis ſerialibus. *Linn. ſp.* 1549.

Lonchitis altiſſima, pinnis raris non laciniatis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 77. *t.* 32.

Polypodium javanicum, Pakku beſaer incolis dictum. *D. Kleinhof.*

Habitat in Indiis.

POLYPODIUM (*diſſimile*) frondibus pinnatis: pinnis lanceolatis ſubpubeſcentibus confluentibus: inferioribus diſtinctis, punctis ſparſis. *Linn. ſp.* 1549.

Filix jamaicenſis jaceæ majoris æmula, falcatis foliis integris, margine æquali. *Plukn. alm.* 154. *t.* 288. *f.* 1.

Filix pinnulis irregularibus, folio unico profunde inciſo diſſimilis. *D. Pryon.* Pakku Bezoar Javanis.

Polypodium indicum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 78. *t.* 35. *f.* 2.

Welli-panna-kelengu. *Rheed. mal.* 12. *p.* 25. *t.* 12. 13.

β Filix africana Polypodii facie. *Plukn. phyt. t.* 179. *f.* 1. & 400. *f.* 2. cum quibus quædam javanica ſpecimina conveniunt, quæ pinnarum figura & decurſu in hac ſpecie valde differunt.

POLYPODIUM (*ovatum*) fronde ovata petiolata alterna, laciniis oblongis integerrimis.

β Polypodium minus, foliis integris & ſerratis. *Petiv. Fil.* 38. *t.* 14. *f.* 2. quæ lanceolata, cum javanica ſit ovata, laciniis ad apicem productis.

Habitat in Java.

POLYPODIUM (*ſpinuloſum*) cauleſcens, frondibus petiolatis pinnatifido-trifidis, apice bifida ſpinoſa. *Tab.* 67. *f.* 1.

Polypodium indicum, foliis vario modo laciniatis, apice ſpiniferis ex Java.

POLYPODIUM (*paraſiticum*) frondibus ſemibipinnatis lanceolatis: lobulis rotundatis integerrimis ſtriatis. *Linn. ſp.* 1551.
Filix mas vulgari ſimilis, pinnulis amplioribus planis nec crenatis, virginica. *Plukn. alm.* 151. *t.* 179. *f.* 2.
Kari-welli panna. *Rheed. mal.* 12. *p.* 35. *t.* 17.
Paraſitica ſupra arbores in India habitat.

POLYPODIUM (*varium*) frondibus lateribus bipinnatis, foliolo infimo pinnatifido. *Linn. ſp.* 1551.
Filix ramoſa major, pinnulis anguſtis obtuſis non dentatis, impari ſurculum terminante longiſſima. *Plukn. mant.* 83. *t.* 401. *f.* 1? cum qua javanica convenit.
Habitat in China & Java.

POLYPODIUM (*decuſſatum*) frondibus bipinnatis, pinnis horizontalibus integerrimis obtuſis terminalibus lanceolatis. *Linn. ſp.* 1555.
Filix taxi foliis major & minor. *Petiv. filic.* 61. 62. *t.* 2. *f.* 5. 6.
Habitat in India.

POLYPODIUM (*ſpelunca*) foliis ſupra decompoſitis piloſis: foliatis lanceolatis pinnatis: pinnis oppoſitis pinnatifidis. *Linn. ſp.* 1555. *Fl. zeyl.* 384.
Filix zeylanica ramoſa denticulata. *Burm. zeyl.* 98.
Filix bermudenſis elegans ramoſa, pinnis rarioribus profunde dentatis, ſpeluncæ rupium innaſcens, cauliculis muſcoſa lanugine obductis. *Plukn. alm.* 155. *t.* 244. *f.* 2.
Habitat in Indiis.

POLYPODIUM (*paluſtre*) fronde pinnata, pinnis lanceolato-enſiformibus integris ſtriatis ſetaceo-ſerratis (alternis). *Linn. Fl. zeyl.* 200.
Filix non ramoſa altiſſima paluſtris, pinnis integris ſerratis alternis acutis. *Burm. zeyl.* 100. *t.* 46.
Filix non ramoſa, foliis integris ſerratis, zeylanica. *Breyn. cent.* 188.
β Filix jamaicenſis, pinnatis Fraxini foliis crenatis, apicibus mucronatis. *Plukn. alm.* 153. *t.* 286. *f.* 3.
Panna-valli. *Rheed. mal* 12. *p.* 69. *t.* 35. Daun-Peekou Javanis.
Habitat in Indiis.

POLYPODIUM (*adianthoides*) fronde bipinnata, pinnis ovatis inciſis denticulatis glaberrimis lineatis, inferioribus oppoſitis ſuperioribus alternis decurrentibus.
Filix auriculata, ſerris bifidis. *Petiv. filic.* 69. *t.* 2. *f.* 9.
Filix non ramoſa, foliis adianthi in modum ſerrato-dentatis, pinnis alternis in infima parte oppoſitis. *D. Pryon.*
Habitat in Indiis.

PO-



1. POLYPODIUM *spinuloſum*.
2. ———— *lineare*.



1. POLYPODIUM *spinulosum*.
2. ——— *lineare*.

POLYPODIUM (*glabrum*) fronde pinnata, pinnis oppoſitis lanceolatis ſtriatis glabris integerrimis.

Polypodium glabrum javanicum, foliis oblongis Pokke-utan Javanis. *D. Pryon.*

Filix non ramoſa, foliis integris non ſerratis, zeylanica minor. *Burm. zeyl.* 100. *Breyn cent.* 188.

Habitat in Java, Zeylona.

Sub nomine malaico *Poetetet* ex Java miſſa fuit varietas: *foliis* alternis ovato-lanceolatis nigricantibus ſubtus tomentoſis, *caule* e viridi lanato.

POLYPODIUM (*roſtratum*) fronde bipinnata, pinnis alternis horizontalibus, pinnulis lanceolatis obtuſis reclinatis lineatis glaberrimis, ſummis ſimplicibus.

Filix non ramoſa Inſulæ Joannæ, pinnulis ſubrotundis planis & roſtratis. *Plukn. mant* 80. *t.* 399. *f.* 4.

Filix ramoſa, pinnis alternis craſſis, inferius profunde dentatis, ſuperius integris. *D. Pryon.*

Habitat in India.

Affinis *Polypodio decuſſato*, at *pinnæ* alternæ.

POLYPODIUM (*lineare*) fronde pinnis geminis, pinnulis oppoſitis, baſi dilatatis connatis, linearibus ſtriatis integerrimis. *Tab.* 67. *f.* 2.

Filix fronde ramoſa, foliis conjugatis, foliolis pinnatifidis, pinnis linearibus integerrimis coadunatis. *Linn. Fl. zeyl.* 201.

Filix ramoſa zeylanica, diviſuris integris noſtrate anguſtioribus ſemel aut bis diſſectis. *Burm. zeyl.* 97. Pakoe-hantam Javanis.

Habitat in Java.

Pinnæ geminæ divergentes, *pinnulæ* horizontales exteriores pollicares, interiores ad pinnarum diviſuram breviſſimæ, integerrimæ acutæ.

POLYPODIUM (*ſimplex*) frondibus ſimplicibus lanceolatis alternis glabris integerrimis.

Lonchitis amboinica rubra. *Rumph. amb.* 6. *p.* 70. *t.* 30. *f.* 1.

Filix non ramoſa, foliis integris alternis ex Java. D *Kleinhof.*

Habitat in Amboina.

ADIANTHUM (*truncatum*) fronde ſimplici, pinnis alternis triangulari-cuneiformibus ſublunulatis, angulis ſpinuloſis. *Tab.* 66. *f.* 4.

Adianthum indicum, foliis irregulariter triangulis ex Java. *D. Kleinhof.*

Habitat in India.

Stipes glaber ſulcatus anguloſus. *Foliola* alterna triangularia, angulo acutiori frondi accreta, margine inferiori concava ſuperiori gibba, media truncata, angulis ſuperioribus ſpinuloſis, glaberrima, nervo ſimplici.

ADIANTHUM (*lunulatum*) fronde ſimplici, pinnis alternis petiolatis lunulatis ſtriatis, margine quinquefido multifloro.

Capillaris malabarica non ramoſa, folio rotundo dentato. *Petiv. gazoph. t.* 54. *f.* 10.

Avenka. *Rheed. mal.* 12. *p.* 72. *t.* 40.

Habitat in Malabara & Java, unde miſſa.

ADIANTHUM (*flabellulatum*) frondibus decompoſitis; pinnis alternis rhombeis rotundatis multifloris, ſtipitibus ſupra bupeſcentibus. *Linn. ſp.* 1557.
Adianthum chinenſe perelegans ramoſum, folio flabelliformi cum rubedine perfuſo. *Plukn. alm.* 11. *t.* 4. *f.* 3.
Adianthum coriandri folio ramoſum. *Raj hiſt.* 1853.
Habitat in China.

ADIANTHUM (*chuſanum*) frondibus decompoſitis, pinnis alternatis pinnatifidis; lobis inæqualibus. *Linn. ſp.* 1558. ubi deſcr.
Habitat in China.

ADIANTHUM (*chinenſe*) frondibus decompoſitis, pinnis alternis, pinnulis pinnatifidis, lobis bifidis obtuſis.
Adianthum nigrum chinenſe tenuiter diviſum, pinnis minimis obtuſis plerumque bifidis. *Plukn. phyt.* 10. *t.* 4. *f.* 1. *Raj. hiſt.* 1854.
E china; abſque nomine in *herb. Petiverii* occurrit.

ADIANTHUM (*denticulatum*) frondibus decompoſitis, pinnis alternis, lobis inferioribus pinnatifidis, ſuperioribus lanceolatis denticulatis.
Filix mas non ramoſa, pinnulis anguſtis rarioribus profunde dentatis. *Plukn. phyt.* 151. *t.* 180. *f.* 4.
Filix, foliis alternis denticulatis, ſuperius læte viridis & glabra, inferius ſeu averſa pinnæ parte fuſca. *D. Pryon.* miſſa ex Java.

Javanica differt a *Plukn.* figura: pinnis longioribus, pinna inferiori, quæ ad alam folii, ſemper pinnatifida, denticulis triangularibus ſetaceo-ſpinuloſis fructificantibus.

TRICHOMANES (*polypoides*) frondibus lanceolatis pinnatifidis repandis, floribus ſolitariis terminalibus. *Linn. ſp.* 1568. ubi deſcr.
Habitat in India.

TRICHOMANES (*adianthoides*) frondibus pinnatis: pinnis enſiformibus acuminatis inciſo-ſerratis, ſerraturis bifidis. *Linn. ſp.* 1561.
Filix non ramoſa zeylanica, foliis Adianthi in modum ſerratis. *Burm. zeyl.* 97. *t.* 43.
Adianthum africanum Rutæ murariæ æmulum, ſegmentis longioribus acutis. *Plukn. alm.* 10. *t.* 123. *f.* 6.
Nella panna-maravara. *Rheed. mal.* 12. *p.* 37. *t.* 18.
Habitat in India & Africa.

TRICHOMANES (*chinenſis*) frondibus ſupra decompoſitis, foliolis pinnisque alternis lanceolatis, pinnis laciniis cuneiformibus. *Linn. ſp.* 1562. *Osb. it.* 222. *t.* 6. ubi deſcr.
Habitat in China.

TRI-

TRICHOMANES (*tenuifolia*) frondibus ſupra decompoſitis, pinnis inferioribus alternis pinnatifidis, ſuperioribus oppoſitis, foliis lanceolatis inciſis.
Filix pinnis ad radicem alternis denticulatis, Rutæ æmulis. *D. Pryon.*
β Dryopteris campeſtris. *Rumph. amb. 6. p.* 77. *t.* 34. *f.* 2.
Differt foliis latioribus & anguſtioribus.

TRICHOMANES (*nivea*) fronde ſimplici, pinnis alternis ovato-ſinuatis ſubtus albicantibus.
Trichomanes majus, pinnis ſinuatis ſubtus niveis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 34. *f.* 1.
Habitat in utraque India.

MARSILEA (*quadrifolia*) foliis quaternis. *Linn. ſp.* 1563. *Tab.* 62.
Denticula paluſtris quadrifolia. *Bauh. pin.* 362. *Mapp. alſat.* 166. *t.* 166. *f.* 3.
Lens paluſtris quadrifolia. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 789. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 619. *ſ.* 15. *t.* 4. *f.* 5.
Habitat in Indiæ & Europæ foſſis.
Indica coromandeli collecta ſub nomine *warralarei* multo tenerior europæa; *petioli* pollicares capillo humano teneriores. *foliola* quatuor breviſſima, *venis* ſingularibus, *flos* flavus minimus, *fructus* ovatus; quæ vero eodem in loco lecta ſub nomine *Nier-raer-rei* cum europæa convenit, & major eſt, hinc dubitandum, an non pro diſtinctis ſpeciebus habendæ?

M U S C I.

LYCOPODIUM (*nudum*) foliis oppoſitis, ſpicis terminalibus, floribus diſtantibus. *Linn. ſp.* 1564. ubi deſcr.
Lycopoides fruteſcens, ſpicis laxis nudis. *Dill. muſc.* 468. *t.* 64. *f.* 4.
Muſcus fruteſcens, fructu tricapſulari. *Plum. filic.* 145. *t.* 170. *f. A. A.*
Habitat in Indiis.

LYCOPODIUM (*Phlegmaria*) foliis verticillato-quaternis, ſpicis terminalibus dichotomis. *Linn. ſp.* 1564.
Lycopodium erectum dichotomum, foliis cruciatis, ſpicis gracilioribus. *Dill. muſc.* 450. *t.* 61. *f.* 5. *Linn. Fl. zeyl.* 386.
Selago Indiæ orientalis ſeu Phlegmaria admirabilis zeylanica. *Breyn. cent.* 186. *t.* 92. *Burm. zeyl.* 211.
Tana-pouel-paatsja-maravara. *Rheed. mal.* 12. *p.* 27. *t.* 14.
Habitat in Zeylona & Malabara.

LYCOPODIUM (*cernuum*) foliis ſparſis curvatis, caule ramoſiſſimo, ſpicis nutantibus. *Linn. ſp.* 1566. *Fl. zeyl.* 387.
Lycopodium fruteſcens capillaceum criſpum, ſpicis brevibus nutantibus. *Dill. muſc.* 456. *t.* 63. *f.* 10.
Lycopodium zeylanicum erectum ramoſiſſimum. *Burm. zeyl.* 144. *t.* 65.
Muſcus zeylanicus erectus perpetuo virens in arboris proceritatem excreſcens. *Plukn. alm.* 247. *t.* 47. *f.* 9.
Muſcus zeylanicus terreſtris clavatus erectus. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 624. *ſ.* 15. *t.* 431. *f.* 3.

Muſcus maximus coridis folio, viticulis latis ramoſis. *Plum. filic.* 144. *t.* 65.
Muſcus clavatus erectus, criſpatis foliis. *Plukn. alm.* 119. *t.* 431. *f.* 3.
Bellon-Patſia. *Rheed. mal.* 12. *p.* 73. *t.* 39. Rane-campang. Javanis.
Habitat in Indiis.

LYCOPODIUM (*Bryopteris*) foliis ſparſis imbricatis, ramulis convolutis. *Linn ſp.* 1567.
Lycopodium ſquamoſum hiſpidum: extremitatibus convolutis. *Dill. muſc.* 472. *t.* 66. *f.* 11.
Muſcus erectus indicus platyceros filicem referens. *Moriſ. hiſt.* 3. *p.* 628. *ſ.* 15. *t.* 7. *f.* 51.
Muſcus filicinus elegans ſeu Bryopteris. *Plukn. alm.* 247. *t.* 100. *f.* 3. *Raj. ſuppl.* 32.
Habitat in India & Cap. B. ſpei.

LYCOPODIUM (*canaliculatum*) foliis bifariis: ſuperficialibus diſtichis, caule erecto canaliculato. *Linn. ſp.* 1568.
Lycopodioides erectum filicinum, pinnulis acaciæ, caule ſulcato. *Dill. muſc.* 469. *t.* 65. *f.* 6.
Muſcus denticulatus major ex cerama. *Plukn. amalth. app. p. ult. t.* 453. *f.* 8.
Cingulum terræ. *Rumph. amb.* 6. *p.* 87. *t.* 40. *f.* 1.
Habitat in Amboina.

LYCOPODIUM (*plumoſum*) foliis bifariis patentibus: ſuperficialibus ſemiovatis ciliatis, ſurculis erectiuſculis, ſpicis terminalibus tetragonis ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 1568.
Lycopoides dentatum dichotomum rigidum minus. *Dill. muſc.* 471. *t.* 66. *f.* 10.
Muſcus ſquamoſus repens. *Plum. americ.* 36. *t.* 24. *Filic.* 43.
Planta muſcoſa & plumoſa guijanenſis perelegans minor. *Breyn. cent.* 1. *p.* 194. *t.* 101.
Pakka-kitsjel Javanis. D. *Kleinhof.*
Habitat in Indiis.

LYCOPODIUM (*ornitnopoides*) follis bifariis patentibus: ſuperficialibus diſtichis, ſurculis repentibus, ſpicis ſeſſilibus. *Linn. ſp.* 1569. *Fl. zeyl.* 388.
Lycopodium denticulatum minus zeylanicum. *Burm. zeyl.* 144.
Lycopodioides repens, pinnulis ornithopodii. *Dill. muſc.* 466. *t.* 66. *f.* 1. *B.*
Muſcus Lycopodioides denticulatus ſcandens repenſve, in extremitatibus ramulorum polyſpermos. *Raj. ſuppl.* 32.
Muſcus denticulatus zeylanicus minor. *Herm. zeyl.* 29.
Rane Javanis *D. Pryon.* ubi notatur; Folia vulneribus imponunt incolæ ad ſanguinem ſiſtendum.
Habitat in Java & Zeylona.

AN-

LICHEN (*fuciformis*) foliaceus rectiuſculus lævis ſubtomentoſus ramoſus, laciniis lanceolatis. *Linn. ſp.* 1614.
Lichenoides fuciforme tinctorium, corniculis longioribus & acutioribus. *Dill. muſc.* 168. *t.* 22. *f.* 61.
Fucus verrucoſus tinctorius Roccella. *C. Bauh. pin.* 365. *J. Bauh. hiſt.* 3. *p.* 797.
Alga cornu cervi diviſura. *Bauh. pin.* 367.
Habitat in India.

LICHEN (*capillaris*) filamentis ſetaceis pendulis, ramis circinnatis, ſcutellis ovatis.
Muſcus capillaris. *Rumph. amb.* 6. *p.* 89. *t.* 40. *f.* 2.
Muſcus cappillaris incanus. Djamma Javanis. D. *Kleinhof.*
Habitat in Amboina & Java dependens ex arboribus.

FUCUS (*natans*) caule tereti ramoſiſſimo, foliis lanceolato-ſerratis, fructificationibus globoſis pedunculatis ſubariſtatis. *Linn. ſp.* 1628. *Fl. zeyl.* 389. *Roy. lugdb.* 513.
Fucus folliculaceus, ſerrato folio. *Bauh. pin.* 365.
Sargaſſum pelagium amboinicum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 188. *t.* 76. *f.* 1.
Sargazo. *Piſ. braſ.* 2. *p.* 266.
In Pelago libere natat, ubi mare inſtar prati herbidi reddit, & vento agitatus adeo compingitur, ut naves in curſu impediat.

FUCUS (*granulatus*) fronde varicoſa, ramis filiformibus ramuloſis, veſiculis ovatis noduloſis mucronatis. *Linn. ſp.* 1629. ubi deſcr.
Sargaſſum littoreum. *Rumph. amb.* 6. *p.* 190. *t.* 76. *f.* 2.
Habitat in oceano Indico.

FUCUS (*Tendo*) filiformis ſimplex tenuiſſimus ſubdiaphanus. *Linn. ſp.* 1631.
Fucus indicus teres ſetam piſcatoriam referens longiſſimus. *Plukn. alm.* 160. *t.* 184. *f.* 3.
Gramen ſparteum, ſetas equinas referens. *Bauh. pin.* 5. *prodr.* 11.
Habitat in India & China.
ULVA (*javanica*) filiformis, articulis toroſioribus, foliis quaternis connatis.
Tremella marina. *Dill. muſc.* 46. *t.* 10. *f.* 8.
Rompot ſcriboe Ajer; ſeu ſajor codock Javanis. *D. Pryon.*
Differt tantum a citata figura, foliis quaternis linearibus ſemipollicaribus connatis, geniculis pollicaribus, in ſummitate breviſſimis, caule in noſtris ſpeeiminibus vix ramoſo.

F U N G I.

BOLETUS (*favus*) acaulis ſubpulvinatus ſcaber, ſetis erectis ramoſiſſimis, poris angulatis patulis. *Linn. ſp.* 1645.
Habitat in China.

PALMÆ FLABELLIFOLIÆ.

BORASSUS (*flabellifer*) frondibus palmatis plicatis cucullatis, ſtipitibus ſerratis. *Linn. ſp.* 1657. *Fl. zeyl.* 395.
Palma indica Tal & Talghala dicta, fructu carnoſo dulci eduli, putamine incluſo. *Burm. zeyl.* 181.
Palma coccifera, folio plicatili flabelliformi, mas & femina. *Raj. hiſt.* 1366.
Ampana. *Rheed. mal.* 1. *p.* 13. *t.* 10.
Carimpana. *Rheed. mal.* 1. *p.* 11. *t.* 9.
Lontarus domeſtica. *Rumph. amb.* 1. *p.* 45. *t.* 10.
β Palma zeylanica, folio longiſſimo latiſſimoque Tala & Talaghas dicta. *Burm. zeyl.* 181.
Habitat in India.

CORYPHA (*umbraculifera*) frondibus pinnato-palmatis plicatis, filo interjectis. *Linn. ſp.* 1657. *Fl. zeyl.* 394. *Roy. lugdb.* 4.
Palma montana, folio plicatili flabelliformi maximo, ſemel tantum frugifera. *Raj. hiſt. p.* 1367.
Codda-panna. *Rheed. mal.* 3. *p.* 1. *t.* 1. *ad* 12.
Saribus. *Rumph. amb.* 1. *p.* 42. *t.* 8.
Habitat in India.

PENNATIFOLIÆ.

CYCAS (*circinnalis*) frondibus pinnatis circinnalibus, foliolis linearibus planis. *Linn. ſp.* 1658. *Fl. zeyl.* 393. *Roy. lugdb.* 5.
Palma farinifera japonica ſetitſou japonenſibus. *Breyn. prodr.* 2. *p.* 8.
Palma indica, caudice in annulos protuberantes diſtincto. *Raj. hiſt.* 1360.
Arbor Zagoe amboinenſis. *Seb. theſ.* 1. *p.* 39. *t.* 25. *f.* 1.
Teſſio. *Kæmpf. jap.* 897.
Olus calappoides. *Rumph. amb.* 1. *p.* 86. *t.* 22. 23. ubi plures ſpecies, quæ ſago incolis præbent, recenſentur.
Todda-pana ſ. Mouta panna. *Rheed. mal.* 3. *p.* 9. *t.* 13. *ad* 21.
Habitat in India.

COCOS (*nucifera*) frondibus pinnatis; foliolis enſiformibus replicatis. *Linn. ſp.* 1658. *Jacq. hiſt. t.* 168. *Fl. zeyl.* 391. *Roy. lugdb.* 4.
Palma indica coccifera anguloſa. *Bauh. pin.* 508. *Burm. zeyl.* 182.
Palma indica nucifera. *Bauh. hiſt.* 1. *p.* 375.
Calappa. *Rumph. amb.* 1. *p.* 1. *t.* 1. 2.
Tenga. *Rheed. mal.* 1. *p.* 1. *t.* 1. 2. 3. 4.
Habitat in utriuſque Indiæ locis paludoſis

PHOE-

PHOENIX (*dactylifera*) frondibus pinnatis: foliolis enſiformibus complicatis. *Linn. ſp.* 1658. *Fl. zeyl.* 390. *Roy. lugdb.* 5.
Palma major. *Bauh. pin.* 506. Dactylifera & Dactylus vulgo. *Burm. zeyl.* 183.
Palma dactylifera major vulgaris. *Sloan. jam.* 174.
Palma hortenſis mas. *Kæmpf. amoen.* 688. *t.* 1. 2. *f.* 1. 2.
Fæmina. *Kæmpf. exot.* 668. 686. *t.* 1. 2. *f.* 2. 16. 11.
Habitat in Indiis.

ARECA (*cathecu*) frondibus pinnatis: foliolis replicatis oppoſitis præmorſis. *Linn. ſp.* 1659. *Fl. zeyl.* 392.
Palma arecifera nucleo verſicolore moſchatæ ſimili. *Plukn. alm.* 275. *t.* 309. *f.* 4.
Areca ſ. Faufel, avellana indica verſicolor. *Raj. hiſt.* 1363.
Palma indica minor, fructu Areca dicto, vulgaris. *Burm. zeyl.* 182.
Palma cujus fructus ſeſſilis Faufel dicitnr. *Baub. pin.* 510.
Pinanga. *Rumph. amb.* 1. *p.* 26. *t.* 4.
Caunga. *Rheed. mal.* 1. *p.* 9. *t.* 5. 6. 7. 8.
Pim-lam. *Boym. fl. ſinenſ.* 2.
Habitat in India.

ELATE (*ſylveſtris*) frondibus pinnatis, foliolis oppoſitis. *Linn. ſp.* 1659.
Palma dactylifera minor humilis ſylveſtris, fructu minore. *Herm. prodr.* 361. *Burm. zeyl.* 183.
Palma ſylveſtris malabarica, folio acuto, fructu Pini facie. *Raj. hiſt.* 1364.
Katou indel. *Rheed. mal.* 3. *p.* 15. *t.* 22. 23. 24. 25.
Habitat in India.

CARYOTA (*urens*) frondibus bipinnatis, foliolis cuneiformibus oblique præmorſis. *Linn. ſp.* 1660. *Fl. zeyl.* 396.
Palma indica vinifera, fructibus urentibus, folio Adianthi, ſaccharum præbens. *Herm. zeyl.* 44. *Burm. zeyl.* 180.
Palma indica, folio bicompoſito, fructu racemoſo. *Raj. hiſt.* 1365.
Palma dactylifera, fructu acerrimo. *Plum. ſpec.* 3.
Palma humilis ex inſula macaſſaria Indiæ orientalis nucleo plerumquæ gemello, nucis moſchatæ inſtar verſicolore kitul zeylanenſibus dicta. *Plukn. alm.* 277.
Seguaſter major. *Rumph. amb.* 1. *p.* 64. *t.* 14.
Schunda-panna. *Rheed. mal.* 1. *p.* 15. *t.* 11.
Habitat in Indiis.

FINIS.

ELENCHUS TABULARUM.

T. f.		pag.
1. 1.	Boerhavia diandria.	3
2.	——— erecta.	
2.	Nyctanthes triflora.	4
3. 1.	——— multiflora.	5
2.	Jaſminum oblongum.	6
3.	Azalea roſmarinifolia.	43
4. 1.	Juſticia chinenſis.	8
2.	——— gangetica.	9
3.	——— madurenſis.	10
5. 1.	——— nutans.	
2.	Dianthera hyſſopifolia.	11
3.	Mollugo ſtricta.	31
4.	——— ſpergula.	
6. 1.	Verbena nodiflora.	12
2.	——— javanica.	
3.	Valeriana chinenſis.	15
7. 1.	Commelina papilionacea.	17
2.	——— diffuſa.	18
3.	——— nervoſa.	
4.	——— criſtata.	
8. 1.	——— nudicaulis.	17
2.	Cyperus odoratus.	20
3.	Panicum dimidiatum.	25
9. 1.	Cyperus umbellatus.	21
2.	Scirpus miliaceus.	22
3.	Saccharum ſpicatum.	23
4.	Eriocaulon ſexangulare.	31
10. 1.	Panicum ſanguinale.	25
2.	——— lineare.	
3.	——— patens.	26
11. 1.	——— repens.	
2.	Poa malabarica.	27
3.	— chinenſis.	
12. 1.	Panicum hirtellum.	24
2.	Dactylus lagopoides.	28
3.	——— geniculatus.	
13. 1.	Spermacoce ocymoides.	34
2.	Knoxia zeylanica.	
3.	Pavetta indica.	35
14. 1.	Oldenlandia tenuifolia.	37
2.	Borago zeylanica.	41
3.	Capraria uniflora.	133
15. 1.	Oldenlandia paniculata.	38
2.	——— repens.	
3 & 4.	Ammannia baccifera	
5.	Cometes ſurattenſis.	39
16. 1.	Heliotropium malabaric.	40
2.	——— zeylanicum.	41
3.	Evolvulus tridentatus.	77
17.	Convolvulus mollis.	44
18. 1.	——— vitifolius.	45
2.	Ipomoea ſagittæfolia.	50
19. 1.	Heliotropium perſicum.	41
2.	Convolvulus angularis.	46
3.	——— ſericeus.	47
4.	——— ſpinoſus.	
20. 1.	——— nervoſus.	48
2.	Ipomoea hepaticæfolia.	50
21. 1.	Convolvulus gemellus.	46

T. f.		pag.
2.	Convolvulus uniflorus.	47
3.	Ipomæa paniculata.	50
21*. 1.	Porana volubilis.	51
2.	Apluda ariſtata.	120
3.	Iſchæmum ariſtatum.	221
22. 1.	Solanum guinenſe.	55
2.	——— trilobatum.	57
3.	——— trifoliatum.	
23.	Embelia Ribes.	62
24. 1.	Vitis trifolia.	63
2.	Staphylea indica.	75
25. 1.	Celoſia pyramidalis.	65
2.	Saraca arboreſcens.	85
3.	Proſopis ſpicata.	102
26.	Echites caudata.	68
27. 1.	——— adglutinata.	
2.	Aſclepias cordata.	72
28. 1.	Echites nummularia.	69
2.	Quiſqualis glabra.	104
29. 1.	Sium Ninſi.	361
2.	Clauſena excavata.	87
30. 1.	Evolvulus emarginatus.	77
2.	——— hederaceus.	
3.	Polygonum chinenſe.	90
31. 1.	Galenia? aſiatica.	88
2.	Polygonum perfoliatum.	90
3.	Zaleija decandra.	110
32. 1.	Uſubis triphylla.	89
2.	Dais octandra.	103
33. 1.	Caſſytha corniculata.	93
2.	Caſſia ſenna.	96
34. 1.	Fagonia indica.	102
2.	Juſſiæa tenella.	103
35. 1.	Limonia trifolia.	
2.	Quiſqualis pubeſcens.	104
36. 1.	Glinus lotoides.	112
2.	——— ononides.	113
3.	Corchorus javanica.	123
37. 1.	Delima ſarmentoſa.	122
2.	Corchorus trilocularis.	123
38. 1.	Lavandula multifida.	126
2.	Moluccella perſica.	128
3.	Origan. benghalenſe.	
39. 1.	Rhinanthus indica.	131
2.	Antirrhinum papilion.	
3.	Steris aquatica.	73
4.	Baſella japonica.	132
5.	Gmelina indica.	76
40. 1.	Ruellia tentaculata.	134
2.	——— repanda.	
41. 1.	Cornutia corymboſa.	132
2.	Ruellia repens.	135
3.	——— erecta.	
42. 1.	——— perſica.	
2.	Acanthus ciliaris.	139
43. 1.	Ovieda mitis.	136
2.	Vitex pinnata.	138
44.	Volkameria alternifol.	137
45. 1.	——— multiflora.	

T. f.		pag.
2.	Pedalium murex.	139
46. 1.	Peltaria Garcini.	
2.	Heliophila incana.	140
3.	Cleome fruticoſa.	140
47. 1.	Sida perſica.	148
2.	Hibiſcus panduræformis.	151
48. 1.	Crotalaria ſericea.	156
2.	——— nana.	
3.	Hibiſcus zeylanicus.	153
49. 1.	Ononis perſica.	157
2.	Pſoralea corylifolia.	172
3.	Lotus perſicus.	173
50. 1.	Dolichos trilobus.	160
2.	Glycine monophyllos.	161
51. 1.	Cytiſus perſicus.	163
2.	Senecio biflorus.	181
3.	Hedyſarum ſpartium.	166
52. 1.	——— reniforme.	164
2.	——— triquetrum.	165
3.	——— moniliforme.	168
53. 1.	——— lineatum.	167
2.	——— lagopoides.	168
54. 1.	——— capitatum.	167
2.	——— ſtipulaceum.	168
55. 1.	——— proſtratum.	
2.	——— ſiliquoſum.	169
56. 1.	——— crinitum.	
57. 1.	Hieracium javanicum.	174
2.	Lapſana japonica.	
3.	Sicyos Garcini.	211
58. 1.	Ethulia divaricata.	176
2.	Eupatorium cordatum.	
3.	Artemiſia minima.	177
4.	Conyza ivæfolia.	180
59. 1.	——— lacera.	
2.	Erigeron Piſonis.	
60. 1.	Buphthalmum Garcini.	183
2.	Sphæranthus africanus.	185
3.	Lobelia pumila.	186
4.	Senecio tenuifolius.	181
5.	——— coronopifolius.	
61. 1.	Acalypha hiſpida.	203
2.	——— ſpiciflora.	
62. 1.	Croton tinctorium.	204
2.	——— racemoſum.	206
3.	Marſilea coromandelica.	237
63. 1.	Croton haſtatum.	205
2.	Ricinus ſpecioſus.	207
64. 1.	Croton caſtaneifolium	205
2.	——— oblongum.	
3.	Thuja? javanica.	202
65. 1.	Ireſine perſica.	212
2.	——— javanica.	
66. 1.	Ophiogloſſum pedatum.	227
2.	Polypod. trapezioides.	233
3.	——— radicans.	
4.	Adianthum truncatum.	235
67. 1.	Polypodium ſpinuloſum.	233
2.	——— lineare.	235

I N-

planta 177

INDEX GENERUM.

A.

Acalypha. 202
Acanthus. 138. 139
Acer. 221
Achyrantes. 63. 64
Acorus. 84
Acroſticum. 228. 229
Adianthum. 235. 236
Æſchynomene. 169. 170
Æſculus. 86
Agroſtis. 27
Alcea. 149
Aira. 27
Aldrovanda. 78
Aletris. 83
Allium. 82
Allophyllus. 86
Aloe. 83
Alopecurus. 26. 27
Amaranthus. 198. 199. 200
Ammannia. 38
Amaryllis. 81
Amomum. 2
Amygdalus. 117
Anacardium. 100
Andrachne. 21
Andropogon. 218. 119. 220
Annona. 125
Anthemis. 182
Antideſma. 212
Antirrhinum. 131
Apluda. 120
Apocynum. 71
Arachis. 162
Aralia. 78
Areca. 241
Argemone. 19
Ariſtolochia. 191
Arnica. 182
Artemiſia. 77
Arum. 192. 193
Arundo. 30
Aſclepias. 71. 72
Aſpalathus. 155
Aſparagus. 82. 83
Aſplenium. 231
Aſter. 181
Aſtragalus. 172
Atragene. 125
Atriplex. 221
Averrhoa. 106
Azalea. 42. 43

B.

Baccharis. 178
Baeckæa. 88
Ballota. 126
Baniſteria. 106
Barleria. 135. 136
Baſella. 76
Bauhinia. 94
Begonia. 222
Bidens. 175
Bignonia. 131
Bixa. 120
Blechnum. 231
Bobartia. 23
Boerhavia. 3
Boletus. 239
Bombax. 145
Bontia. 138
Boraſſus. 240
Borago. 41
Braſſica. 14
Bromelia. 79
Bryonia. 210
Buchnera. 133
Burmannia. 79

C.

Cacalia. 175
Cæſalpinia. 99
Calophyllum. 120. 121
Calycanthus. 118
Cambogia. 119
Camella. 153
Canna. 1
Cannabis. 212
Capparis. 118. 119
Capraria. 133
Capſicum. 57. 58
Cardamine. 140
Cardioſpermum. 90
Carex. 294
Carica. 215
Carpeſium. 178
Carthamus. 174
Caryophyllus. 122
Caryota. 241
Caſſia. 95. 96. 97. 98
Caſſytha. 92. 93
Ceanothus. 62
Cenchrus. 221
Ceropegia. 69. 70
Celoſia. 94. 65. 66
Celtis. 218
Cerbera. 66
Chalcas. 104
Chenopodium. 77
Chionanthus. 6
Chironia. 58
Chryſanthemum. 182
Ciſſus. 35. 36
Ciſtus. 122
Citrus. 173. 174
Clauſena. 87
Cleome. 140. 141 142
Clerodendrum. 137
Clutia. 217
Cocos. 240
Coffea. 52
Coix. 294
Coldenia. 40
Cometes. 39
Commelina. 16. 17. 18
Connarus. 144
Convolvulus. 43. 44. 45 46. 47. 48
Conyza. 178. 179. 180
Corchorus. 123
Cordia. 58
Cornutia. 132
Corrigiola. 75
Corypha. 240
Coſtus. 2
Cotyledon. 106
Craſſula. 78
Crateua. 190
Creſcentia 132
Crinum. 81
Crotalaria. 155. 156. 157
Croton. 223. 204. 205. 206
Cucumis. 209
Cucurbita. 209
Cupreſſus. 202
Curcuma 2. 3
Cycas. 240
Cyclamen. 42
Cynanchum. 70
Cynometra. 100
Cyperus. 20. 21. 29
Cynoſurus. 28. 29
Cytiſus. 163

D.

Dactylis. 28
Dais. 104
Daphne. 88
Datura. 53
Delima. 122
Dialium. 12
Dianthera. 11
Dianthus. 105
Dillenia. 124
Dioſcorea. 213. 214. 215
Dodartia. 133
Dolichos. 158. 159. 160. 161
Dracontium. 193
Droſera. 78

E.

Echites. 68. 69
Ehretia. 59
Elæagnus. 39
Elæocarpus. 121
Elate. 241
Elephantopus. 185
Embelia. 62
Epidendrum. 188. 189. 190
Erigeron. 180
Eriocaulon. 30. 31
Ethulia. 176
Eugenia. 114. 115
Evolvulus. 76. 77
Eupatorium. 176
Euphorbia. 110. 111. 112
Exacum. 35
Exoecaria. 211

F.

Fagara. 36
Fagonia. 102
Ferula. 74
Ficus. 225. 226. 227
Flagellaria. 85
Fucus. 239

G.

Galega. 171. 172
Galenia. 88
Garcinia. 96
Gardenia. 67
Gentiana. 73
Gerardia. 131
Gleditſia. 224
Glinus. 112. 113
Glorioſa. 82
Glycine. 161. 162
Gmelina. 132
Gnaphalium. 177
Gomphræna. 72. 73
Goſſypium. 150
Gratiola. 11
Grewia. 192
Guettarda. 200
Guilandina. 99. 100

H.

Hedyotis. 32. 33
Hedyſarum. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169
Helicteres. 192
Heliophyla. 140
Heliotropium. 40. 41
Hemerocallis. 84
Hemionitis. 231
Hernandia 195
Herniaria. 72
Hibiſcus. 150. 151
Hieracium. 175
Hippocrepis. 163
Holcus. 220
Holoſteum. 31
Hottonia. 42
Hugonia. 144
Hydrocotyle. 74
Hypericum. 174

I.

Jambolifera. 87
Jaſminum. 5. 6
Jatropha. 206
Iberis. 139
Ilex. 40
Illecebrum. 66
Impatiens. 187
Indigofera. 170. 171
Inula. 182
Ipomæa. 48. 49. 50
Ireſine. 212
Iſchæmum. 221
Iſnardia. 39
Juſſiæa. 103
Juſticia. 7. 8. 9. 10
Ixia. 16
Ixora. 34

K.

Kæmpheria. 3
Kleinhovia. 191
Knoxia. 34

L.

Lagerſtroemia. 122
Lagurus. 30
Lapſana. 174
Lathyrus. 162
Lavandula. 136
Laurus. 91. 92
Lawſonia. 88
Leontice. 82
Leonurus. 127
Lepidium. 139
Lichen. 239
Limonia. 102. 103
Liriodendrum. 124
Lobelia. 186
Loranthus. 84
Lotus. 173
Ludwighia. 36. 37
Lupinus. 157
Lycium. 59
Lycopodium. 237. 238
Lythrum. 110

M.

Malva. 148. 149
Mammea. 120
Mangifera. 62
Maranta. 2
Marrubium. 127
Marſilea. 237
Melaſtoma. 104. 105
Melia. 101
Melochia. 142. 143
Memecylon. 87
Meniſpermum. 216
Mentha. 126
Menyanthes. 42
Meſua. 121
Michelia. 124
Microcos. 121
Mimoſa. 222. 223
Mimuſops. 86
Mirabilis. 53
Mollugo. 31. 32
Moluccella. 120
Momordica. 208. 209
Monarda. 12

Mo-

Morinda. . 52
Morus. . 198
Muſſænda. . 53
Myrica. . 211
Myrtus. 115. 116

N.

Nama. . 73
Nardus. . 23
Nauclea. . 51
Nepenthes. . 190
Nepeta. . 126
Nerium. . 67. 68
Nicotiana. . 54
Nyctanthes. . 4. 5
Nymphæa. 119. 120

O.

Ochna. . 120
Ocymum. 129. 130
Olax. . 15
Oldenlandia. 37. 38
Olea. . 6
Onoclea. . 227
Ononis. . 157
Ophioglоſſum. 227. 228
Ophiorrhiza. . 42
Ophioxylum. 218
Orchis. . 188
Origanum. . 128
Orobanche. . 133
Oryza. . 85
Osbeckia. . 86
Osmunda. . 288
Ovieda. . 136
Oxalis. . 107

P.

Panax. . 225
Pancratium. . 80
Panicum. . 24
Paſpalum. . 23
Pavetta. . 35
Paulinia. . 90
Pedalium. . 139
Peltaria. . 139
Pentapetes. 144. 145
Periploca. . 70
Pharnaceum. . 76
Phaſeolus. 157. 158
Phlomis. . 128.

Phoenix. . 241
Phyllanthus. 195. 196
Phyllis. . 73
Phyſalis. 54. 55
Phytolacca. . 18
Piper. 13. 14. 15
Piſonia. . 224
Piſtia. . 191
Plantago. . 35
Pluknetia. . 202
Plumbago. . 43
Plumieria. . 68
Poa. . 27. 28
Poinciana. . 89
Polyanthes. . 83
Polygala. . 154
Polygonum. 89. 90
Polypodium. 231. 232. 233 234. 235
Pontederia. 79. 80
Portulaca. . 110
Pothos. . 193
Porana. . 51
Proſopis. . 102
Protium. . 88
Prunella. . 130
Pſidium. 113. 114
Pſoralea. . 172
Pſychotria. 51. 52
Ptelea. . 36
Pteris. 229. 230
Pterocarpus. . 102
Punica. . 116

Q.

Quercus. . 201
Quisqualis. . 104

R.

Raphanus. . 140
Rhamnus. 60. 61
Rheedia. . 118
Rheum. . 93
Rhinanthus. . 131
Rhizophora. 108. 109
Rhus. . 74. 75
Ricinus. . 207
Robinia. . 163
Rondeletia. . 51
Roſa. . 117
Rubus. 117. 118
Ruellia. 134. 135

Rumex. . 85
Rumphia. . 16

S.

Saccharum. . 23
Sagittaria. . 201
Salix. . 211
Salvadora. . 40
Salvia. . 13
Sambucus. . 75
Samolus. . 51
Santalum. . 87
Sapindus. . 91
Saraca. . 85
Satureja. . 126
Saururus. . 86
Scabioſa. . 32
Schoenus. . 18. 19
Schinus. . 215
Scirpus. 21. 22. 23
Scutellaria. . 130
Senecio. . 180
Seſamum. . 133
Seſuvium. . 117
Sicyos. . 211
Sida. 145. 146. 147
Sideroxylon. 59
Sigisbeckia. . 183
Sinapis. . 140
Siphonanthus. 34
Siſymbrium. . 140
Sium. . 74
Smilax. . 213
Solanum. 55. 56. 57
Sophora. . 93
Spermacoce. 33. 34
Sphæranthus. 185. 186
Staphylæa. . 75
Sterculia. . 207
Steris. . 73
Stilago. 16
Stipa. . 29
Stratiotes. . 124
Strychnos. . 58

T.

Tabernamontana. 69
Tagetes. . 182
Tamarindus. . 15
Taxus. . 216
Thea. . 122
Theligonum. 201
Thuja. 201. 202

Thymus. . 129
Tomex. . 36
Torenia. . 131
Tradeſcantia. . 79
Tragia. . 194. 195
Trapa. . 39
Trevia. . 198
Tribulus. . 102
Trichomanes. 236. 237
Trichoſanthes. 207. 208
Trifolium. . 172
Trigonella. . 173
Tripſacum. . 194
Triumfetta. 109. 110
Tropæolum. . 86

U.

Ulva. . 239
Uniola. . 28
Urena. 149. 150
Urtica. 197. 198
Uſubis. . 89
Utricularia. . 11
Uvaria. 124. 125

V.

Valeriana. . 15
Vallaris. . 51
Vateria. . 122
Verbena. . 12
Verbeſina. 183. 184
Vicia. . 162
Vinca. . 67
Viola. . 185
Viſcum. . 211
Vitex. 137. 138
Vitis. . 62. 63
Volkameria. 136. 137

W.

Waltheria. . 142

X.

Xanthium. . 198
Xyris. . 18

Z.

Zanonia. . 212
Zanthoxylum. . 212

INDEX SYNONYMORUM.

A.

ABCDaria. 183
Abrus. 161
Abſinthium. 72. 177
Abſus. 95
Abutilon. 147. 148
Acacia. 98. 99. 100. 222. 223. 224
Acaciæ cognatus. 61
Acajou. 100
Acalypha. 194. 203
Acanthus. 135
Acara-puda. 78
Acatsja-valli. 92
Acer. 106. 221
Aceri affinis. 36
Aceris fructu. 222
Acetoſa. 85. 90
Achyranthes. 66
Acmella. 183
Acorum. 84
Adaca-manjen. 185
Adamboe. 49
Adel-odagam. 10
Adenanthera. 100. 101
Adhatoda. 7. 8. 9. 10. 134. 135. 139
Adianthum, 227. 228. 232. 235. 236
Adjeran-utan. 175
Admirabilis. 53
Ægilops. 218
Ægoceratos. 144
Æſchynomene. 169. 170
Agaty. 169
Agave. 84
Agrimonia. 110
Agrimoniæ congener. 105
Akara-patsjoti. 121
Alcanna. 88
Alcea. 110. 123. 142. 143. 144. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153
Alga. 239
Alchimillæ affinis. 40
Albenna. 88
Alkekengi. 54. 55
Allor-daun. 221
Allium. 80. 82
Aloë. 83. 84
Alopecuro-veronica. 126
Alopecurus. 23
Alpinia. 2
Alſine. 11, 31. 32. 38. 39. 73. 76. 77. 112. 113. 133. 134. 154
—— affinis. 133
—— facie. 201
—— folia. 33
Althæa. 143. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 153
Alty-alu. 226
Alyſſum. 139
Amalago. 14
Amaria. 38
Amæna-mæſta. 98
Amava indica. 208
Amarantho-affinis. 72
Amaranthoides. 29. 66. 186
Amaranthus. 63. 64. 65. 66. 72. 198. 199. 200. 203. 212
Ambel. 119
Ameri. 170
Amica-nocturna. 83
Amomum. 2
Ampana. 240
Amygdalo-affinis. 122
Amygdalus. 117
Anacardium. 100. 138
Ana-caluppa. 12
Anagallis. 73. 135
Anagyris. 163
Ananas. 79
Ananaſſa. 79
Ana-coluppa. 12
Ana-parua. 193
Ana ſchovadi. 185
Ana-ſchunda. 56
Ana-veela. 141
Anantali-maravara. 189
Anaſa-tamara. 191
Anchuſæ-degener. 41
Anchuſa. 135
Angiopteris. 227
Angræcum. 189. 190
Angurek-cambang. 188
—— poeti. 189
—— utan. 189
—— wanna. 188
Anguina. 207
Anguria. 209
Anil. 170
Aniſifolium. 102
Ankonda. 115
Anomala. 73. 188
Anona. 109. 125
Anonis. 156. 157
Anonymos. 33. 38
Ansjeli-maravara. 190
Anthaniſophyllum. 3
Anthyllis. 32
Anticholerica. 93
Antsjaca. 225
Antirrhinum. 37
Antralia-moegri. 136
Aphyllos. 11. 133
Apioſcordon. 109
Apluda. 220
Appa-appa-beſaer. 166
Appendix. 193
Apocynum. 67. 68. 69. 70. 71. 72
Aquifolii facie. 138
Aquifolium. 138
Araca-puda. 78
Arachidna. 162
Areca. 241
Arbor alba. 116
—— Afra. 100. 120
—— Ariſtolochiæ folio. 216
—— camphorifera. 92
—— champacca. 144
—— conchyliorum. 225
—— conifera. 52
—— divi Thomæ. 94
—— excæcaris. 211
—— ferrea. 121
—— florifera. 86
—— Fraxinifolio. 101
—— Ghæduba. 218
—— Javanica. 121
—— Indica. 7. 34. 51. 53. 101. 119. 120. 121. 138. 212. 222
—— kauki. 86
—— lactaria. 67
—— malabarica. 35. 36. 121
—— mexicana. 223
—— ovigera. 195
—— Platani folio. 215
—— procera. 129
—— regis. 195
—— ſiliquoſa. 132
—— ſtercoraria. 15
—— trifolia. 144
—— triſtis. 4

Ar-

Arbor Zagoe. 240
—— Zeylanica. 6. 7. 86. 115
137. 204. 225
Arbuſcula. 36. 101. 105. 118
——— Zeylanica. 166
Arealu. 225
Aria Bepou. 101
—— Veela. 141
Ariſarum. 193
Armeniaca. 117
Aro congener. 193
Aro-orchis. 3
Artemiſia. 177
Arum. 192. 193
Arundinella. 85
Arundo. 1. 23. 30 84. 219
Aſarina. 74. 131
Aſarinæ folio. 131
Aſclepias. 70. 71. 72
Aſparagus. 82
Aſperifolia. 9
Aſſa fœtida. 131
Aſter. 180. 181
Aſtragalus. 170. 171. 173
Atalerrice. 73
Atamaram. 125
Atriplex. 64
Aurantium. 174
Auricula gliris. 161
Auris canis. 64
Avanacu. 206
Avenca. 235
Avicennia. 138
Azadirachta. 101
Azedarach. 101

B.

Baccharis. 178
Baccharoides. 178
Baccifera. 54. 75. 136. 217
218
Badok-Bauhon. 126
Baducca. 119
Bahel-tsjulli. 133
Bajang-Baly. 129
Bajam Lohor. 75
Baju china. 134
Bala. 217
Balam-puli. 15
Balantine. 195
Balemcanda-Schularmandi.
16
Ballel. 47
Ballote. 127
Balſamina. 187. 208
Bancalus. 51
Bancudus. 52
Bandura. 190
Baniream. 157
Bara-Mareka. 160
Barba-Jovis. 172
Bartramia. 109
Baſella. 76
Baſilicum. 129
Batatta. 44. 213. 214
Batti ſchorigeram. 197
Bauhinia. 94
Beetla-codi. 14
Beidel-oſſar. 71
Belilla. 53
Belloti-patsja. 238
Belluſta adeca-maujen. 64
——— aureli. 67
Belutta pola taly. 81
——— tsjampakan. 121
——— tsjori-valli. 75
Bem-curini. 8
—— Noſi. 138
—— Schetti. 34
—— tamara. 119
Bena-patsja. 40
Benel. 206
Berberi ſimilis. 212
Bermudiana. 16
Betela. 14
Beteles ſpecies. 14
Betonica. 8. 142
Betre. 14
Betulæ ſpecies. 198
Bicapſularis. 134
Bidens. 175. 183. 184. 185
Bignonia. 131
Bihai. 218
Bilacus. 109
Bilimbi. 106
Bintangor. 120
Blattaria. 144
Blimbingium. 106
Blitum. 38. 63. 65. 66. 198
199. 200
Blontas China. 181
Boa maſſi. 61
Bobartia. 23
Boejon Knopoenip. 179
Boelon-Bawans. 203
Boenga-baran-zadan. 144
Boenglo. 132
Boerhavia. 3
Bohom Jambulon. 87
Bolontas. 178
Bomban. 145
Bonga penjator. 136
——— tajing-latur. 86
Bon pometang. 123
Bontia. 138
Boraginoides. 41
Botra-pomtang. 143
Bourreria. 59
Braſſica. 192
Breynia. 119
Brunella. 130
Brunswigia. 81
Bryonia. 36
Bugloſſum. 9
Bungum. 10
Bunius. 16
Bupariti. 150
Buphthalmum. 183
Butonica. 114. 115

C.

Cabur-Cabur. 89
——— muda. 89
Cacalia. 176
Cacalianthemum. 175
Cacara nigra. 158. 160
——— pruritus. 159
Cadelari. 63
Cadelium. 158
Cadjang. 163
Cadjoe-coe 140
Cadu-canrawarei. 18
Caduk-duk. 105
Candel avanacu. 203
Cæſalpinia. 99
Cajan. 163
Cajatus. 169
Cajennemam. 184
Caju ajir. 78
—— cantekka. 138
—— papan. 98
—— poeti. 116
—— tola. 75
Caladium aquatile. 192
Calamagroſtis. 19
Calamus. 84
Calamus odoratus. 219
Calappa. 240
Caltha. 184
Camarambaya. 103
Cambong-cuning. 59
——— ſantel. 35
Campang-ſappadoe. 151
Cam-

Campanula. 185
Camphora. 92
Camphorata. 72
Camunum. 104
Candel. 108
Canella. 91
Caniram. 58
Cankong. 43
Cannabis. 212
Canna. 1
Cananga. 124
Cannacorus. 1
Canin-utan. 16
Canſchi. 198
Cantharifera. 190
Capillaris. 235
Capo-molago. 58
Capſicum. 57. 58
Capuſilan kitsjil. 72
Capa veela. 141
Capparis. 118
Cara-knaſa hocla aros. 51
Caraknaſſi. 51
Cara caniram. 9
—— carambu. 103
—— ſchulli. 136
Caranſa. 133
Carara. 199
Carcapuli. 119
Cariapoeti. 115
Carambu. 37
Carandas. 118
Caronoſi 137
Cardamine. 140
Cardamindum. 86
Cardamomum. 2
Cardiaca. 123. 211
Carduus Braſilianus. 79. 138
Care. 132
Carelu-ragon. 191
Carica. 215
Carex Amboinica. 19
Caretti. 99
Carim-Curini. 7
—— gola. 80
Carimpana. 240
Carpinus. 36. 165
Carthamus. 174
Caryophylloides. 103
Caryophyllus. 59. 87. 105
115. 116. 122. 182
Caſſa mumar. 1
Caſſia. 91. 92. 94. 95
Caſſchou. 100

Caſſomba kling. 120
Caſſuta cornea. 93
Caſſuvium. 100
Catri-Conda 194
Caſtanea. 121
Caſtorei. 152. 153
Catevala. 83
Catjang-guttiil. 159
Catipping. 95
Catulli pola. 80
Catti-mahar. 191
—— marus. 191
Cattu Carambu. 103
—— gaſturi. 153
—— ſchiragam. 178
—— tripali. 14
—— tsjeru-naregam. 102
—— wagghei. 213
Cauda felis. 303
Caunga. 241
Cavalam. 207
Ceiba. 150
Celoſia. 64. 65
Cendor. 63
Centaurium minus. 35. 63. 73
Cepa. 80
Cephalanthus. 51
Ceraſo affinis. 75
Ceraſus. 116. 144
Ceratiæ affinis. 222
Ceratocephalus. 183
Cerviana. 76
Chaa. 122
Chamælæa. 90. 195
Chamæbalanus. 162
Chamæcaſſia. 95
Chamæcriſta. 98
Chamæmelum. 75
Chamærodendrum. 42
Champacam. 124
Chanſena-poua. 94
Charantia. 208
Chenopodium. 64. 72. 127
Cheramela. 106
China. 213
Chondrilla. 175
Chovanna mandaru. 94
Chryſanthemum. 175. 185
Chryſis. 185
Cichorio affinis. 183
Cingulum terræ. 238
Cinnamomum. 91. 92
Ciſtus. 42. 104. 105
Cit-amerdu. 216

Citrullus. 209
Clematis. 58. 94. 125. 132
218
Clematitis. 176
Clerodendrum. 136. 137
Clinopodium. 39. 127
Clompanus. 207
Clymenum. 162
Clypearia. 101
Cnicus. 174
Cocculi. 216
Cocculus. 216
Codagam. 74
Codagu-pala. 68
Coda pilava. 52
Codda panna. 240
Coddam-pulli. 119
Codi-avanacu. 191
Codiæum. 203
Codi avanacu. 295
Codike-karandei. 186
Coerandje. 12
Colamagroſtis. 19
Colchicum. 3
Coletta Veetla. 136
Colocaſia. 192
Colubrinum lignum. 58
Coluppa. 66
Colutea. 93. 170. 171. 172
Combilium. 214
Commelina. 16. 17. 18
Comonga. 68
Condang-wari. 150
Conga-pomifera. 145
Conna. 60
Convolvulus. 43. 44. 45. 46
47. 48. 49. 50. 70.
71. 162
Conyza. 176. 178. 179. 180
182. 184
Coracan. 29
Corallaria. 101
Corallodendron. 154
Corandas. 118
Corchorus. 123
Cordyline. 83
Corindum. 91
Cornelia. 39
Corni ſpecies. 217
Cornus. 87. 121
Cornutioides. 132
Coronilla. 93. 171. 172
Corruda. 81
Cortex papetarius. 12

Coſtus. 2
Cotyledon. 74. 106
Cottam. 129
Covalam. 109
Couro-moelli. 60
Cotſopiri. 67
Cracca. 171. 172
Crandang. 173
Cratæogonum. 33
Cratægus. 117
Criſta Pavonis. 98. 99. 101
Crithmus. 117
Crocus. 87
Crotalaria. 155. 156. 157
Croton. 217
Cruſta ollæ. 134. 135
Cucumis. 208. 209. 210
Cucurbita. 207
Cucurbitifera. 109
Cudu pariti. 150
Cujavus. 113. 114
Culitamara. 201
Cumbulu. 131
Cupamene. 202
Cupi. 51
Curutu-pala. 69
Cupreſſus. 201. 202
Curcuma. 2. 3
Curimi. 7
Cuſcuta. 92
Cyclamen. 42
Cydonia. 109. 207
Cynanchum. 70
Cynocrambe. 201
Cynogloſſoides. 41
Cynomorium. 100
Cyperus. 20. 21. 22. 29. 88
219
Cyticiſtus. 122
Cytiſus. 122. 103

D.

Dalea. 177
Dantia. 39
Datura. 53. 54. 104
Daun calidabat. 61
—— cammuni. 104
—— coepati. 97
—— hellebardies. 263
—— kitsjil. 116
—— kotti. 196
Denticula. 237
Dentillaria. 34
Deuro-apapa. 176
Digitali affinis. 133
—— ſimilis. 9
Digitalis. 33. 133
Dinding-Ary. 135
Djarak Goneto. 207
Dioſcorea. 214. 215
Dipetalos. 187
Dodonæa. 36
Doedoek. 37
Doery Radak. 132
—— Roekan. 132
Dolichos. 158. 159. 160
Don patrua. 43
Doricnium. 155. 172
Doronicum. 182
Draba. 182
Draco. 83
—— arbor. 140
Dracunculus. 193
Dryopteris. 237
Duglaſſia. 136

E.

Ebenus. 60
Ecbolium. 7
Echinophora. 86
Echinophoræ affinis. 185
Ecliptica. 184
Ela-calli. 111
Elengi. 86
Elaeocarpus. 39. 40
Elaiocarpus. 121
Eletiada-maravara. 231
Elettari. 2
Elichryſo-affinis. 64
Eluteria. 217
Emerus. 169
Empetrum. 222
Entada. 223
Ephemerum. 16. 17. 18. 79
Ericu. 71
Eriophoros. 145
Eriſimum. 90. 141. 142
Erythrina. 154
Erythroxylum. 99
Eſula. 112
Eugenia. 114
Euonymo affinis. 52. 122.
203
Euonymus. 124
Eupatoriophalacrum. 183
184
Eupatorio affinis. 178
Eupatorium. 176. 179
Euphraſia. 8. 134
Euphraſiæ affinis. 9. 131
Euphorbio-Tithymalus. 111
Euphorbium. 110. 111. 112

F.

Faba dulcis. 97
—— marina. 223
Fagonia. 102
Fagopyrum. 90
Fagotritico-ſimilis. 90
Ferrum equinum. 163
Ficus. 215. 217. 225. 226. 227
Filicifolia. 232
Filicula. 230
Filix. 227. 228. 229. 230
231. 232. 233. 234
235. 236. 237
Flamma ſylvarum. 34. 35
Florifera. 93
Flos Africanus. 182
—— cardinalis. 49
—— chinenſis. 35
—— clitorius. 162
—— convolutus. 68
—— coeruleus. 162
—— cuſpidum. 86
—— feſtivalis. 151
—— flavus. 69
—— globoſus. 72
—— horarius. 151
—— inpius. 144
—— manilhanus. 5
—— manoræ. 4
—— moſchatus. 153
—— paſſionis ſpurius. 45
—— pergulanius. 51
—— ſuſannæ. 188
Folium bracteatum. 7
—— cauſonis. 63
—— crocodili. 166
—— linguæ. 94
—— mappæ. 207
—— menſarium. 217
—— politorium. 226
—— principiſſæ. 53
—— tinctorium. 10
—— urens. 205
Folle aaros. 8
—— mallega. 67
Foo. 117

Fra-

Fragarius. 104. 105
Fructus niger. 158
—— regius. 191
Frumentum ſaracenicum 90
Frutex æthiopicus. 217
—— aquoſus. 217
—— baccifer. 75. 90. 124
192
—— ceramicus. 192
—— convolvulaceus. 213
—— globulorum. 99
—— japan. 99
—— paraſiticus. 193
—— pavoninus. 98
—— ſpinoſus. 69
—— ſylveſtris. 136
—— trifolius. 75. 226
—— viſcoſus. 125
—— volubilis. 51. 63
Fruticulus. 93. 196
—— viſcoſus. 125
Fu-ran. 190
Fucus. 239
Funis crepitans. 36
—— muræ narum. 105
—— muſarius. 124
—— quadrangularis. 218
—— urens. 194

G.

Galanga. 2
Galega. 170
Galegæ adfinis. 97. 169
Galeopſis. 33
Galing-Gaking. 90
Gallinaria. 96. 97
Gandola. 76
Gangiram-marra. 78
Ganitrus. 121
Gelala. 154
Gelſeminum. 5. 6
Gendaruſſa. 10
Gentiana. 58
Gentianella. 134
Geniſta. 155. 156. 164. 165
Geniſtella. 155. 156
Ghalberya. 36
Ghærithagas. 6
Ghæſembilla. 62
Gigalobium. 222
Ginji. 212
Gladiolus. 80
Gladiolo lacuſtri accedens. 18
Glaux. 39
Glinus. 112
Globuli majores. 99
Glycirrhiza. 161
Gnaphalium. 117. 119
Gnida pura-utan. 45
Golang Portulan. 110
Gomphræna. 66
Goſſypium. 145. 150
Gramen Alopecuroides. 13
27. 219
—— amoris. 27. 28
—— arguens. 29
—— arundinaceum. 221
—— avenaceum. 24
—— bermudienſe. 25
—— capitatum. 19
—— caricoſum. 24. 218
—— cruciatum. 19. 27
—— cyperinum. 20. 22
—— cyperoides. 18. 19. 20
21. 22
—— Dactylon. 24. 25. 26
27. 28. 29. 194
219. 220
—— Dactyloides. 28 29
—— diſtacophoron. 29
—— floridum. 25
—— fumi. 28
—— geniculatum. 13. 28
—— glareoſum. 22
—— hirſutum. 21
—— Indicum. 18. 24. 31
—— iſchæmum. 28
—— junceum. 18. 22. 31
—— malabaricum. 19
—— miliaceum. 26. 27
—— paludoſum. 17
—— paniceum. 25. 26
—— paniculatum. 23. 28
200
—— parvum. 22
—— pratenſe. 26. 27
—— puſillum. 22
—— ſecalinum. 27. 218
—— ſpartium. 239
—— tremulum. 26
—— typhoides. 24. 28
—— vaccinum. 29
—— zeylanicum. 25
Graminifolia. 31
Granata. 116
Granum moluccum. 204
—— moſchatum. 153
Gratiola. 42
Gratiolæ adfinis. 9
Groſſularia. 62. 212. 226
Groſſulariæ fructu. 104
Guabi-poſaca-biba. 223
Guajabo. 113
Guajacum. 100
Guajava. 113
Guajavillus. 114
Guajavos & Guajavus. 113
Guanabanus. 125
Guilandinoides. 100

H.

Haleſia. 200
Halecus. 204
Halicacabum. 59. 91
Hambdamanias. 121
Handur alu. 226
Hedyſarum. 160. 161. 164
165. 166. 167
168. 169. 170
Helenium. 182. 185
Helianthus. 185
Heliotropium. 40. 41
Helleborine. 188. 190
Helxine. 90
Hemionitis. 230. 231
Herba admirationis. 127
—— caſta. 170
—— crinalium. 152
—— fruticoſa. 7
—— Japonica. 130. 182
—— Indica. 3. 158
—— maxima. 185
—— memoriæ. 221
—— moerorts. 196
—— mimoſa. 107
—— ſentiens. 107
—— ſiliquoſa. 142
—— ſupplex. 189
—— vitiliginum. 163
—— viva. 98
Herpetica. 97
Hexapetala. 80
Hibiſcus. 152
Hieracium. 174
Hippogroſtis. 25. 26
Horminum. 13
Hottonia. 42
Hummatu. 53
Hyacinthus. 79. 83
Hydrocotyle. 74
Hyoſchyamus. 139
Hyſſopi ſpecies. 127

Hyſſopus. 127. 131
Hyſtrix. 136

I.

Jabotapita. 120
Jacobæa. 176. 181. 182
Jalappa. 53
Jambæ maſſon. 100
Jambolanes. 87
Jambos. 114
Jamboſa. 114. 115
Jambou outang. 114
Jamma-gobo. 107
Jarong. 34
Jaſmini flore. 136
Jaſminoides. 59
Jaſminum. 4. 5. 6. 34. 43. 49
52. 59. 67. 103. 118
136. 137
Jata. 125
Jerek-Liepis. 174
Ilad. 19
Illy ammanock. 206
Ily. 30
Ily-mulla. 39
Incta-modien. 54
Indicum. 170
Indigo. 170
Indigofera. 93
Inhame. 215
Inophyllum. 120
Inſchi. 1
Intsjia. 224
Inula. 82
Jocan-prectoe. 99
Jondam pallu. 185
Iria. 20
Iripa. 100
Irſiola. 36
Iſatis. 170
Iſora murri. 192
Iti canni. 84
Jupita. 60. 61
Juncus. 21. 22. 219. 228
Junglang. 82
Junjan. 29
Jupicai. 18

K.

Kadali. 86. 104
Kadanku. 83
Kadda-palli. 191
Kaden pullu. 19
Kagin. 100
Kaka-pu. 131
—— toddali. 90
Kakaja. 231
Kakarat. 221
Kaku-mullu. 139
—— valli. 159
Kalengi-kansjava. 212
Kalou-kadali. 105
Kansjiram maravara. 189
Kamarangha. 106
Kampang-garang. 185
Kapa-mara. 100
—— Tsjacca. 79
Kappa kelengu. 44
Karava pullu. 29
Kareta-tsjori-valli. 63
Kari kandel. 108
—— vilandi. 213
Karil. 207
Karin pola. 193
Karinta kali. 52
Kari-willi panna. 234
Katje piring. 68
Katjil. 214
Katou aloe. 225
—— Bala. 1
—— Beloeren. 153
—— Conna. 222
—— gelengu. 214
—— Indel. 241
—— Inſchi kua. 1
—— kanna. 92
—— kara walli. 224
—— kelengu. 44
—— kapel. 83
—— kurka. 126
—— pal valli. 70
—— patsjitti. 205
—— pee tjanga-piiapam. 134
—— pitsjegam mulla. 5
—— tagera. 170
—— triſagi. 131
—— tritava. 129
—— tsjaka. 51
—— tsjilam. 200
—— tsjetti pu. 177
—— tsjiregam mulla. 4
—— uren. 147
Katsjil kelengu. 214
Katulio votſna elandi. 135
Katulli pola. 80
Kalvata pullu. 29
Kauda taddi. 79
Karawa triſagi. 131
Kellor. 99
Kerpa. 24
Ketmia. 145. 150. 151. 152
153
Kimalela. 154
Kindira-pullu. 23
Kittinging. 165
Kirganelli. 196
Kitsjing. 99
Kleinia. 175
Klinting. 162
—— Birou. 89
Kobbe. 75
Kodda-poul. 191
Koetjupe. 101
Konni. 161
Koo ſeki. 16
Koroſwoel. 122
Kotsjeletti-pulli. 18
Kurandoti. 146

L.

Laborandi. 14
Laburnum. 163
Lacca herba. 187
Lachryma Jobi. 85. 194
Lada-java. 14
Lagondium. 137. 138
Lagurus. 219
Lamium. 126. 128. 130
Lampujum. 1
Lapathum. 38
Lappa. 198
Lappago. 110. 149
Lappula. 110
Lattang. 197
Lathyrus. 162
Laurifolia. 92. 189
Laurus. 121
Lavendula. 126
Lens paluſtris. 237
—— phaſeoloides. 222
Lentibularia. 11
Lenticula. 191
—— paluſtris. 78
Leontopetaloides. 82
Leonurus. 127
Leucas. 126
Leucojum. 139. 140
Lichenoides. 239
Lignum peregrinum. 100

Lignum ſappan. 99
——— ſcholare. 69
Ligularia. 111
Liguſtrum. 88. 136. 218
Lilio-Aſphodelus. 84
—— Narciſſus. 80. 81
Lilium. 80. 81. 82. 84
Limon. 174
Limonia. 102. 173
Limonellus. 103. 173
Linaria. 72. 154
Lingoum. 102
Lingua-cervina. 230
Liriodendrum. 124
Lithoſpermum. 85. 194
Lobelia. 186
Lobus aromaticus. 188
—— echinatus. 99
—— machæroides. 160
—— quadrangularis. 159
Lomba. 15
Lonchitis. 270. 230. 232 233. 235
Lonicera. 84
Lontarus. 240
Loo-utan. 106
Loto-adfinis. 95. 172
Lotus. 155. 172. 173
—— ægyptia. 119
Ludwichia. 36. 103
Lupinus. 157
Lupulo ſimilis. 19
Lychnis. 34. 35. 43. 134
Lycium. 59. 69. 132. 135
Lycopodium. 237
Lycoperſicum. 55
Lyſimachia. 35. 37. 58. 103
Lyſimachiæ adfinis. 37
——— ſpecies. 37

M.

Mail-Anſchi. 88
Majana. 126. 130
Majorana. 128. 129
Mala Goëſia. 106
Malabar. 23
Malabathrum. 92
Malacca-pela. 113
——— ſchambu. 114
Malago-kodi. 13
——— maram. 75
Malan-kua. 3
Maletta-mala-maravara. 229
Mali Perſicæ folio. 120
Malus. 60. 106. 109. 116
—— Aurantia. 173
—— Limonia. 173
—— indica. 106
—— roſea. 124
Malva. 146. 147. 149. 150. 151
Malvinda. 110. 142. 143. 146. 147. 149
Mallei-cajan-tagare. 12
Mallam-toddali. 218
Mallati-Tonquin. 72
Manaer. 34
Mandsjad. 101
Mandaru. 94
Manda-poeloe. 220
Manelli. 155
Manga. 62
Mangium. 108. 109
Mangle. 108. 109. 138
Mangoſtana. 109
Manja-Kua. 2
—— Kurini. 7
—— pumeran. 4
Manjella Kua. 3
Mansjel-Calimer. 32
Mao. 62
Marinuli-ranken. 185
Marou. 128
Marrubiaſtrum. 127
Marrubium. 12. 13. 127
Marura. 92
Matra-marelo-portal. 184
Matricaria. 182
Mechoacannæ ſimilis. 215
Meeni. 1
Melaſtoma. 104. 105
Melampyro affinis. 139
——— cognata. 136
Melilotus. 172. 173
Meliſſa. 128
Melochia. 142. 143
Melongena. 56
Mendani. 82
Mentha. 126. 129. 130
Mercurialis. 112. 195. 202
Meſpilus. 59. 109
Methonica. 82
Metroſideros. 86
Michelia. 132
Microcos. 121
Milium. 26. 220
——— arundinaceum. 194
——— folis. 194
Millefolium. 12
——— aquaticum. 229
Mimoſa. 98. 169. 222. 223 224. 225
Min angani. 73
Mirabili affinis. 76
Mirabilis. 53
Mitella. 120
Modecca. 45
Modira canni. 144
——— caniram. 58
Moldavica. 128
Moly. 82
Momordica. 208
Molucca. 128
Moretiana. 10
Morinda. 52
Morunga. 99. 100
Morus. 197. 198
Moſſelina. 183
Mothutu. 25
Motta pullu. 22
Mottenga. 19
Moukarattel. 18
Moul clavou. 145
Moumineram. 197
Mouricou. 154
Mu-Kelengu. 215
Munda-Valli. 49
Muel-ſchavi. 175
Muntinghia. 28
Moriguti. 33
Muſa. 217. 218
Muſcus. 228. 237. 238. 239
Myoſotis. 77
Myrobalanus. 196
Myrto-Leucadendron. 116
Myrtoides. 115
Myrtus. 114. 115. 116. 211
Myſtax. 141
Myxa. 16

N.

Naatsjoni. 29
Naga valli. 94
Nagaſſarium. 121
Nagaſſi. 121
Nalla-mulla. 5
Nandi-ervatam. 5
Nani Kila. 79
—— nindi. 70
Nannam-pullu. 152
Narciſſus. 80. 81
Nari patsja. 179

Nar-

Narrales. 36
Narum-panel. 124
Naſturtium. 139
——— Indicum. 86
Natu ſchambu. 114
Nay-cattarei. 17
Nedel-Ambel. 42
Negundo. 138
Nehoemella. 210
Neladsjira. 38
Nelam man. 165
—— paranda. 185
—— puta. 177
Nelen ſchena. 193
—— tsjunda. 55
Neli-pouli. 106
—— tali. 69
Nelipu. 11
Nella-panna-maravara. 236
—— tandale cotti. 156
Nelli camarum. 196
Nellika. 196
Nepeta. 126
Nerium. 67. 68. 69
Nicotiana. 54
Nierooulla. 60
Nila-Barudena. 56
—— nagel. 129
—— warei. 94
Niota moden valli. 69
Nir-Carambu. 103
— notsjil. 137
— puliari. 171
— pulli. 17
Niruri. 196
Niti todda-valli. 170
Noclitali. 212
Noli me tangere. 187
Nouchalei. 120
Noem. 29
Novella littorea. 160
——— nigra. 59
Nucifera. 120
Nuciprunifera. 91
Nugae ſylvarum. 99
Nureni-Kelengi. 213
Nurrvalla. 109
Nux americana. 91
— juglans. 205. 207
— malabarica. 207
— metella. 54
— moluccana. 206
— veſicaria. 195
— vomica. 58. 144
— Zeylanica. 195. 207

Nyctage. 53
Nymphæa. 42. 80. 119. 191
Nymphoides. 42

O.

Ocymophyllum. 89
Ocymum. 128. 129. 130
Odollam. 67
Oedam. 104
Oepata. 128
Okra. 153
Oldenlandia. 39
Olea. 6, 39. 101. 121
Olus-Calappoides. 240
—— ſchrophinum. 179
—— vagum. 48
Onagra. 103
Onobrychis. 164. 165. 166
167. 170
Ooijet Kitsjil. 44
Ophiogloſſum. 228
Orang aring. 184
Orchis. 188. 189. 190
Orleana. 120
Ornithopodium. 163. 172
Orobus. 161
Oſſifraga. 111
Ottel Ambel. 124
Ova piſcium. 194
Oxalis. 85
Oxaloides. 107
Oxys. 107
Oyot. 50

P.

Paco caatinga. 2
—— ceroca. 1
Pada-valam. 208
Paeru. 161
Paenu. 122
Pakka-Kitsjil. 238
Palega-pajanelli. 132
Paliuro affinis. 136
Palma. 83. 217. 240. 241
Palmæ adfinis. 49
Palmjuncus. 84. 85
Pal-modecca. 45
Pama ſchulli. 138
Pamboe-valli. 85
Pancratium. 80
Pandanus. 79
Pandi-pavel. 208
Pal-parrera. 192

Panja panjala. 145
Panicum. 24. 25. 26. 29
Panna-Kelengo-maravara. 231
—— valli. 234
Pannuaria. 151
Panover-tsjerana. 39
Panu. 37
Papaver. 119. 141. 142
Pape ſajor. 70
Papaya. 215
Papaya-maram. 215
Paraſitica. 228. 229
Parietaria. 201. 221
Pariti. 150
Paronychia. 64. 66
Parpadagam. 37
Paſcha utan-Kitsjil. 77
Paſſiflora. 45
Patala-moedi. 185
Patjar ayer. 134
—— China. 138
—— Java. 88
—— Tjalong. 88
Patitsjivi-maravara. 231
Patsjotti. 203
Patpaddagam. 76
Pavate. 35
Pavel. 208
Pavetta. 35
Pavia. 86
Pee-cajoni. 184
— cupameni. 195
— incta-inodiem. 54
— Kandel. 108
— mottenga. 19
— tandale-cotti. 156
— tsjanga-puiſpam. 135
— tsjeru. 203
— tumba. 9
— vetti. 54
Pela. 113
Penar-valli. 212
Pepo. 208. 209
Peragu. 137
Periclymeno accedens. 52
——— ſimilis. 136. 137
Periclymenum. 7. 84
Perim-Kaku valli. 223
—— Kara. 121
—— toddali. 60
Periploca. 70
Perſicaria. 89
Perſicæ officulo. 114
—— ſimilis. 62

Perum ponnaku. 143
Pes equinus. 74
Petola. 208. 209
Petroſelinum. 225
Phaſeolo accedens. 163
Phaſeolus. 101. 144. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 167. 222. 223
Phyllitis. 228. 229. 230. 231. 232
Phytolacca. 107
Pim lam. 241
Pinanga. 241
Pingar utan. 71
Pinus Indica. 203
Piper. 13. 14. 36. 57. 58
Piperi ſimilis. 137
Piripu. 122
Piſtachio Vitex. 138
Piſum. 91. 161
Pitha. 193
Pitsjegam mulla. 6
Pittoniæ ſimilis. 59
Planta. 8. 73
—— anatis. 107
—— aquatica. 79
—— flagelloſa. 71
—— fortunata. 137
—— Javanica. 136. 137
—— mirabilis. 190
—— paluſtris. 134
—— repens. 113
—— ſcandens. 215
—— ſilagoeri folio. 135
—— ſiliquoſa. 239
—— ſpicata. 8
—— ſpinoſiſſima. 57
—— Surattenſis. 39
—— Zeylanica. 40. 139. 190
Plantaginella. 30
Plantaginis aquat. foliis. 79. 80
Plantago. 35
Platanocephalus. 51
Plumbago. 43
Plumieria. 68
Podon-tala. 176
Poerinsjii. 91
Poinciana. 98. 101
Polygala. 66
Polygonatum. 215
Polygonum. 66. 72. 89
Polypodium. 227. 230. 231. 233. 234. 236
Ponna. 120
Ponnam-tagera. 97
Pomifera. 100
Pomum amoris. 55
Pontaletſche. 88
Poppija. 209
Portulaca. 110
Potha. 193
Prakku-tupu. 202
Pretu morunga. 100
Priapus. 190
Prunella. 134. 135
Prunifera. 91
Prunum ſtellatum. 106
Prunus. 59. 60. 61. 67. 121. 132
Pſeudo China. 213
—— Valeriana. 15
—— Valerianella. 15
Pſychotrophium. 51. 52
P roſpermadendron. 144. 145
Pu-puſætha. 223
— tumba. 184
Puam Bonga. 137
Pulcolli. 9
Pulegium. 33
Pullu ſchovadi. 50
Pulutan. 110
Punica. 116
Puſæthu. 223
Pyrolæ adfinis. 52

Q.

Quamoclit. 46. 49
Quercus. 201
Quinquefolium. 141
Quiſqualis. 104

R.

Radix muſtelæ. 42
—— toxicaria. 81
—— veſicatoria. 43
Ramacciam. 219
Rameum. 197
Rane. 238
Rangifera. 111
Ranunculo affinis. 74
Raphanus. 140
Rava pu. 4
Rhabarbanum. 93
Rhamnus. 60. 61. 132
Rhandalia. 30. 31
Rhizophora. 214. 215
Rhomphal. 192
Rhus. 144
Ribeſioides. 62
Ricinoides. 204. 205
Ricinocarpos. 194. 195. 202. 203
Ricinus. 203. 204. 205. 206. 217
Ricophora. 213
Ringam-Ringam. 165
Rivina. 40
Robinia. 169
Rompot garang. 221
—— laut. 29
Ros ſolis. 78
Roſa. 117
—— chinenſis. 153
—— ſinenſis. 151
Rotting-Korwaer. 85
Rubeola. 37. 38. 185
Rubus. 117. 118
Rudhumeti. 11
Ruellia. 134

S.

Saamorma. 86
Sabina. 201. 202
Saccharum. 25
Sagitta. 201
Sagittaria. 80. 201
Sagittariæ affinis. 124
—— ſimilis. 80
Salix. 211
Salvia. 13. 177. 179
Salvifolia. 218
Sambang-Baſſaer. 180
Sambucus. 35. 132
Samolus. 38. 51
Sajor-Babi. 34
—— codok. 239
—— volubilis. 202
Salaſſi putu. 129
Sampacca. 124
Samſtra-vadi. 115
Santalum. 87
Sapinda. 91
Saponaria. 91
Sargaſſum. 239
Sargazo. 239
Saribus. 240
Saururus. 14. 15
Scabioſa. 30. 32. 178. 183. 184. 185

Schadaveli Kelangu. 82
Schadida-calli. 111
Schageri-cottam. 121
Schangari-Biroerong. 104
Schem pariti. 151
Schetti. 34
—— codiveli. 43
Scheru-Bala. 64
—— cadelari. 64
—— ſcbunda. 56
Schennam Cottam. 217
Schinus. 102
Schit-elu. 133
Schoenanthus. 24. 219. 220
Schoenus. 19
Schombra-Valli. 62
Schorigeram. 194

Schovanna-nudela mucan. 89
———— adamboe. 48
Schunambu-Valli. 36
Schunda-panua. 241
Scirpus. 23
Sclarea. 13
Scolopendria. 227
Scorodoniæ affinis. 130
Scorpioides. 163
Scutellaria. 73. 225. 130
Sebeſtina. 59
Securidaca. 171
Seguaſter. 241
Seki-ſan. 81
Selago. 237
Selagoeri lacki. 123
—— panjang. 146
—— parampuan. 123
Selagurium. 146. 147
Sendera-Clandi. 77
Senecio. 175. 179. 180. 183
Senecioides. 179
Senna 94. 95. 96. 97. 98. 162
Seriana. 90
Seroen-jayer. 103
Seronni laut. 137
Seroupadje. 40
Serpentaria. 86
Serratula. 130
Seſamum. 133. 194
Sesban. 169. 170
Sherardia. 12
Siaſmin. 144
Sicyos. 36
Sidawaja. 67
Sideritis. 33
Siliqua arabica. 15
——— Sylveſtris. 94
Sinapi. 140
Sinapiſtrum. 141. 142
Sincana. 18
Sindoc. 92
Sjovanna-polintali. 81
Siriboa. 14
Siribipar. 226
Sirium. 14
Siſarum. 74
Siteſeu Sitz-dſui. 74
Smilax. 158. 213. 215
Solanum. 53. 54. 55. 56 57. 58
Sombong. 179
Somo. 113
Sonchus. 174. 175. 178
Songium. 124
Sophæræ congener. 97
Sorgum. 220
Soſuri China. 140
Soulattri. 121
Sparganophoros. 176
Spartium. 166
Spergula. 76
Spermacoce. 33
Spirææ ſimilis. 67
Sſii 174
Staphylodendron. 36
Stramonium. 53
Stratiotes. 191
Struthium. 176
Strychnos. 58
Sulaſſi-putu. 129
—— utan. 130
Swandadi-pullu. 173
Syalita. 129
Sycomorus. 225
Syringa. 4. 5. 101

T

Tabaxir. 30
Tabernæmontana. 69
Tacot-manſisja. 107
Tagadi. 221
Tagera. 95
Tagetes. 182
Taggarei. 95
Tagolina. 175
Tala neli. 43
Tali pulli. 17
Taludama. 3
Tamara. 19
——— tomga 106
Tanacetum. 102
Tana pouel-paatsja maravara. 237
Tanarius. 207
Tandela Cotti. 155
Tandjore kenki. 120
Taratti. 119
Tardavel. 33
Tartar. 204
Taxus. 216
Telephium. 107
Tengu. 240
Terminalis. 83
Ternatea. 162
Teſſio. 240
Teucrii facie. 40
Thalia maravara. 189
Thalictro affinis. 3
Thalictrum. 229
Thea. 124. 154
Thee. 122
Thlaſpi. 139
Thora parcu. 163
Thymifolia. 75
Thymus. 128
Tigelkio. 180
Tilam. 126
Tilo onapu. 187
Tinda parua. 62. 198
Tingu-ong. 88
Tjonge. 180
Tiri-panna. 223
Tiru calli. 111
Tithymalus. 111. 112. 195 203
Todda-panna. 240
—— vaddi. 07
Tota-pivi. 208
Toxicodendron. 74
Trapa. 39
Tregam. 226
Tremate. 178
Tremella. 239
Tribulus. 39. 102
Trichomanes. 233. 237
Trifolio adfinis. 149
Trifolium. 162. 166. 167 168. 169. 173
——— acetoſum. 107
Triopteris. 36
Triumfetta. 109

Tron-

Trongum. 56
Tsjageri-nuren. 214
Tsjakela. 227
Tsjaſcher-bebu. 107
Tsjana-kua. 2
—— pullu. 26
Tsjam-cumulu. 133
—— pacca. 124
—— pangam. 99
—— poelang. 120
Tsjeli. 21
Tsjem-tani. 16
Tsjeria-kuren-pullu. 23
Tsjeri maram. 203
Tsjera-Belutta Adeca. 64
—— maija-nari. 11
—— ponna. 120
—— kirganelli. 196
Tsjeregam malla. 4
Tsjeria-ſamſtra-vadi. 114
Tsjeru kandel. 108
—— kottsjeletti pullu. 31
—— mau-maravara. 188
—— pania. 147
—— tsjonganam-pullu. 38
—— tsjurel. 44
—— valli-panna. 227
—— veela. 142
—— uren. 143
Tsjerut tardavel. 8
Tsjetti-mandaru. 99
—— tsjikin. 122
Tſitti pullu. 29
Tſubakki. 153
Tsjolop pullu. 19
Tsjovanna-manelli. 155
Tsjudan tsjera. 42
Tsjude-maran. 7
Tsjura-caranti. 49
Tſutſuſi. 42. 43
Tuba baccifera. 216
Tulipa. 81
Tullu poundon. 153
Tumbra. 127
Tumba-codweli. 43
Tunica. 105
Turbith. 45
Turia. 169
Turie rava. 169
Turpethum. 45

U.

Ubium. 213. 214. 215
Ulmus. 218
Upudali. 134
Uren. 149
Urena. 149
Urinaria. 196
Urtica. 194. 197. 202
Urucu. 120
Utricaria. 190
Uva. 124
Uvifera. 124

V.

Vada-kodi. 10
Vaembu. 84
Valeriana. 15
Valerianella. 3. 15. 32. 33. 74
Valle onapu. 187
—— panna. 227
—— teregam. 227
Vallia capo-molago. 58
—— munga-nari. 184
Vanilla. 188
Varinga. 225
Veetla-caitu. 18
Velutta mandaru. 94
Velutta-modela-mucu. 95
Verbena. 12
Vernix. 74
Veronica. 126. 130
Veronicæ adfinis. 34. 131
Veſicaria. 95
Viburnum. 137
Vicia. 162. 171
Vidara. 60
Vidi-maram. 59
Vinca. 67
Violæ folio. 52
Viſcum. 84
Viſtnu-elandi. 77
Vitex. 137. 138
Vitis. 35. 62. 63
Viti idææ ſimilis. 169
Vitis idæa. 115
Volubilis. 50. 176. 188. 214. 215

W.

Wadapu. 72
Wannil. 102
Watta-taly. 203
—— toety. 148
Welagha. 144
Wellia codivelli. 62
—— cupameni. 202
—— panna-keleng. 233
—— tandale-cotti. 157
Widjor. 133
Woeſt naganthi. 77
Wulli-tsjarne. 110

X.

Xanthium. 198
Xylon. 145
Xylophyllos. 195

planta 67
planta 177

SERIES ZOOPHYTORUM
INDIÆ ORIENTALIS,

quæ, dum creſcendi modo Vegetabilium naturam æmulentur, olim ab antiquis Botanicis pro Plantis marinis habita, atque inter eas recenſita fuere.

ESCHARA (faſcialis) *Pall. zooph.* 42. Millepora faſcialis *Linn ſyſt.* 1283. *Mars. mar. t.* 33 *f.* 160. *n.* 1. 2. 3. *Ellis. cor. t.* 30. A a. b.
——— (zeylanica) *Pall. zooph.* 44.
——— (annularis) *ibid.* 48.
——— (frondiculoſa) *ibid.* 55. *Seb. theſ.* 3. *t.* 96. *f.* 6. *Ellis. cor. t.* 38. *f.* 8. o. p.
CELLULARIA (opuntioides) *Pall. zooph.* 61.
——— (filiformis) *ibid.* 63.
——— (floccoſa) *ibid.* 70.
——— (criſpa) *ibid.* 71. *Seb. theſ. t.* 101. *n.* 8.
——— (ſcrupoſa) *Pall zooph.* 72.
TUBULARIA (papyracea) *ibid.* 88.
SERTULARIA (halecina) *ibid.* 113. *Linn. ſyſt.* 1308. *Ellis. cor. t.* 10. *Edw. av. t.* 286.
——— (uniflora) *Pall. zooph.* 121. volubilis *Linn. ſyſt.* 1311. *Baſt. opuſc.* 1. *t.* 2. *f.* 2. a. b. d. & *f.* 4. e. *Ellis. cor. t.* 14. *f.* a A.
——— (ericoides) *Pall. zooph.* 127. (polyzonias) *Linn. ſyſt.* 1312. *Seb. theſ.* 3. *t.* 102. *n.* 4. & *t.* 103. *n.* 6. *Ellis. cor. t.* 2. *f.* a A. b B.
——— (nigellaſtrum) *Pall. zooph.* 129. (roſacea) *Linn. ſyſt* 106. *Seb. theſ.* 3. *t.* 69 *f.* 6. *Ellis cor. t.* 4. *f.* A.
——— (pumila) *Pall. zooph.* 130. *Linn. ſyſt.* 1306. *Seb. theſ.* 3. *t.* 100. *f.* 1. *Ellis. cor. t.* 5. *f.* a A.
——— (nigra) *Pall. zooph.* 135.
——— (lichenaſtrum) *ibid.* 138. *Linn. ſyſt.* 1313. *Ellis. cor. t.* 6. *f.* 10.
——— (cedrina) *Pall. zooph.* 139. *Linn. ſyſt.* 1313.
——— (purpurea) *ibid. l. c.*
SERTULARIA (Thuja) *ibid. l. c. Seb. theſ. t.* 100. *f.* 17. 18. 19. & 106. *n.* 2. *d. Ellis. cor. t.* 5. *f.* b. B.
——— (falcata) *Pall. zooph.* 144. *Linn. ſyſt.* 1309. *Ellis. cor. t.* 7. *f.* A. & *t.* 38. *f.* 5. 6.
——— (antennina) *Pall. zooph.* 146. *Linn. ſyſt* 1310. *Ellis. cor. t.* 4. *f.* a A.
——— (ſetacea) *Pall. zooph.* 148. pinnata *Linn. ſyſt.* 1312. *Ellis. cor. t.* 11. *f.* A. & *t.* 38. *f.* 4.
——— (pluma) *Pall. zooph.* 148. *Linn. ſyſt.* 1309. *Ellis. cor. t.* 7. *f.* B. & *t.* 38 *f.* 6.
——— (ſpecioſa) *Pall. zooph.* 152. pennaria *Linn. ſyſt.* 1313
——— (hypnoides) *ibid.* 155.
——— (filicina) *ibid.* 156. *Linn. ſyſt.* 1313.
GORGONIA (ventilabrum) *Pall. zooph.* 165. ventalina. *Linn. ſyſt.* 1293 *Rumph. amb.* 6. *t.* 89. *f.* 1.
——— (reticulum) *Pall. zooph.* 167. *Seb. theſ.* 3. *t.* 107. *n.* 6. & *t.* 105. *n.* 16.
——— (flabellum) *Pall. zooph.* 169. *Linn. ſyſt.* 1298. *Ellis. cor. t.* 26. *f.* K.
——— (pectinata) *Pall. zooph.* 179. *Linn. ſyſt.* 1397. *Seb. theſ t.* 106. *n.* 1. a.
——— (juncea) *Pall. zooph.* 180. *Seb. theſ.* 8. *t.* 105. *n.* 1. a.
——— (ſcirpea) *Pall. zooph.* 182.
——— (ſaſappo) *ibid.* 188. *Rumph. amb.* 6. *t.* 83.
——— (Palma) *Pall. zooph.* 189.
——— (Antipathes) *ibid.* 193. *Linn. ſyſt.* 1291. *Rumph. amb.* 6. *t.* 77. *Seb. theſ.* 3. *t.* 104. *n.* 2. *t.* 107. *n.* 4.
ANTIPATHES (fæniculacea) *Pall. zooph.* 207. *Rumph. amb.* 6. *t.* 80 *f.* 3.
ANTIPATHES (ericoides) *Pall. zooph* 208.
——— (pennacea) *ibid.* 209. *Aldrov. muſ. metall. p.* 848. *ic.* 1.
——— (myriophylla) *Pall. zooph.* 210. *Petiv. gaz. t.* 35. *f.* 12.
——— (flabellum) *Pall. zooph.* 211.
——— (clathrata) *ibid.* 212.
——— (cupreſſina) *ibid.* Gorgonia ænea *Linn. ſyſt.* 1289. *Rumph. amb. t.* 80. *f.* 2. *Seb. theſ.* 3. *t.* 106. *n.* 1.
——— (orichalcea) *Pall. zooph.* 214. *Rumph. amb. p.* 224.
——— (ſpiralis) *Pall. zooph.* 218. Gorgonia ſpiralis. *Linn. ſyſt.* 1290. *Rumph. amb.* 6. *t.* 78. *f.* C.
ISIS (ocracea) *Pall. zooph.* 230 & *Linn. ſyſt.* 1287. *Rumph. amb. t.* 85. *f.* 1. *Seb. theſ t.* 104. *f.* 1.
—— (Hippuris) *Pall. zooph.* 233. & *Linn. d. l. Rumph. amb.* 6. *t.* 84.

MIL-

MILLEPORA (retepora) *Pall. zooph.* 243. (celluloſa) *Linn. ſyſt.* 1284 *Rumph. amb.* 6. *t* 87. *f.* 5. *Ellis. cor. t.* 25. *f.* d D.
——— (clathrata) *Pall. zooph.* 245.
——— (cærulea) *ibid.* 256. *Petiv. t.* 10. *f.* 12.
——— (pumicoſa) *Pall. zooph.* 254.
——— (violacea) *ibid.* 258.
——— (alcicornis) *Pall. zooph.* 260. *Linn. ſyſt.* 1282. *Seb. theſ.* 3. *t.* 114. *n.* 1. & *t.* 116. *n.* 8.
——— ? (calcarea) *Pall. zooph* 261. *Ellis. cor. t.* 27. *f.* C. *Seb. theſ.* 3. *t.* 108. *f.* 8. & *t.* 116. *f.* 6.

MADREPORA (fungites) *Pall. zooph.* 281. *Linn. ſyſt.* 1273. *Rumph. amb.* 6. *t.* 88. *f.* 1. & 4.
——— (echinata) *Pall. zooph.* 284. *Seb. theſ.* 3. *t.* 111. *f.* 4.
——— (pileus) *Pall. zooph.* 285. *Linn. ſyſt.* 1273. *Rumph. amb.* 6. *t.* 88. *f.* 2. 3.
——— (elephantopus) *Pall. zooph.* 290.
——— (exeſa) *ibid.*
——— (mæandrites) *ibid.* 292. labyrintiformis. *Linn. ſyſt.* 1274. *Petiv. gaz. t.* 68. *n.* 11. *Seb. theſ. t.* 111. & 112. *f.* 7. 8.
——— (areolata) *Pall. zooph.* 295. *Linn. ſyſt.* 1274. *Rumph. amb.* 6. *t.* 87. *f.* 1.
——— (ramea) *Pall. zooph.* 302. *Linn. ſyſt.* 1280. *Rumph. amb.* 6. *t.* 87. *f.* 4.
——— ? (trochiformis) *Pall. zooph.* 305. turbinata. *Linn. ſyſt.* 1272.
——— (diſcoides) *Pall. zooph.* 306.
——— (oculata) *ibid.* 308. *Linn. ſyſt.* 1281. *Seb. theſ.* 3. *t.* 116. *n.* 12.
——— (hirtella) *Pall. zooph.* 313.
——— (cariophyllites) *ibid.* faſcicularis *Linn. ſyſt.* 1278. *Rumph. amb.* 6. *t.* 87. *f.* 3.
——— (organum) *Pall. zooph.* 317.
——— (favites) *ibid.* 319. favoſa. *Linn. ſyſt.* 1275. *Seb. theſ.* 3. *t.* 112. *f.* 8. 10. 21. c.
——— (ſtellaris) *Pall. zooph.* 323.
——— (porites) *ibid.* 325. *Linn. ſyſt.* 1277. *Seb. theſ.* 3. *t.* 109. *f.* 11.
——— (digitata) *Pall. zooph.* 326. *Rumph. amb.* 6. *p.* 240. *n.* 3.
——— (muricata) *Pall. zooph.* 327. *Linn. ſyſt.* 1280. *Rumph. amb.* 6. *t.* 86. *f.* 1.
——— (crater) *Pall. zooph.* 332. infundibuliformis. *Linn. ſyſt.* 1282. *Gualt. teſt. t.* 42.
——— (folioſa) *ibid.* 333. *Rumph. amb.* 6. *t.* 87. *f.* 2.
——— (damicornis) *Pall. zooph.* 334. *Linn. ſyſt.* 1279. *Rumph. amb.* 6. *t.* 86. *f.* 3.
——— (polygama) *Linn. ſyſt.* 1275. *amoen.* 4. *t.* 3. *f.* 15.

TUBIPORA (purpurea) *Pall. zooph.* 339. muſica. *Linn. ſyſt.* 1270. *Rumph. amb.* 6. *t.* 85. *f.* 2.

ALCYONIUM (alburnum) *Pall. zooph.* 346.
——— (arboreum) *ibid.* 347. *Linn. ſyſt.* 1293. *Teſſin. muſ. t* 10.
——— (cotoneum) *Pall. zooph.* 359. *Seb. theſ.* 3. *t.* 99. *f.* 4. cydoneum. *Linn. ſyſt.* 1295.

PENNATULA (grandis) *Pall. zooph.* 366. *Rumph. muſ. p.* 43. 44. *n.* 2.
——— (juncea) *Pall. zooph.* 371. *Seb. theſ.* 3. *t.* 114. *n.* 2. *Rumph. muſ.* 43. *n.* 1.
——— (phalloides) *Pall. zooph.* 373.

VORTICELLA (conglomerata) *Linn. ſyſt.* 1318. *Amoen.* 4. *t.* 3. *f.* 1.

SPONGIA (lichenoides) *Pall. zooph.* 378.
——— (floribunda) *ibid.*
——— (Baſta) *ibid.* 379. *Rumph. amb.* 6. *t.* 89.
——— (flabelliformis) *Pall zooph.* 380. *Linn. ſyſt.* 1296. *Rumph. amb.* 6. *t.* 80. *f.* 1.
——— (fibrilloſa) *Pall. zooph.* 382.
——— (faſtigiata) *ibid.* 392. tubuloſa. *Linn. ſyſt.* 1297. *Seb. theſ.* 3. *t.* 97. *f.* 2.
——— (villoſa) *Pall. zooph.* 392. aculeata. *Linn. ſyſt.* 1297. *Rumph. amb.* 6. *t.* 90. *f.* 2.
——— (ſinuoſa) *Pall zooph.* 394.
——— (frondoſa) *ibid.* 395.
——— (foliaſcens) *ibid.* 395. *Rumph. amb. t.* 90. *f.* 1.
——— (agaricina) *Pall. zooph.* 397.
——— (membranoſa) *ibid.* 398. *Seb. theſ.* 3. *t.* 95. *f.* 3.
——— (fiſtularis) *Linn. ſp.* 1297. *Seb. theſ. t.* 95. *f.* 1. 7.

FLORÆ CAPENSIS PRODROMUS.

MONANDRIA MONOGYNIA.

CANNA (indica) *Rumph. amb.* 5. *t.* 71. *f.* 2. *Rheed. mal.* 11. *t.* 43.

AMOMUM (Zingiber) *Rumph. amb.* 5. *t.* 66. *f.* 1.

—— (Grana Paradiſi) *Rheed. mal.* 11. *t.* 6.

DIANDRIA MONOGYNIA.

OLEA (capenſis) *Dill. elth. t.* 160. *f.* 194.

PHILLYREA (capenſis) *Burm. afric. t.* 83. *f.* 1. 2.

ERANTHEMUM (capenſe) *Linn. ſp.* 12. *fl. cap.* 11.

CIRCÆA (lutetiana *Linn. ibid. & herb. Old.*

VERONICA (capenſis) *floribus ſolitariis, foliis orbiculatis integerrimis, caule glabro radicante. Plukn. t.* 233. *f.* 4.

—— (ſerpillifolia) *Linn. ſp.* 15. *& herb. Old.*

PÆDAROTA (bonæ ſpei) *Plukn. t.* 320. *f.* 5.

VERBENA (haſtata) *Linn. ſp.* 29.

—— (officinalis) *Linn. ſp.* 29. *herb. Old.*

LYCOPUS (paluſtris) *Plukn. phyt. t.* 45. *f.* 1.

SALVIA (africana) *Commel. amſt.* 2. *t.* 91. *Mill. ic.* 225. *f.* 1.

—— (aurea) *Commel. amſt.* 2. *t.* 92.

—— (pratenſis) *herb. Old. Linn. ſp.* 35.

—— (verticillata) *herb. Old. Linn. ſp.* 37.

—— (Æthiopis) *Barr. ic. t.* 188. *herb. Old.*

—— (Chamelæagnus) *Breyn. cent. t.* 85. *Mill. icon. t.* 225. *f.* 2. *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 11. *t.* 16 *f.* 10.

—— (acetabuloſa) *Plukn. phyt.* 311. *f.* 4.

—— (lanuginoſa) *foliis inferioribus lunulatis ſuperioribus oblongis tomentoſis.*

—— (ſclarea) *herb. Old. Linn. ſp.* 38.

TRIANDRIA MONOGYNIA.

VALERIANA (Cornucopiæ) *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 7. *t.* 16. *f.* 27. *herb. Old.*

—— (officinalis) *herb. Old. Linn. ſp.* 45.

TAMARINDUS (indica) *Rheed. mal.* 1. *t.* 23. *quæ inter plantas depictas in C. B. S. habetur.*

ANTHOLYZA (ringens) *Comm. amſt.* 1. *t.* 41. *Breyn. prodr. t.* 8. *f.* 1.

—— (æthiopica) *Corn. can.* 79. *Moris. hiſt.* 2. *ſ.* 4. *t.* 23. *f.* 1. *Plukn. t.* 195. *f.* 2. *Rudb. elyſ. p.* 236. *f.* 14.

—— (Cunonia) *Buttn. cun. t.* 1.

—— (quadrangularis) *ſtaminibus declinatis, alis revolutis, foliis linearibus tetragonis.*

1760 *Majo menſe floruit apud nos; foliis longiſſimis, ſcapo bicubitali, ſpathis bivalvibus oblongis.*

—— (Meriana) *Trew. t.* 40. *Mill. t.* 276. β. *Plukn. t.* 295. *f.* 3.

—— (revoluta) *ſtaminibus adſcendentibus, corollis revolutis, foliis lanceolatis nervoſis.*

1757. *menſe Octobri floruit, ſcapus ſeſquipedalis teres, flores purpurei.*

—— (Caryophyllacea) *foliis enſiformibus, floribus tubuloſis æqualibus, laminis duobus ſuperioribus adſcendentibus.*

floruit 1760 *menſe Aprili, convenit multum cum A. Cunonia, niſi quod ſpathæ & flores tenuiores, non adeo rubicundi caryophyllacei, ſcapus tripedalis, Folia rariora.*

—— (alethroides) *corollis declinatis monopetalis vix dentatis, genitalia includentibus, foliis enſiformibus.*

Fol. plana pedalia. Scapus bipedalis ſimpliciſſimus glaberrimus. Spathæ alternæ bivalves erectæ ſcapum includentes ad ſingulum florem. Cor. formæ tubuloſæ inſtar Alethris, declinata ſtriata purpurea. Stam. æqualia corollæ accreta. Styl. filiformis ſtigma e corolla prominens.

IXIA (africana) *Burm. afr. t.* 70. *f.* 2. *Plukn. t.* 299. *f.* 5.

IXIA

Ixia (triticea) *foliis vaginantibus ſubulatis, ſpathis imbricatis triticeis, floribus approximatis.*
Habitu & colore ferrugineo ut africana; ſcapus bipedalis, floreſcentia ſpicata, ſpathæ duodecim alternæ, flores tubuloſi.
—— (corymboſa) *Linn. ſp.* 51.
plures occurrunt in hac ſpecie varietates, quæ inprimis a congeneribus diſtinguuntur, ſpathis irregularibus bivalvibus inæqualibus, corolla in omnibus purpuraſcens.
—— (pigmæa) *foliis ovalibus planis nervoſis, petiolis vaginantibus, ſpatha bivalvi pyramidali.*
β. Plukn. phyt. t. 424 *f.* 8.
Floruit 1760. *planta palmaris, folia ſex alterna glaberrima oblongo-ovalia, nervis quinque ad petiolum contractis, petioli membranacei vaginantes glabri, margine pilis albicantibus. Scapus lateralis ſimplex in ſummo triflorus, ſpathis bivalvibus pyramidatis. Cor. maxima lutea, unguibus purpurascentibus.*
—— (grandiflora) *Roch. diſſ.* 23. *Mill. ic.* 237. *n.* 1.
Plures hujus ſpeciei varietates diſtinguuntur, ſpathis laceris pellucentibus, margine fimbriatis.
—— (crocata) *Mill. ic.* 239. *n.* 2. *cujus flores in varietate ſæpius ſecundos obſervavi, qui corolla albicante, campanulæ ſimili, unguibus contractis, maculisque hyalinis ſeſe diſtinguunt.*
—— (maculata) *Mill. ic.* 156. *f.* 1.
Plures hujus varietates, ſpathis brevibus membranaceis ariſtatis, florum colore & magnitudine, a ſe invicem differunt.
—— (flexuoſa) *Mill. ic.* 156. *f.* 2. *quæ inflexæ Roch. diſſ. & albæ varietas videtur.*
—— (bulbifera) *Mill. ic.* 236. *f.* 2.
bulbi axillares oblongi germinantes, ſpathæ contractæ cum acumine, flores ex albo flaveſcentes & violacei, venulis viridibus.
—— (polyſtachia) *Mill. ic.* 155. *f.* 2. *ſcapus tripedalis ſuperne ramoſus, flosculi ſæpe ſecundi albi ac violacei, petalis ad ungues macula ex nigro purpuraſcente.*
Ixia (paniculata) *Roch. diſſ.* 26. *t.* 1.
—— (thyrſiflora) *Roch. diſſ.* 20.
—— (imbricata) *Roch. diſſ.* 17.
—— (quadrangularis) *Roch. diſſ.* 16.
—— (ſecunda) *Roch. diſſ.* 17.
—— (Fabricii) *ibid.* 18. *colore albo & luteo variat.*
—— (bulbocoides) *ibid.* 19.
—— (monanthos) *ibid.* 21.
—— (latifolia) *ibid.* 22.
—— (monadelphia) *ibid.* 22,
—— (flabellifolia) *ibid.* 24.
Variat flore albeſcente & cæruleo.
—— (tubuloſa) *ſpathis appreſſis lanceolatis, tubis florum filiformibus.*
binæ in hac ſpecie varietates, altera foliis inſtar junci, altera foliis latioribus, petiolis foliorum longitudine contractis. Flores ſpicati diſtichi poſt evolutionem ſecundi in prima albeſcentes teneriores, in altera ruffeſcentes maculis rubris; amborum tubi tripollicares filiformes.
—— (ſcillaris) *Linn. ſp.* 52.
—— (ſpicata) *foliis enſiformibus, ſpica ſimplici ſecunda.*
Spicæ nudæ, in ſummitate floribus parvis ſeptem ſecundis, ſpathæ ~~breves~~ bivalves muticæ, foliolis ovatis nervoſis, florum tubi ſpathis duplo longiores, limbus irregulariter diviſus violaceus.
—— (ovata) *foliis radicalibus binis ovalibus connatis, ſcapo in ſummitate inflexo.*
planta ſeſquipalmaris, foliolo ad ſcapi diviſuram oblongo, qui a flore ad florem inflectitur, & inſtar dichotomiæ apparet, flores in ſummitate alterni albi & violacei.
—— (undulata) *foliis lanceolato-linearibus undulatis, ſcapo trifloro.*
planta ſeſquipalmaris, corolla tubuloſa flaveſcens, laminis linearibus.
—— (caryophyllacea) *foliis enſiformibus planis, floribus tubuloſis.*
1754 *apud nos floruit, caule breviſſimo folioſo declinato, floribus albeſcentibus, maculis flavis.*

IXIA (arcuata) *ſcapo foliaceo, foliis planis inflexis acuminatis, floribus tubuloſis.*
Singularis foliorum inferiorum decurſus, quæ ſeſquipalmaria longitudine ſcapi ſic inflectuntur, ut apicibus ſummos flores ſæpius attingant, quorum corolla tubuloſa purpuraſcens, calycibus magnis tubuloſis.

—— (umbellata) *umbella bifida racemoſa. Planta ſingularis tuberoſa, tomento lanato albicante obducta, caulis compreſſus, folia alterna lanceolata amplexicaulia; umbella faſtigiata in ſummo caule, involucrum univerſale hexaphyllum lanceolatum breve, pedunculi ſex pluresve ex eodem puncto terminali, umbellæ partialis pedunculi bipartiti, ex lana hirſutiſſimi; ramo ſingulo floſculis racemoſis pedicellatis alternis adſcendentibus. Cor. petala ſex ovalia purpurea extus piloſa intus glabriuſcula. Stam. filam. tria, antheræ luteæ. piſt. germ. inferum villoſum, ſtigm. ſimplex trigonum. Inter omnes hodierni diei Ixias maxime ſingularis & piloſiſſima, quam a nullo deſcriptam nec obſervatam reperi.*

CROCUS (capenſis) *Mill. ic.* 240.
Variat floribus luteis & violaceis.

—— (ſativus latifolius) *Linn. ſp.* 50.

—— (triflorus) *foliis capillaribus, ſcapo ſubtrifloro breviore.*
quoad florem cum ſativo conveniret, niſi quod duplo minor, bulbus minimus ſphæricus, folia linearia, bina plerumque ex radice, tertium ad ſcapi diviſuram, quod inſtar ſpathæ ſcapum ambit, ubi in tres pedunculos unifloros excurrit. Flores lutei. altera cum hac conveniens occurrit, ſcapo unifloro violaceo.

GLADIOLUS (junceus) *Plukn. phyt. t.* 187. *f.* 2.

—— (communis) *Linn. ſp.* 52. *& herb. Oldenl. quæ tenerior.*

—— (anguſtus) *Linn. H. Cliff. t.* 6. *Mill. ic.* 142. *f.* 2.
β Breyn. prodr. t. 12. *f.* 1. *Plukn. t.* 187. *f.* 4.

—— (triſtis) *Trew. Ehret. t.* 39. *Breyn. prodr. t.* 7. *f.* 1.

GLADIOLUS (ramoſus) *Mill. ic.* 235. *f.* 2.

—— (permeabilis) *Roch. diſſ. t.* 2.

—— (involutus) *Roch. diſſ. t.* 3. *Mill. ic.* 236. *f.* 1.

—— (corymboſus) *foliis enſiformibus, ſpathis alternis, floribus ſecundis. variat floribus croceis & luteis.*

—— (plicatus) *Mill. ic.* 155. *f.* 1. *Breyn. prodr. t.* 9. *f.* 2.

—— (carneus) *Roch. diſſ. t.* 4. *cujus plures varietates.*

—— (alatus) *Plukn. t.* 224. *f.* 8.

—— (villoſus) *Breyn. prodr. t.* 8. *f.* 2.

—— ? (galeatus) *Breyn. prodr. t.* 12. *f.* 2.

—— (pyramidalis) *foliis lanceolatis nervoſis, floribus ſeſſilibus imbricatis, tubo lineari, longitudine ſpathæ.*

—— (alopecuroides) *Linn. ſp.* 54.

—— (tubuloſus) *foliis cylindraceis nervoſis glaberrimis, florum ſpica diſticha.*
quoad florendi modum cum præcedenti convenit, at folia inferne vaginantia, ubi per rimam exit ſcapus, ad ſummitatem usque in cylindri formam concreta, erectiuſcula, apice clauſo cum acumine ſpinuloſo, absque medulla concava ſunt.

—— (laceratus) *foliis enſiformibus laceris, floribus ſecundis, tubo filiformi longiſſimo.*

—— (capitatus) *Linn. ſp.* 53.

IRIS (capenſis) *corollis imberbibus, foliis linearibus longiſſimis.*
quotannis inter capenſes affertur.

VIEUSSEUXIA (ſpiralis) *Roch. diſſ.* 31. *t.* 5.

—— (ariſtata) *ibid.* 32. *n.* 2.

—— (fugax) *ibid* 33. *n.* 3.
Plures hujus ſpecies depictas in ipſo natali loco ſervamus, quæ floribus inprimis ſeſe diſtinguunt.

MORÆA (vegeta & juncea) *Mill. ic.* 238.
quotannis fere apud nos floret, floribus ephemeris peculiaris violacei coloris.

WACCHENDORFIA (thyrſiflora) *Burm. monogr. f.* 1.

WAC-

WACCHENDORFIA (paniculata) *Burm. monogr. f.* 2. *Breyn. prodr. t.* 9. *f.* 1.
——— (corymboſa) *foliis radicalibus lanceolatis glabris, caulinis alternis plicatis vaginantibus cum caule villoſis, floribus corymboſis.*
COMMELINA (africana) *Linn. ſp.* 60.
——— (erecta) *Dill. elth. t.* 88. & *herb. Herm.*
PHALANGIUM (ramoſum) *Mill. ic.* 56. *Plukn. t.* 187. *f.* 3. *ſpecimen herb. Oldenl. citatis figuris tenerius.*
Bulbus ſphæricus minimus, foliorum vaginæ tripollicares, folia lanceolata plana triplo longiora, ſcapus ſeſquipedalis, e cujus medio ramuli floriferi, pedunculis ſolitariis ſubtrifloris. Cal. ſpathæ bivalves ovatæ. Cor. hexapetala, petalis ovatis patentibus, apice ſubulatis. Stam. filam. tria, unguibus inſerta, anth. oblongæ. Piſt. germ. inferum. Styl. filiformis, ſtaminibus longior. Stigm. trifidum. Peric. capſ. cordiformis trilocularis. Sem. plura minima.
——— (obſoletum) *Plukn. t.* 187. *f.* 3.
——— (ſpicatum) *ibid. t.* 310. *f.* 1.
SCHÆNUS (capenſis) *Breyn. cent. t.* 91.
——— (Mariſcus) *Moris. hiſt. t.* 3. *f.* 8. *t.* 11. *f.* 24.
——— (mucronatus) *Linn. ſp.* 63.
——— (ſpathaceus) *ibid.* 63.
——— (nigricans) *Moris. hiſt. t.* 3. *f.* 8. *t.* 10. *f.* 28.
——— (ſpicatus) *culmo tereti, foliis ſetaceis vaginantibus, florum panicula ſtricta.*
CYPERUS (minimus) *Plukn. t.* 300. *f.* 4.
——— (haſpan) *ibid. t.* 192. *f.* 2.
——— (elegans) *ibid. t.* 192. *f.* 3. *Sloan. t.* 117. *f.* 1.
——— (glomeratus) *Mont. Gram. t.* 1. *f.* 1.
——— (odoratus) *Sloan. t.* 74. *f.* 1.
SCIRPUS (capillaris) *Burm. zeyl. t.* 47. *f.* 2. *Plukn. t.* 300. *f.* 5.
——— (filiformis) *Plukn. t.* 416. *f.* 1.
——— (capenſis) *culmo triquetro folioſo, ſpicis capitatis, involucro diphyllo.*

TRIANDRIA DIGYNIA.

PANICUM (alopecuroideum) *Linn. ſp.* 82.
——— (brevifolium) *Plukn. t.* 189. *f.* 4.
CYNOSURUS (ægyptius) *Plukn. t.* 300. *f.* 8.
UNIOLA (mucronata) *Linn. ſp.* 104.
BRIZA (maxima) *Moris. hiſt* 3. *f.* 8. *t.* 6. *f.* 48.
——— (deltoidea) *ibid.* 3. *f.* 8. *t.* 6. *f.* 47.
——— (ſpicata) *ſpiculis ovalibus diſtiche ſpicatis, calycibus ſubariſtatis.*
DACTYLUS (ſpicatus) *Moris. hiſt.* 3. *f.* 8. *t.* 3. *f.* 15.
STIPA (africana) *Plukn. phyt. t.* 300. *f.* 1. *calycibus diſpermibus, ariſtis nudis, ſemine duplo longioribus, culmo ramoſo.*
AVENA (capenſis) *panicula ovata, floſculis binis apice biariſtatis, ariſta dorſo torta, floribus ſeſſilibus barbatis.*

TETRANDRIA MONOGYNIA.

LEUCADENDRON (racemoſum) *Linn. ſp.* 134.
Variat foliis ſetaceis erectis & contortis.
——— (proteoides) *Linn. ſp.* 131. *differt foliis linearibus longis curtis & ſubulatis.*
——— (cancellatum) *Boerh. lugdb. t.* 193.
——— (Lepidocarpodendron) *Boerh. lugdb. t.* 188. & *var. t.* 189.
——— (repens) *ibid. t.* 187. & *var. t.* 190.
——— (acaulon) *ibid. t.* 191.
——— (ſcolymocephalus) *ibid. t.* 192.
——— (cinaroides) *ibid. t.* 184.
——— (hirtum) *ibid. t.* 194.
——— (cucullatum) *ibid. t.* 206.
——— (Hippophyllocarpodendron) *ibid. t.* 198.
——— (Conocarpodendron) *ibid.* 196.
——— (ſpecioſum) *ibid. t.* 185.

Leucadendron (aureum) *Boerb. lugdb. t.* 199.
—— —— (ſplendens) *foliis lanceolatis acuminatis, glabritie ſplendentibus, cono foliaceo.*
—— —— (rubrum) *Boerb. lugdb. t.* 201.
—— —— (cuneiforme) *foliis ovato-cuneiformibus ſcabriuſculis, apice calloſo tricuſpidato, capitulis terminalibus ſericeis.*
—— —— (filamentoſum) *foliis ovato-lanceolatis glabris imbricatis, capitulo terminali, ſtaminibus longiſſimis perſiſtentibus.*
—— —— (lineare) *foliis lineari-cuneiformibus canaliculatis, apice calloſo acuminato, capitulo terminali foliis obvoluto.*
—— —— (polifolium) *foliis ovatis obtuſis pubeſcentibus.*
—— —— (cyanoides) *Plukn. phyt. t.* 345. *f.* 6.
—— —— (glomeratum) *Burm. afric. t.* 99. *f.* 2.
—— —— (Serraria) *ibid. t.* 99. *f.* 1. *Plukn. phyt. t.* 329. *f.* 1.
Protea (argentea) *Plukn. t.* 200. *f.* 1. *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 26. *Boerb. lugdb. t.* 195.
—— (Conifera) *Breyn. cent. t.* 9. *Boerb. lugdb. t.* 197. 203. 204.
—— (fuſca) *foliis obovalibus imbricatis, capitulis terminalibus ſericeis.*
Scabiosa (rigida) *Comm. H. Amſt.* 1. *t.* 93.
—— (africana) *Herm. par. t.* 219. *Breyn. ic. t.* 26.
magnitudine ſemipedali & ſæpe ſeſquiorgyali differt, tum & figura foliorum & florum colore.
—— (argentea) *Linn. ſp.* 145.
—— (pumila) *ſubacaulos, foliis inferioribus ſubrotundis crenatis, ſuperioribus inciſo-pinnatifidis.*
Planta ſpithamea. rad. lignoſa fibroſa. caul. fere nullus cum foliis ex lana alba pubeſcens.
—— (tranſylvanica) *Linn. ſp.* 141 *& herb. Old.*
Galium (ariſtatum) *Barrl. ic.* 358.
Spermacoce (verticillata) *Dill. elth. t.* 277. *f.* 358.
Sherardia (arvenſis) *Linn. ſp.* 149. *& herb. Old.*
Penæa (ſarcocolla) *Plukn. t.* 446. *f.* 6.
—— (mucronata) *Linn. ſp.* 162.
—— (ſquamoſa) *ibidem.*
Blæria (ericoides) *Petiv. gaz. t.* 2. *f.* 10.
Exacum (ſeſſile) *Burm. afr. t.* 74. *f.* 4. *Plukn. t.* 275. *f.* 3.
—— (pedunculatum) *ibid. t.* 343. *f.* 3.
Plantago (major) *herb. Old. Linn. ſp.* 163.
—— —— (media) *herb. Old. Moris. hiſt.* 3. *f.* 8. *t.* 15. *f.* 7.
—— —— (Pſyllium) *herb. Old. Linn. ſp.* 167.
Brabejum (ſtellatifolium) *Breyn. cent. t.* 1. *Plukn. t.* 265. *f.* 3.
Hamamelis (afra) *foliis pinnatifidis ſæpius ternis, caule procumbente. foliatura mire ludit, quæ in quibusdam ſpeciminibus in ſummo caule terna obſervantur.*

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Heliotropium (tomentoſum) *caule fruticoſo, foliis linearibus repandis villoſis, ſpicis conjugatis lateralibus.*
—— —— (curaſſavicum) *Herm. par. t.* 183.
Myosotis (arvenſis) *herb. Old. Linn. ſp.* 188.
Anchusa (africana) *caule fruticoſo villoſo, foliis lanceolatis ſubtus tomentoſis.*
Borago (africana) *Iſn. act. par. an.* 1718. *t.* 11.
Lycopsis (capenſis) *foliis lanceolatis ſtrictis punctatis, pedunculis recurvis, floribus terminalibus ſpicatis ſecundis.*
Echium (fruticoſum) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 54.
—— (lævigatum) *Plukn. t.* 341. *f.* 7.
—— (argenteum) *ibid. t.* 341. *f.* 8.
—— (ſpicatum) *caule villoſo, foliis lan-*

lanceolatis ſcabriuſculis, *ſpicis imbricatis terminalibus.*

Echium (hiſpidum) *caule ſcabro*, *foliis lanceolatis*, *pilis albicantibus hiſpidis*, *capitulo terminali corymboſo.*

Nigrina (veſicaria) *caul. herbacei erecti teretes ſcabriuſculi ſeſquipedales. fol. ſeſſilia oppoſita lanceolata ſcabra uno alterove dente verſus baſin. Flor. ex ſingulis alis verſus ſummitatem caulis penduli, pedunculo filiformi laxo, bracteis oppoſitis binis in medio pedunculi lanceolatis, flore brevioribus. Cal. per. monophyllum ovato-campanulatum inflatum quinquedentatum perſiſtens. Cor. monopetala infundibuliformis, longitudine calycis, tubo patulo, limbo quinquefido obtuſo plano, breviore tubo. Stam. filam. quinque filiformia, inferiore tubi parte inſerta, longitudine tubi. Antheræ obovatæ baſi bipartitæ mucronatæ. Piſt. germen conicum, ſtyl. filiformis, longitudine floris, ſtigma obtuſum. Per. capſula ovata bilocularis. Sem. plurima. herba ſiccata tota nigreſcit.*

Anagallis (arvenſis) *Linn. ſp.* 211.
——— (capenſis) *Linn. fl. cap.* 12.

Convolvulus (Scammonia) *Moris. hiſt.* 2. *p.* 12. *ſ.* 3. *f.* 5. *Mill. dict. t.* 102.
——— (hederaceus) *Dill. elth. t.* 83. *f.* 96. *& t.* 81. *f.* 93.
——— (tricolor) *Moris. hiſt.* 2. *p.* 17. *ſ.* 1. *t.* 4. *f.* 4.
——— (cantabricus) *ibid.* 2. *p.* 17. *ſ.* 1. *t.* 4. *f.* 3.
——— (capenſis) *foliis orbiculato-laciniatis*, *pedunculis lateralibus unifloris.*

Campanula (fruticoſa) *Linn. ſp.* 238.
——— (capenſis) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 35.
——— (Erinus) *Column. phyt. t.* 28.
——— (Draba) *caule ſimplici*, *foliis cordato-lanceolatis inciſis*, *pedunculis lateralibus unifloris.*

Roella (ciliata) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 30. *Seb. theſ.* 1. *t.* 16. *f.* 5.
——— (reticulata) *Petiv. muſ. f.* 157.

Phyteuma (capenſis) *caule fruticoſo*, *foliis linearibus ſparſis*, *flore ſolitario terminali.*

Samolus (africanus) *Waltb. hort. t.* 23.

Datura (ſtramonium) *Linn. ſp.* 255.
——— (Metel) *Rumph. amb.* 5. *t.* 87.

Hyoscyamus (albus) *Linn. ſp.* 257. *& herb. Old.*

Nicotiana (fruticoſa) *Linn. ſp.* 258.

Physalis (angulata) *Dillen. elth. t.* 12. *f.* 12.
——— (flexuoſa) *Rheed. mal.* 4. *t.* 55.

Solanum (guinenſe) *Linn. ſp.* 263.
——— (Dulcamara) *Dill. elth.* 273. *f.* 352.
——— (æthiopicum) *Lobel. ic.* 265.
——— (tuberoſum) *Baub. prodr. t.* 89.
——— (Melongena) *Rumph. amb.* 5. *t.* 85.
——— (Sodomeum) *Plukn. t.* 316. *f.* 4.
——— (tomentoſum) *Triumf. præl. t.* 6.
——— (trilobatum) *Plukn. t.* 316. *f.* 5.
——— (laurinum) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 96.
——— (molle) *caule ſubaculeato glabro*, *foliis petiolatis ovato-ſinuatis villoſis*, *pedunculis trifloris.*

Capsicum (fruteſcens) *herb. Old. Rumph. amb.* 5. *t.* 88. *f.* 1. 2. 3. 4.

Chironia (linoides) *Breyn. cent. t.* 90. *Burm. afric. t.* 74. *f.* 2.
——— (jaſminoides) *Linn. ſp.* 272.
——— (baccifera) *Commel. rar. t.* 9.
——— (fruteſcens) *ibid. t.* 8. *Burm. afr. t.* 74. *f.* 1.
——— (caryophylloides) *Linn. cent.* 130.
——— (cymoſa) *Plukn. t.* 415. *f.* 6.

Cestrum (venenatum) *pedunculis axillaribus breviſſimis incraſſatis*, *floribus faſciculatis*, *foliis ovatis ſcarioſis glaberrimis.*

Arbor. caul. lignoſus durus rimoſus fuſcus, *Fol. alterna ſubpetiolata coriacea venoſa*, *margine repanda*, *ſubtus ex albo flaveſcentia. cal. pentaphyllus minimus*, *foliolis ovato-oblongis. cor. infundibuliformis*, *limbo quinquepartito*, *lobis ovatis tubo triplo brevioribus*, *Stam. fil. quinque breviſſima*, *fauci inſer-*

ſerta, *Antheræ erectæ ovatæ, apice ſubcalloſæ. Piſt. germen ſubrotundum, ſtylus filiformis, longitudine ſtaminum, ſtigma ſimplex denudatum. Peric. bacca oblonga, coloris cærulei, ſemina contuſa carnibus commiſcentur a ruſticis, ut feras hocce veneno enecent.*

LYCIUM (afrum) *Mich. gen. t.* 105. *f.* 2. *Mill. dict. t.* 171. *f.* 1. *Trew. ehret. t.* 24.

—— (barbarum) *Plukn. t.* 322. *f.* 2. *Mich. gen. t.* 105. *f.* 1.

SIDEROXYLON (inerme) *Dill. elth. t.* 262. *f.* 344. *Burm. afr. t.* 84. *f.* 2. *β t.* 86.

—— (dentatum) *Burm. afr. t.* 82.

PLECTRONIA (corymboſa) *ibid. t.* 94. *Cal. perianth. monophyllum turbinatum obſolete quinquedentatum, ſinubus interjectis, claudentibus faucem ſquammis quinque villoſis, perſiſtens. Cor. petala quinque lanceolata ſeſſilia. Stam. filam. quinque breviſſima in fauce calycis, Anth. binæ ſubrotundæ, ſingulæ ſub calycis ſquamis inflexis. Piſt. germen inferum. Styl. filiformis, calyce brevior. ſtigma ovatum. Peric. baccæ oblongæ. Sem. duo oblonga compreſſa.*

RHAMNUS (ſpina Chriſti) *Plukn. t.* 197. *f.* 3.

PHYLICA (ericoides) *Comm. H. Amſt.* 1. *t.* 1.

—— (plumoſa) *Seb. theſ.* 1. *t.* 23. *f.* 4. 5. *Plukn. phyt. t.* 342. *f.* 3. *Burm. afric. t.* 43. *f.* 2. & 44. *f.* 3.

—— (radiata) *Breyn. cent. t.* 82. *Plukn. t.* 454. *f.* 7.

—— β (nuda) *caule glaberrimo, bracteis brevioribus.*

—— (cordata) *Commel. rar. t.* 12.

—— (dioica) *Linn. ſp.* 283.

—— (buxifolia) *Burm. afr. t.* 44. *f.* 1.

CEANOTHUS (africanus) *Commel. præl. t.* 11. *Seb. theſ.* 1. *t.* 22. *f.* 6.

MYRSINE (africana) *Commel. H. Amſt.* 1. *t.* 64. *Plukn. phyt. t.* 80. *f.* 5. *Breyn. cent. t.* 5.

CELASTRUS (buxifolius) *Plukn. t.* 202. *f.* 3.

—— (pyracanthus) *Comm. H. Amſt.* 1. *t.* 84. *Plukn. t.* 280. *f.* 5.

—— (euonymifolius) *Plukn. t.* 280. *f.* 2.

DIOSMA (oppoſitifolia) *Comm. rar. t.* 1. *Seb. theſ.* 2. *t.* 40. *f.* 5.

—— (hirſuta) *Comm. rar. t.* 3.

—— (rubra) *ibid. t.* 2. *Plukn. t.* 347. *f.* 4.

—— (ericoides) *Plukn. t.* 279. *f.* 5.

—— (ciliata) *ibid. t.* 411. *f.* 3. *Seb. theſ.* 2. *t.* 17. *f.* 5.

—— (lanceolata) *Linn. ſp.* 287.

—— (crenata) *ibid.* 287.

—— (uniflora) *Plukn. t.* 342. *f.* 5.

—— (pulchella) *Linn. ſp.* 288.

—— (grandiflora) *foliis lineari-lanceolatis, floribus binis terminalibus.*

HARTOGHIA (capenſis) *Linn. ſp.* 288. *β. Burm. afr. t.* 46. *f.* 2. *quoad foliaturam valde differunt miſſa ſpecimina; foliis lineari, ovato-oblongis & lanceolatis, floribus terminalibus ſeſſilibus corymboſis & lateralibus, faſciculatis. ramulo foliaceo ſæpe productiori.*

BRUNIA (nodiflora) *Breyn. cent. t.* 10. *Plukn. t.* 346. *f.* 4.

—— (lanugînoſa) *Plukn. t.* 318. *f.* 4.

—— (ciliata) *Linn. ſp.* 288.

—— (abrotanoides) *Burm. afr. t.* 100. *f.* 1. *Petiv. gaz. t.* 5. *f.* 7. *Plukn. t.* 346. *f.* 7.

—— (Leviſanus) *Burm. afr. t.* 100. *f.* 2. *Boerh. lugdb.* 2. *t.* 202. *Plukn. t.* 343. *f.* 9.

—— (uniflora) *Plukn. t.* 279. *f.* 2.

IREON (verticillata).

Frutex. Folia ramulorum terminalia plurima ex uno centro verticillata ſubulata planiuſcula. denticulis filiformibus parallelis, apice glanduloſis inſuper ciliata. Flor. in ſummitatibus ramulorum axillares ex communi pedunculo a tribus ad ſex, pedicellis unifloris. Cal. pentaphyllus, foliis lanceolatis æqualibus perſiſtentibus, longitudine fere petalo-

rum

ram. Cor. petala quinque obovata patentia ſeſſilia æqualia. Stam. filamenta quinque filiformia corolla dimidio breviora. Antheræ erectæ ſemibifidæ ſubulatæ apice dehiſcentes baſi hinc gibbæ, nectarium ſaccatum obtuſum. Piſt. germen oblongo ſubulatum, ſtylus cylindricus longitudine, ſtaminum ſtigma truncatum leviſſime trifidum. Per. capſula ſubtrigona trivalvis trilocularis. Semina plurima. Proxime Sauvageſiæ accedit, videturque in uliginoſis habitare, cum tranſmiſſi ramuli muco gummoſo ſemper obſeſſi ſunt.

VITIS (capenſis) *foliis cordatis crenato-ſinuoſis ſubtus ferrugineo-tomentoſis.*

ACHYRANTHES (aſpera) *Burm. zeyl. t.* 5. *f.* 3. *Plukn. t.* 10. *f.* 4. *Mill. dict. t.* 11. *f.* 2.

—— —— (frumentacea) *caulibus ramoſis, ſpicis gracilibus frumentaceis.*

THESIUM (capitatum) *Linn. ſp.* 302.

—— —— (ſcabrum) *ibidem.*

—— —— (funale) *ibidem.*

—— —— (umbellatum) *Plukn. t.* 342. *f.* 1. *quod in noſtris africanis ſpeciminibus foliis ovalibus & oblongis differt.*

—— —— (paniculatum) *caule paniculato, foliis alternis linearibus, floribus numeroſis.*

GARDENIA (florida) *Mill. ic. t.* 180. *Rumph. amb.* 7. *t.* 14. *f.* 2.

DIGYNIA.

PERIPLOCA (africana) *Comm. rar. t.* 18. *Plukn. t.* 137. *f.* 4. ß *Burm. afr. t.* 14.

—— —— (tenuifolia) *Burm. afric. t.* 15. & ß *t.* 16. *f.* 1.

—— —— (multiflora).

APOCYNUM (androſæmifolium) *Linn. ſp.* 321. & *herb. Old.*

ASCLEPIAS (undulata) *Comm. rar. t.* 16.

—— —— (cancellata) *Burm. afric. t.* 13. & ß *t.* 14. *f.* 1.

—— —— (ſinuoſa) *Commel. rar. t.* 17.

—— —— (nivea) *Dill. elth. t.* 29. *f.* 32.

—— —— (fruticoſa) *Herm. parad. t.* 24. *Mill. ic.* 45. *Plukn. t.* 138. *f.* 2.

STAPELIA (variegata) *Bradl. ſucc. t.* 22. *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 15. *t.* 3. *f.* 4. *Herm. lugdb. t.* 53.

—— (hirſuta) *Bradl. ſucc. t.* 23. *Commel. rar. t.* 19. & ß. *Burm. afr. t.* 12. *f.* 1.

CHENOPODIUM (rubrum) *Dalech. hiſt. t.* 542.

—— —— (Botrys) *Dod. pempt. t.* 34. *ambo in herb. Oldenl. occurrunt.*

GENTIANA (exacoides) *Burm. afr.* 74. *f.* 5. *Plukn. t.* 275. *f.* 4. *Seb. theſ.* 1. *t.* 22. *f.* 1.

SCHREBERA (ſchinoides) *Linn. ſp.* 1662.

SANICULA (europæa) *ibid.* 339. & *herb. Old.*

BUPLEURUM (villoſum) *Burm. afr. t.* 71. *f.* 2.

—— —— (difforme) *ibid. t.* 71. *f.* 1.

TORDYLIUM (Anthriſcus) *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 9. *t.* 14. *f.* 8.

—— —— (nodoſum & maximum) *herb. Old.*

DAUCUS (Carota) *Linn. ſp.* 349. & *herb. Old.*

CONIUM (africanum) *Boerh. lugdb. t.* 63.

ATHAMANTHA (capenſis) *foliis bipinnatis, foliolis pinnatifidis linearibus.*

—— —— (ſcabra) *caule lignoſo, foliis bipinnatis, foliolis pinnatifidis planis. Plukn. t.* 173. *f.* 1. *cum qua folia conveniunt, licet caulis in noſtra vix pedalis, lignoſus & intortus.*

FERULA (Aſſa fœtida) *Kæmpf. amoen. t.* 536.

abſque nomine in Old. herb. occurrit Kæmpferi iconi ſimillima.

SISON (Ruta) *foliis tripinnatis, radicalium petiolis longiſſimis, foliolis trifidis.*

Folia rutæ murariæ inſtar, in herb. Old.

BUBON (Galbanum) *Plukn. t.* 12. *f.* 2. *Herm. par. t.* 163.

—— (gummiferum) *Commel. H. Amſt. t.* 58.

—— (proliferum) *foliis alternis faſciculatis pinnatifidis, apice bifidis.*

SCANDIX (odorata) *Linn. ſp.* 368.
—— (Chærefolium) *ibidem.*
CORIANDRUM (ſativum) *ibid.* 367.
CUMINUM (Cyminum) *ibid.* 365.
SMYRNIUM (aureum) *ibid.* 377.
PASTINACA (ſativa) *ibidem.*
ANETHUM (Fæniculum) *ibid.* 377.
—— (graveolens) *ibidem.*
PIMPINELLA (Aniſum) *ibid.* 379. *omnes in herb. Old.*

PENTANDRIA TRIGYNIA.

RHUS (tomentoſum) *Plukn.* 219. *f.* 7. *Commel. H. Amſt.* 1. *t.* 92.
—— (anguſtifolium) *Burm. afr. t.* 91. *f.* 1. *Plukn. t.* 219. *f.* 6.
—— (lucidum) *Burm. afr. t.* 91. *f.* 2. *Commel. H. Amſt.* 1. *t.* 93. *Plukn. t.* 219. *f.* 9.
plures hujus varietates in noſtris hortis coluntur.
—— (lævigatum) *Linn. ſp. app.* 1672.
CASSINE (Peragua) *Burm. afr. t.* 85. *Dill. eltb. t.* 236. *f.* 305. *Seb. theſ.* 1. *t.* 29. *f.* 5.
—— (Maurocenia) *Dill. eltb. t.* 121. *f.* 147. *Petiv. gazoph. t.* 57. *f.* 4. *Foliorum magnitudine & latitudine admodum variat.*
PHARNACEUM (incanum) *Plukn. phyt. t.* 304. *f.* 4.
—— (Mollugo) *Herm. lugdb. t.* 21. *Plukn. t.* 331. *f.* 4.
—— (tomentoſum) *caule tomentoſo, foliis linearibus confertis, pedunculis terminalibus glaberrimis.*
—— (cordifolium) *Linn. ſp.* 389.

PENTAGYNIA.

BARRERA (capenſis) *Plukn. t.* 346. *f.* 7.
STATICE (ſinuata) *Mart. cent. t.* 48. *Shaw. afr.* 363.
—— (purpurata) *caule ſuffruticoſo ſuperne nudo corymboſo, foliis obovato-cuneiformibus, apice obtuſiuſculo mucronato.*

LINUM (africanum) *Linn. ſp.* 401.
—— (quadrifolium) *ibidem.*
—— (maritimum) *ibidem.*
DROSERA (capenſis) *Burm. afr. t.* 75. *f.* 1.
—— (ciſtiflora) *ibid. t.* 75. *f.* 2. *Breyn. prodr.* 2. *t.* 22. *f.* 2. *Plukn. t.* 440. *f.* 7.
floribus albis & purpureis variat.
CRASSULA (coccinea) *Commel. rar. t.* 24. *Bradl. ſucc. t.* 50. *Breyn. prodr. t.* 20 *f.* 1.
—— (perfoliata) *Dill. eltb. t.* 96. *f.* 113. *Mill. ic.* 108. *Commel. præl. t.* 23.
—— (ſubulata) *Herm. lugdb. t.* 552.
—— (tetragona) *Bradl. ſucc. t.* 11. *f.* 41.
—— (centauroides) *Linn. ſp.* 404.
—— (dichotoma) *Herm. lugdb. t.* 553.
—— (ſtrigoſa) *Linn. ſp.* 405.
—— (muſcoſa) *ibidem.*
—— (cultrata) *Dill. eltb. t.* 97. *f.* 114.
—— (ciliata) *ibid. t.* 98. *f.* 116.
—— (ſcabra) *ibid. t.* 99. *f.* 117. *Mart. cent. t.* 24.
—— (alternifolia) *Burm. afr. t.* 24. *f.* 1.
—— (nudicaulis) *Dill. eltb. t.* 98. *f.* 115.
—— (punctata) *Linn. ſp* 969.
—— (imbricata) *fruticoſa, foliis bifariis cordato-acuminatis imbricatis, floribus lateralibus ſeſſilibus ſolitariis.*
—— (orbicularis) *Dill. eltb t.* 100. *f.* 118.
—— (pellucida) *ibid. t* 100 *f.* 119.
—— (portulacaria) *ibid. t.* 101 *f.* 120.
—— (ſcleranthoides) *caule herbaceo dichotomo, foliis oppoſitis linearibus, floribus ſeſſilibus, ultimis capitatis.*
—— (flava) *foliis planis connato-perfoliatis lævibus, floribus corymboſo-paniculatis. Plukn. t.* 314. *f.* 2.
—— (pruinoſa) *fruticuloſa dichotoma, foliis ſubulatis pruinoſo-ſcabris, floribus ſubcorymboſis.*

HEXANDRIA MONOGYNIA.

PONTEDERIA (ſtricta) *foliis lanceolatis nervoſis ſtrictis longiſſimis, floribus ſpicatis.*

HÆMANTHUS (coccineus) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 64.

—— —— (ciliaris) *Breyn. cent. t.* 59.

—— —— (puniceus) *Dill. elth. t.* 140. *f.* 2 *Seb. theſ.* 1. *t.* 12. *f.* 1. 2. 3. *Rudb. elyſ. p.* 210. *f.* 3. *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 12. *t.* 12. *f.* 11.

—— —— (carinatus) *Linn. ſp.* 413.

CRINUM (africanum) *Mill. ic.* 210. *Breyn. prodr. t.* 10. *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 67. *Seb. theſ.* 1. *t.* 19. *f.* 4. *Plukn. t.* 195. *f.* 1.

AMARYLLIS (capenſis) *Rudb. elyſ. p.* 236. *f.* 17. *Moris. hiſt.* 2. *ſ.* 4. *t.* 23. *f.* 9. *Cornut. can.* 168.

Variat floribus luteis, carneis & purpureis, macula nigricante ad petalorum ungues.

—— —— (sarnienſis) *Corn. canad. t.* 158. *Ehret. ſelect. t.* 9. *f.* 3 *Seb. theſ. t.* 17 *f.* 3.

—— —— (undulata) *ſpatha multiflora, corolla undulata revoluta, foliis linearibus.*

Cor. undulata, quam retinet, creſcendique modo a præcedenti admodum diverſa, cum qua ſæpius apud nos floruit.

—— —— (longifolia) *Ehret. pict. t.* 13. *Herm. parad. t.* 195.

—— —— (ciliaris) *Linn. ſp.* 422.

—— —— (orientalis) *Moris. hiſt.* 2. *ſ.* 4. *t.* 10. *f.* 35. *Swert. floril.* 31. *f.* 1. *Heiſt. Brunſw. t.* 1. 2. 3.

—— —— (bulbiſperma) *ſpatha multiflora, corollis campanulatis æqualibus, genitalibus declinatis, pericarpio bulbigero.*

Rad. bulbus ſphærico-conicus ſolidus. Caul. e foliis vaginantibus Fol. radicalia ex bulbi involucro equitantia ſubcarnoſa glaberrima, nervis parallelis lineata, ad ortum trium pollicum latitudine, longitudine quinque pedum. ex equitantibus foliis formatur caulis erectus bipedalis, compreſſus. Scapus e latere bulbi ad foliorum planum erectus tripedalis, maculis ex viridi purpuraſcentibus glaberrimus. Cal. ſpathæ bivalves lanceolatæ marceſcentes. Flores ex uno centro terminales pedicellati, numero octo, quorum quatuor fertiles, purpuraſcentes, petalorum marginibus albicantibus. Cor. æqualis, tubo tripollicari e viridi rubro, limbo campanulato ſexfido, laciniis interioribus paullo latioribus. Stamin. filam. ſex, corolla breviora declinata, apicibus aſſurgentia; antheræ oblongæ didymæ. Piſt. germen inferum. Styl. ſimplex, longitudine corollæ, ſtigma trifidum turbinatum. per. capſula, ſaccum membranaceum continens, cui includitur bulbus orbiculato-planus, qui poſt menſis fere ſpatium progerminavit. Formoſiſſima hujus bulbus, ante triennium ex C. B. S. allatus, præcedenti æſtate primum floruit, quæ planta, licet ab omni huc usque cognita ex bulbulo ſemipollicari, quem loco ſeminis profert, diſtincta ſit; foliis inſuper longiſſimis, per totum annum retinentibus, a reliquis congeneribus quoque differt.

ALLIUM (ſubhirſutum?) *Linn. ſp.* 424.

FRITILLARIA (regia) *Dill. elth. t.* 99. *f.* 109.

—— —— (Meleagris) *Linn. ſp.* 436. *& herb. Oldenl.*

—— —— (nana) *racemo comoſo, foliis bifariis amplexicaulibus lanceolatis.*

TULIPA (breyniana) *Breyn. cent. t.* 36. *Rudb. elyſ. p.* 13. *f.* 11. *Plukn. t.* 414. *f.* 6.

ALBUCA (major) *Corn. canad.* 160. *Rudb. elyſ.* 2. *p.* 140. *f.* 7. *Moris. hiſt.* 2. *ſ.* 4. *t.* 24. *f.* 7.

—— (minor) *Herm. par. t.* 209.

—— (maxima) *foliis oblongis canaliculatis longiſſimis. Creſcendi modo, & foliorum latitudine a prioribus ſemper differt.*

ORNITHOGALUM (arabicum) *Rudb. elyſ. p.* 130. *f.* 1.

—— —— (capenſe) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 88. *Breyn. cent. t.* 41. *Rudb. elyſ. p.* 138. *f.* 14.

Ornithogalum (cepaceum) *Herm. lugdb. t.* 467.
Scilla (autumnalis) *Cluſ.* 1. *p.* & *t.* 185.
—— (capenſis) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 94.
Cyanella (capenſis) *Plukn. t.* 434. *f.* 2. *licet minus bona.*
Asphodelus (capenſis) *caule nudo ramoſo, foliis lanceolatis planiuſculis.*
—— (ſtrictus) *caule nudo, foliis linearibus ſtrictis, caulem ſuperantibus.*
Anthericum (fruteſcens) *Dill. eltb. t.* 231. *f.* 298.
—— (aloides) *ibidem t.* 232. *f.* 300.
—— (aſphodeloides) *Linn. ſp.* 446.
—— (annuum) *ibidem.*
—— (hiſpidum) *Mill. ic.* 39. *f.* 2.
Asparagus (declinatus) *Linn. ſp.* 449.
—— (retrofractus) *Plukn t.* 375. *f.* 3.
—— (capenſis) *ibid. t.* 15. *f.* 4.
—— (aphyllus) *ibid. t.* 15 *f.* 5.
—— (lignoſus) *aculeis recurvis, foliis linearibus faſciculatis.*
—— (triacanthus) *Plukn. t.* 78. *f.* 3.
—— (ruber) *aculeis reflexis, faſciculis foliorum alternis confertis, floribus axillaribus.*
—— (planiuſculus) *foliis lanceolatis inæqualibus, apice falcatis.*
Hyacinthus (viridis) *Linn ſp* 454.
—— (amethyſtinus) *Rudb. elyſ. p* 27. *t.* 8.
—— (orientalis)? *Linn. ſp.* 454.
—— (orchioides) *Breyn. prodr. t.* 11. *f.* 1. 2. 3. *Buxb. cent* 3. *t.* 16 & 20.
ab anno 1758 *huc uſque ſæpius apud nos floruit, diverſa admodum foliatura, magnitudine totius plantæ, & floram colore, tum & maculis cauli & foliis adſperſis.*
Aletris (capenſis) *Linn. ſp.* 456.
Rad. bulbus conicus, inferius placentæ inſtar planus, fibrillis inflexis. Fol. vaginantia lanceolata undulata ſuccoſa glaberrima. Scapus ſeſquipedalis, uſque ad medium foliorum vaginis involutus ſolitarius, maculis purpureis. Flor. in ſummo caulis nutantes tubuloſi, apice ſexdentato. Stam. fil. ſex, tubo corollæ inſerta filiformia, anth. ſubrotundæ. Piſt. germ. oblongum trigonum triloculare. ſtyl. ſubulatus inflexus.
Aletris (linguæformis) *Buxb. cent.* 3. *t.* 20.
Floruit menſe Aprili 1758, *creſcendique modo cum præcedenti convenit, niſi quod Folia oblongo-ovalia plana linguæformia læte virentia, latitudine trium pollicum. Scapus brevior immaculatus, floribus pluribus duplo majoribus.*
—— (fragrans) *Comm. H. Amſt.* 1. *t.* 49. & 2. *t.* 4.
—— (bifolia) *folio oblongo-canaliculato, ſcapum foliolumque involvente, floribus pendulis.*
β Buxb. cent 3. *t.* 19. *ubi foliolum unicum, flores pauciores.*
Aloe (perfoliata) *cum varietatibus. Linn. ſp.* 457.
—— (variegata) *Commel. præl. t.* 28. *rar. t.* 27. *Till piſ. t.* 7.
—— (diſticha) *Commel H. Amſt.* 2. *t.* 8 & 9. *Martyn. cent t.* 11 *Mill. dict. t* 19 *Dill. eltb. t.* 18. *f.* 20
—— (plicatilis) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 3.
—— (ſpiralis) *Dillen eltb t* 13 *f.* 14. *Commel. præl t.* 32
—— (retuſa) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 6. *Till. piſ. t.* 5.
—— (viſcoſa) *Commel. præl. t.* 31. *Till. piſ. t.* 5. *Dillen. eltb. t.* 13.
—— (pumila) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 10.
—— (margaritifera) *Bradl. ſucc. t.* 21. *Dill. eltb. t.* 16. *f.* 18.
—— (arachnoidea) *Commel. præl. t.* 27. *Bradl. ſucc. t.* 30.
—— (Uvaria) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 15 *Seb. theſ.* 1. *t.* 19. *f.* 3.
cujus corolla cum illa Aletris *convenire videtur.*

D 1.

DIGYNIA.

Oryza (ſativa) *Cateſb. carol. t.* 14.
Atraphaxis (undulata) *Dill. elth. t.* 32. *f.* 36.

TRIGYNIA.

Rumex (veſicarius) *Moris. hiſt.* 2. *ſ.* 5. *t.* 28. *f.* 7.
—— (ſpinoſus) *Linn. ſp.* 481.
—— (tuberoſus) *Plukn. t.* 331. *f.* 2.
Triglochin (maritimum) *Act. Holm.* 1742. *t.* 6 *allatum ex C. B. S. floruit apud nos* 1759.
Melanthium (capenſe) *Linn. ſp.* 483.
—— (ſpicatum) *petalis interne concretis reflexis, foliis acuminatis recurvis.*
inter hoc & Medeolam locum meretur.
Medeola (aſparagoides) *Till. piſ. t.* 12. *f.* 1. 2. *Herm. lugdb. t.* 631. *magnitudine foliorum differt.*

HEPTANDRIA DIGYNIA.

Limeum (africanum) *Linn. ſp.* 488. *foliis lineari-lanceolatis*
—— (æthiopicum) *foliis ovato oblongis. anno* 1766 *tranſmiſſus ramulus, caule erectiuſculo. Folia ſolitaria alterna petiolata ovalia. Corymbus terminalis, nonita compoſitus, ut in pr. ore, pedunculis brevioribus.*
Septas (capenſis) *Plukn. t.* 340. *f.* 9. *nuperrime adducta ſtirps, quæ ad hoc genus pertinere videtur, foliis linearibus, floribus aurantii coloris.*

OCTANDRIA MONOGYNIA.

Tropæolum (minus) *Lob. ic.* 506. *f.* 1. 2. & *herb. Old.*
Erica (caffra) *Linn. ſp.* 502.
—— (imbricata) *Plukn. t.* 346. *f.* 12.
—— (bruniades) *Petiv. gaz. t.* 2. *f.* 9. *Plukn. t.* 347. *f.* 9. *Seb. theſ.* 2. *t.* 63. *f.* 7.
Erica (hiſpida) *antheris bifidis exſertis, corollis globoſis, calycibus hiſpidis.*
—— (capitata) *Petiv. gaz. t.* 2. *f.* 10. *Seb. theſ.* 1. *t.* 20. *f.* 1.
—— (Pluknetii) *Plukn. t.* 344. *f.* 3. *Seb. theſ. t.* 25. *f.* 5.
—— (coccinea) *Seb. theſ.* 1. *t.* 21. *f.* 4.
—— (curviflora) *ibid.* 1. *t.* 20. *f.* 4.
—— (tubiflora) *Plukn. t.* 346. *f.* 9. *Seb. theſ.* 2. *t.* 19. *f.* 5
—— (cerinthoides) *Breyn. cent. t.* 33. *Seb. theſ.* 2 *t.* 22. *f.* 4. & *t.* 34. *f.* 6.
—— (abietina) *Seb. theſ.* 1. *t.* 21. *f.* 1.
—— (pentaphylla) *ibid.* 1. *t.* 21. *f.* 2.
—— (pubeſcens) *Linn. ſp.* 506.
—— (parviflora) *Plukn. t.* 347. *f.* 14.
—— (phyſodes) *Linn. ſp.* 506.
—— (halicacaba) *ibid.* 507.
—— (laricea) *Plukn. t.* 346. *f.* 13. *quæ tantum differt, flore ſolitario.*
—— (nigrita) *antheris ſubexſertis atris conniventibus, corollis campanulatis quadripartitis, foliis ternis ſubtriquetris*
—— (calycina) *Seb. theſ.* 2. *t.* 11. *f.* 7.
—— (tenuifolia) *Plukn. t.* 346. *f.* 11.
—— (empetrifolia) *Linn. ſp.* 507.
—— (pilulifera) *Plukn t.* 347. *f.* 8.
—— (corifolia) *Seb. theſ.* 1. *t.* 21. *f.* 3. *Plukn. t.* 346. *f.* 5 *Petiv. gaz. t.* 3 *f.* 7.
—— (triflora) *Plukn. t.* 347. *f.* 10.
—— (gnaphaloides) *Linn ſp* 508.
—— (hiſpidula) *Linn. ſp. app.* 1672.
—— (planifolia) *Plukn. t.* 347. *f.* 1.
—— (paniculata) *ibid. t.* 279 *f.* 2. *Seb. theſ.* 2. *t.* 44. *f.* 4.
—— (ſpumoſa) *Seb. theſ.* 2. *t.* 9. *f.* 10.
—— (uniflora) *antheris bifidis exſertis, ramulis unifloris, corollis globoſis, foliis linearibus imbricatis.*
—— (globoſa) *antheris incluſis, corollis globoſis, foliis linearibus ſubulatis.*
—— (abrotanoides) *Plukn. t.* 347. *f.* 9.
—— (faſtigiata) *antheris ſimplicibus incluſis, corollis hypocrateriformibus faſciculatis, foliis quaternis linearibus, margine ſcabris.*
Daphne (ſquarroſa) *Burm. afr. t.* 49. *f.* 1.

DAPHNE (roſmarinoides) *floribus verticillatis, foliis ſubpetiolatis lanceolatis repandis.*

GNIDIA (pinifolia) *Burm. afr. t.* 41. *f.* 3.

—— (tomentoſa) *Linn. ſp.* 512. *quæ foliis ovalibus & lanceolatis tomentoſis, caule rubro & albicante.*

—— (oppoſitifolia) *ibidem.*

—— (ſimplex) *foliis alternis linearibus acutis, floribus ſeſſilibus terminalibus.*

—— (radiata) *foliis ſubulatis triquetris acutis, capitulis ſeſſilibus radiatis, bracteis lanceolatis.*

PASSERINA (filiformis) *Linn. H. Cliff. t.* 11. *Breyn. cent. t.* 6.

—— (ſericea) *Burm. afr. t.* 49. *f.* 2.

—— (dodecandra) *ibid. t.* 47. *f.* 1.

—— (lævigata) *ibid. t.* 49. *f.* 3.

—— (capitata) *ibid. t.* 48. *f.* 3.

—— (ciliata) *ibid. t.* 47. *f.* 2. *Seb. theſ.* 2. *t.* 12. *f.* 9.

—— (uniflora) *Burm. afr. t.* 48. *anguſtifolia f.* 1. *latifolia f.* 2.

—— (imbricata) *ibid. t.* 46. *f.* 1. 2.

—— (planifolia) *ibid. t.* 46. *f.* 3.

—— (ericoides) *foliis linearibus lævibus ſubimbricatis, floribus globoſis, ramis glabris.*

STRUTIOLA (virgata) *foliis lanceolatis acuminatis, floribus axillaribus, ſtaminibus ſuperioribus barbatis, ramis pubescentibus.*

LACHNÆA (eriocephala) *Linn. ſp.* 514.

—— (conglomerata) *ibid.*

—— (ſphærocephala) *capitulis terminalibus ſphæricis, foliis adpreſſis contortis.*

BÆCKEA (africana) *foliis linearibus canaliculatis.*

—— (cordata) *foliis ſeſſilibus cordatis.*

DIGYNIA.

GALENIA (africana) *Bocc. muſ. t.* 110. *Till. piſ. t.* 15.

TRIGYNIA.

POLYGONUM (virginianum) *Linn. ſp.* 516. & *herb. Old.*

—— (aviculare) *Linn. ſp.* 519.

—— (ſerratum) *Schaw. afr.* 489.

—— (barbatum) *Plukn. t.* 210. *f.* 7.

CARDIOSPERMUM (Halicacabum) *Rumph. amb.* 6. *t.* 24. *f.* 2. & *herb. Old.*

TETRAGYNIA.

PARIS (quadrifolia) *Linn. ſp.* 526. & *herb. Oldenl.*

ENNEANDRIA MONOGYNIA.

LAURUS (Camphora) *Breyn. prodr.* 2. *t.* 2.

DECANDRIA MONOGYNIA.

SOPHORA (geniſtoides) *Linn. ſp.* 534.

—— (biflora) *Plukn. t.* 185. *f.* 2. *Herm. lugdb. t.* 271. *Seb. theſ.* 2. *t.* 99. *f.* 3. *Breyn. cent. t.* 27. *differt foliis ovatis & oblongis tomentoſis & glabris.*

—— (capenſis) *foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, caule fruticoſo.*

CASSIA (flexuoſa) *Breyn. cent. t.* 23. *herb. Old.*

GUAJACUM (afrum) *Waltb. hort. t.* 2.

RUTA (graveolens) *maxima. Linn. ſp.* 548.

ZYGOPHYLLUM (cordatum) *Schaw. afr. t.* 231.

—— (Morgſana) *Burm. afr. t.* 3. *f.* 2. *Dill. eltb. t.* 116. *f.* 141. *Plukn. t.* 429. *f.* 4.

—— (ſeſſilifolium) *Dill. eltb. t.* 116. *f.* 142. *Burm. afr. t.* 2. *f.* 1.

—— (β fulvum) *Burm. afr. t.* 3. *f.* 1.

—— (ſpinoſum) *ibid. t.* 2.

—— (Fabago) *herb. Old. Linn. ſp.* 551.

TRI-

TRIBULUS (terreſtris) *Barr. rar. t.* 558. *& herb. Old.*

DAIS (cotinifolia) *Linn. ſp.* 556.

DIGYNIA.

ROYENA (lucida) *Commel. H. Amſt.* I. *t.* 96. *Herm. par. t.* 232. *Plukn. t.* 63. *f.* 4. *& t.* 317. *f.* 5. *quæ melior.*
——— (glabra) *Commel. H. Amſt.* I. *t.* 65. *Plukn. t.* 321. *f.* 4.
——— (hirſuta) *Linn. ſp.* 568.
——— (ſcabra) *foliis ovato-lanceolatis ſcabris. in herb* Old.
nuper allatus fuit fruticis ramus, foliis obovalibus ſcabris, baccis axillaribus, quæ altera hujus generis ſpecies videtur.

CUNONIA (capenſis) *Burm. afr. t.* 96. *Plukn. t.* 141. *f.* 4.

DIANTHUS (diminutus) *herb.* Old. *Linn. ſp.* 587.
——— (coronarius) *ibidem.*
β *minor, foliis gramineis.*

TRIGYNIA.

SILENE (craſſifolia) *Linn. ſp.* 597.
——— (gigantea) *Walth. hort t.* 11.
——— (Behen) *Dill. eltb t.* 317 *f.* 409.
——— (Armeria) *Linn. ſp.* 601. *& herb. Old.*
——— (noctiflora) *Camer. hort. t.* 34.
——— (nocturna) *Dill. eltb. t.* 310. *f.* 400.
——— (æthiopica) *caule ramoſo, floribus ſubſpicatis, petalis bifidis obtuſis, foliis lanceolatis viſcidis.*
——— (ceraſtoides) *Linn. d. l. & herb. Oldenl.*

PENTAGYNIA.

COTYLEDON (orbiculata) *Herm. lugdb. t.* 551. *Moris. hiſt.* 3. *f.* 12. *t.* 7. *f.* 39.
——— (ſpuria) *Comm. rar. t.* 23. *Burm. afr. t.* 18. *t.* 19. *f.* 1. *& t.* 22. *f.* 1.
——— (hemiſphærica) *Dill. eltb. t.* 95. *f.* 111.
——— (laciniata) *Boerh. lugdb. t.* 288. *Plukn. t.* 228. *f.* 3. *Rumph. amb.* 5. *t.* 95.

COTYLEDON (caryophyllacea) *Burm. afr. t.* 17.
——— (ventricoſa) *ibid. t.* 21. *f.* 1.
——— (grandiflora) *ibid. t.* 20 *f.* 1.

SEDUM (capenſe) *caule fruticoſo articulato, foliis oppoſitis ſeſſilibus, in ſummo faſciculatis confertis.*

OXALIS (purpurea) *Ehret. pict. t.* 10. *f.* 92. *Breyn. cent. t.* 46. *Comm. H. Amſt.* 1. *t.* 21. *Burm. afr. t.* 27. *f.* 3. *Seb. theſ. t.* 22. *f.* 10.
——— (flava) *Burm. afr. t.* 27. *f.* 4. 5. *& t.* 30. *f.* 1.
——— (pes Capræ) *Mill. ic.* 195. *f.* 1. *Burm. afr. t.* 29.
——— (verſicolor) *Burm. afr. t.* 27. *f.* 1.
β *Plukn t.* 434. *f.* 5. *Burm. afr. t.* 27. *f.* 2.
——— (incarnata) *Comm. H. Amſt.* 1. *t.* 22.
——— (hirta) *Burm. afr. t.* 28. *f.* 2. *Seb. theſ.* 1. *t.* 22. *f.* 11.
β *Burm. afr. t.* 28. *f.* 1. *Plukn. t.* 434. *f.* 7.
——— (biflora) *Burm. afr. t.* 28. *f.* 3.

LYCHNIS (flos Cuculi) *Mill. ic.* 169. *f.* 2.
——— (dioica) *Till. piſ. t.* 41. *f.* 1.
ambæ in herb. Old. *occurrunt cum ſequentibus.*

CERASTIUM (viſcoſum) *Vaill. par. t.* 30. *f.* 1 *&* 3. *& herb. Old.*
——— (vulgatum) *Linn. ſp.* 627.

DODECANDRIA MONOGYNIA.

GETHYLLIS (afra) *Linn. ſp.* 633.

PORTULACA (Anacampſeros) *Dill. eltb. t.* 281. *f.* 363. *Comm H. Amſt.* 2. *t.* 89. *Burm. afr. t.* 30. *f.* 2.

TRIGYNIA.

RESEDA (capenſis) *caule fruticoſo, foliis linearibus ternis, apice mucronatis.*

EUPHORBIA (heptagona) *Boerh. lugdb. t.* 258. *Bradl. ſucc. t.* 13.

EUPHORBIA (mammillaris) *Comm. præl. t.* 9.

——— (cereiformis) *Burm. afr. t.* 9. *f.* 3. *Plukn. t.* 231. *f.* 1.

——— (officinarum) *Iſn. act.* 1720. *t.* 10. *Commel. H. Amſt.* 1. *t.* 11. *Seb. theſ.* 1. *t.* 19. *f.* 2.

——— (Caput meduſæ) *Comm. H. Amſt.* 1. *t.* 17. *præl. t.* 7 & 8. *Burm. afr. t.* 7. *f.* 2. *t.* 8. *t.* 9. *t.* 10. *f.* 1.

——— (viminalis) *Alp. ægypt. t.* 190. *Dill. eltb. t.* 368.

——— (mauritanica) *Dill. eltb. t.* 289. *f.* 373.

——— (hypericifolia) *Comm. præl. t.* 60.

huic affinem nuperrime ex Cap. B. Sp. accepimus, caule pedali herbaceo, umbella dichotoma, foliis ovalibus.

——— (tuberoſa) *Burm. afr. t.* 4. *Buxb. cent.* 2. *t.* 23.

——— (maculata) *herb. Old. Plukn. t.* 65. *f.* 8.

——— (geniſtoides) *inermis fruticoſa, umbella quinquefida, involucris orbiculatis, foliis oblongis mucronatis approximatis.*

——— (taxifolia) *inermis fruticoſa, ramis ſimplicibus, foliis linearibus.*

——— (exigua) *Linn. ſp.* 654.

——— (linifolia) *foliis alternis linearibus, umbellis trifidis, involucro ovato.*

ICOSANDRIA MONOGYNIA.

MYRTUS (capenſis) *pedunculis bifloris, foliis lanceolatis ſubtus tomentoſis.*

PENTAGYNIA.

TETRAGONIA (fruticoſa) *Comm. H. Amſt.* 2. *t.* 103. *Seb. theſ.* 2. *t.* 11. *f.* 8.

——— (herbacea) *Comm. H. Amſt.* 2. *t.* 102.

——— (lanceolata) *caule herbaceo, foliis ovato-lanceolatis, petiolis duplo longioribus.*

MESEMBRYANTHEMUM (cryſtallinum) *Dill. eltb. t.* 180. *f.* 221. *Bradl. ſucc. t.* 15.

——— (geniculiflorum) *Dill. eltb. t.* 205. *f.* 261. *Bradl. ſucc. t.* 27. *f.* 34. *Petiv. gazoph. t.* 78. *f.* 3.

——— (noctiflorum) *Dill. eltb. t.* 206. *f.* 262.

——— (ſplendens) *ibid. t.* 204. *f.* 260. *Bradl. ſucc. t.* 6.

——— (umbellatum) *Dill. eltb. t.* 208. *f.* 266. *Herm. par. t.* 166. *Bradl. ſucc. t.* 34. *Plukn. t.* 117. *f.* 1.

——— (calamiforme) *Mill. dict.* 176. *f.* 1. *Dill. eltb. t.* 186. *f.* 228. *Bradl. ſucc. t.* 19.

——— (Tripolium) *Dill. eltb. t.* 179. *f.* 220. *Bradl. ſucc. t.* 47. *Plukn. t.* 329. *f.* 4.

——— (bellidiflorum) *Dill. eltb. t.* 189. *f.* 233. β *Burm. afr. t.* 25.

——— (deltoides) *Dill. eltb. t.* 195. *f.* 246. *Volk. heſp. t.* 224. *f.* 5. β *Dill. eltb. t.* 196. *f.* 247. & *t.* 195. *f.* 243. 244.

——— (barbatum) *Mill. dict. t.* 176. *f.* 3. *Dill. eltb. t.* 190. *f.* 234. *Petiv. gaz. t.* 77. *f.* 6. *Bradl. ſucc. t.* 5. & 15. *Volk. heſp. t.* 124. *f.* 6.

——— (hiſpidum) *Dill. eltb. t.* 214. *f.* 278. & β. 279. 280. γ. 281.

——— (villoſum) *Linn. ſp.* 296.

——— (ſcabrum) *Dill. eltb. t.* 197. *f.* 250.

——— (emarginatum) *ibid. t.* 197. *f.* 250. *Petiv. gaz. t.* 77. *f.* 3.

——— (uncinatum) *Dill. eltb. t.* 193. *f.* 239. *Bradl. ſucc. t.* 27. *Burm. afr. t.* 27.

——— (ſpinoſum) *Dill. eltb. t.* 208. *f.* 265. *Bradl. ſucc. t.* 39.

——— (tuberoſum) *Dill. eltb. t.* 207. *f.* 264.

——— (tenuifolium) *ibid. t.* 201. *f.* 256. *Bradl. ſucc. t.* 9. *Moris. hiſt.* 3. *f.* 12. *t.* 8. *f.* 6.

——— (ſtipulaceum) *Dill. eltb. t.* 209. *f.* 267. 268.

ME-

Mesembryanthemum (craſſifolium) *Dill. eltb. t.* 201. *f.* 257. *Bradl. ſucc. t.* 38.
——— (falcatum) *Dill. eltb. t.* 213. *f.* 276.
——— (glomeratum) *ibid. t.* 213. *f.* 274.
——— (loreum) *ibid. t.* 200. *f.* 255.
——— (filamentoſum) *ibid. t.* 211. *f.* 273.
——— (acinaciforme) *ibid. t.* 211. *f.* 270. *t.* 212. *f.* 271.
——— (forficatum) *Linn. ſp.* 695.
——— (edule) *Dill. eltb. t.* 212. *f.* 272. *Herm. lugdb. t.* 245. *Moris. biſt.* 3. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 1.
——— (bicolorum) *Mill. dict. t.* 177. *f.* 1. *Dill. eltb. t.* 202. *f.* 258. *Herm. lugdb. t.* 249. *Bradl. ſucc. t.* 7. *Moris. biſt.* 3. *t.* 6. *f.* 4.
——— (ſerratum) *Dill. eltb. t.* 192. *f.* 238.
——— (micans) *ibid. t.* 215. *f.* 282. *Petiv. gaz. t.* 7. *f.* 9. *Bradl. ſucc. t.* 8.
——— (roſtratum) *Dill. eltb. t.* 186. *f.* 229.
——— (veruculatum) *ibid. t.* 203. *f.* 259.
——— (glaucum) *ibid. t.* 196. *f.* 248. *Moris. biſt.* 3. *ſ.* 12. *t.* 6. *f.* 3. *Bradl. ſucc. t.* 37. *Herm. lugdb. t.* 248.
——— (corniculatum) *Dill. eltb. t.* 199. *f.* 253 & 254. *Petiv. gaz. t.* 77. *f.* 10. *Bradl. ſucc. t.* 40.
——— (expanſum) *Dill. eltb. t.* 182. *f.* 223. *Petiv. gaz. t.* 78. *f.* 10. *Bradl. ſucc. t.* 16.
——— (tortuoſum) *Dill. eltb. t.* 133. *f.* 222. *Bradl. ſucc. t.* 16.
——— (pomeridianum) *Linn. ſp.* 698. *ubi deſcr.*
——— (ringens) *Mill. dict. t.* 177. *f.* 2.
——— ß (caninum) *Dill. eltb. t.* 188. *f.* 231. *Bradl. ſucc. t.* 17.
——— γ (felinum) *Dill. eltb. t.* 187. *f.* 230. *Mart. cent. t.* 30.

Mesembryanthemum (dolabriforme) *Dill. eltb. t.* 191. *f.* 237. *Bradl. ſucc. t.* 10.
——— (difforme) *Dill. eltb. t.* 194. *f.* 241 & 242. *Mill. dict. t.* 176. *f.* 2. *Plukn. t.* 325. *f.* 4.
——— (albidum) *Dill. eltb. t.* 189. *f.* 232. *Bradl. ſucc. t.* 43.
——— (linguæforme) *Dill. eltb. t.* 183. *f.* 224. 226. 227.
——— (pugioniforme) *ibid. t.* 210. *f.* 269. *Bradl. ſucc. t.* 14.
——— (bellidiforme) *acaulos, foliis planis oblongis, pedunculis radicalibus aphyllis unifloris. absque nomine in herb. Old. cum pluribus congeneribus continetur.*

Aizoon (paniculatum) *Linn. ſp.* 700.
——— (hiſpanicum) *Dill. eltb. t.* 117. *f.* 143. *Capenſis villoſa tota.*

POLYGYNIA.

Rubus (fruticoſus) *Linn. ſp.* 707. *herb. Old.*

Fragaria (veſca) *ibid.* 709.

Potentilla (norwegica) *herb. Old.*

POLYANDRIA MONOGYNIA.

Papaver (multiflorum) *caule ſubnudo multifloro lævi, foliis lanceolatis eroſo-dentatis.*
——— (ſomniferum) *Linn. ſp.* 726. & *Old. herb.*
——— (nudiflorum) *ibidem.*
——— (nudum) *capſulis hiſpidis, caule nudo unifloro, foliis ovato-lanceolatis, denticulis longioribus.*

Ochna (ſquarroſa) *Plukn. t.* 263. *f.* 1. 2.

Cistus (capenſis) *Linn. ſp.* 736. *herb. Old.*
——— (laurifolius) *ibidem.*
——— (ſalvifolius) *ibidem.*
——— (halimifolius) *ibidem.*

Corchorus (olitorius) *Camer. hort. t.* 12.

Aquilegia (vulgaris) *Linn. ſp.* 752. & *herb. Old.*

Nigella (ſativa) *ibid.* 753. & *herb. Old.*
——— (arvenſis) *ibidem.*

POLYANDRIA POLYGYNIA.

ANNONA (africana) *Linn. ſp.* 758.

ATRAGENE (capenſis) *Burm. afr. t.* 52.

THALICTRUM (cornuti) *berb. Old. Corn. Can. t.* 186.

ANEMONE (coronaria) *Linn. ſp.* 761. *& berb. Old.*

ADONIS (capenſis) *Burm. afr. t.* 51. *Comm. H. Amſt.* 1. *t.* 1. *Plukn. t.* 95. *f.* 2.
Magnitudine totius plantæ & foliorum forma, tum & glabritie & birſutie conſtanter differunt, ut ex citatis iconibus & variis ſpeciminibus mihi apparuit, hinc diſtinctæ videntur ſpecies.

RANUNCULUS (repens) *Linn. ſp.* 779. *& berb. Old.*

—— —— (ſceleratus) *ibid. p.* 776.

—— —— (lanuginoſus) *C. Baub. prodr. t.* 96. *& berb. Old*

—— —— (acris) *Linn. ſp.* 779. *& berb. Old.*

DIDYNAMIA GYMNOSPERMA.

TEUCRIUM (mauritanum) *Shaw. afr. t.* 5. *f.* 75. *Corn. can. t.* 123.

—— —— (lucidum) *Magn. bort. t.* 52. *berb. Old.*

HYSSOPUS (officinalis) *berb. Old. Linn. ſp.* 796.

—— —— (nepethoides) *Plukn. t.* 150. *f.* 3. *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 11. *t.* 4. *f.* 11. *& berb. Old.*

NEPETA (cataria) *Linn. ſp.* 796. *& berb. Old.*

SATUREJA (hortenſis) *Linn. ſp.* 795 *& berb. Old.*

THYMBRA (ſpicata) *berb. Old. Plukn. t.* 116. *f.* 15.

MENTHA (rotundifolia & longifolia) *binæ allatæ ſunt plantæ, quæ Menthæ odorem ſpirant, ſed quæ fructificatione perfecta carent.*

LAMIUM (Orvala) *Till. piſ. t.* 34. *f.* 1.

BETONICA (capenſis) *Plukn. t.* 315. *f.* 3.

STACHYS (æthiopica) *verticillis ſexfloris, foliis cordato-ovatis crenatis.*

—— (arvenſis) *Herm. lugdb. t.* 353. *& berb. Old.*

MARRUBIUM (africanum) *Comm. H. Amſt.* 2. *t.* 90.

—— —— (peregrinum) *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 11. *t.* 9. *f.* 8. *& berb. Old.*

—— —— (Pſeudo Dictamnus) *Linn. ſp.* 817.

PHLOMIS (Leonurus) *Breyn. cent. t.* 86. *Seb. thes.* 1. *t.* 14. *f.* 1. *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 11. *t.* 19. *f.* 17.

—— —— (zeylanica) *Plukn. t.* 118. *f.* 4.

—— —— (nepetæ folia) *Herm. lugdb. t.* 117.

—— —— (ocymifolia) *foliis ovatis crenatis, calycibus octodentatis.*

ORIGANUM (ſipyleum) *Herm. lugdb. t.* 463. *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 11. *t.* 4. *f.* 2.

—— —— (ſyriacum) *Lob. ic.* 499. *& berb. Old.*

—— —— (Majorana) *Lob. ic.* 498.

THYMUS (vulgaris) *tenuifolia & latifolia berb. Old. Linn. ſp.* 825.
γ birſutiſſimus foliis ovatis. Moris. hiſt. 3. *ſ.* 11. *t.* 18. *f.* 9.

—— (Serpillum) *Linn. ſp.* 825. *& berb. Old.*

HORMINUM (folioſum) *Linn. fl. cap.*

PRUNELLA (hyſſopifolia) *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 2. *t.* 5. *f.* 7.

PRASIUM (majus) *Zan. hiſt. bot. t.* 46. *& berb. Old.*

ANGIOSPERMA.

EUPHRASIA (capenſis) *foliis ovato-dentatis.*

ANTIRRHINUM (capenſe) *Burm. afr. t.* 75. *f.* 3.

—— —— (chalepenſe) *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 5. *t.* 35. *f.* 9. *Triumf. obſ. t.* 87. *f.* 2.

—— —— —— (ſpurium) *Linn. fl. cap.* 15.

SCROPHULARIA (canina) *Linn. ſp.* 865. *& berb. Old.*

SCRO-

HALLERIA (lucida) *Burm. afr. t.* 89. *f.* 1. 2.
LANTANA (ſalvifolia) *Linn. ſp.* 875.
——— (africana) *Comm. rar. t.* 6.
SELAGO (corymboſa) *Comm. H. Amſt.* 2. *t.* 40.
——— (pinaſtra) *Comm. H. Amſt.* 2. *t.* 110.
——— (rapunculoides) *Burm. afr. t.* 42. *f.* 1.
——— (coccinea) *Linn. ſp.* 877.
——— (ſpuria) *Burm. afr. t.* 42. *f.* 3.
——— (Lychnidea) *Burm. afr. t.* 49. *f.* 4.
——— (tomentoſa) *Plukn. t.* 319. *f.* 2. *differt foliis ovalibus & oblongis crenatis.*
——— (dubia) *Burm. afr. t.* 44. *f.* 3. *Plukn. t.* 445. *f.* 6. *cujus plures occurrunt varietates.*
——— (teucriifolia) *ramoſa, foliis ovatis ſerratis, floribus terminalibus ſeſſilibus.*
——— (prunaſtri) *Plukn. t.* 431. *f.* 1.
——— (ericoides) *ſpicis ſeſſilibus terminalibus, foliis decuſſatis rigidis ovatis.*
——— (abietina) *caulibus proſtratis nudis, ramulis folioſis ſimplicibus, foliis imbricatis minutiſſimis, ſpicis capitatis ſeſſilibus.*
——— (ſpinoſa) *ſpicis ovatis terminalibus, foliis linearibus, ramorum ſubimbricatis, ramis apice ſpinoſis.*
HEBENSTRETIA (dentata) *Burm. afr. t.* 42. *f.* 2. *Comm. H. Amſt.* 2. *t.* 109.
——— (integrifolia) *Linn. ſp.* 878.
——— (ſcabrida) *Burm. afr. t.* 41. *f.* 1.
ERINUS (africanus) *Burm. afr. t.* 50. *f.* 1.
——— (umbellatus) *Burm. afr. t.* 50. *f.* 2.
——— (peruvianus) *Few. peruv.* 3. *t.* 25. *f.* 3.
BUCHNERA (africana) *Plukn. t.* 310. *f.* 3.
——— (capitata) *foliis radicalibus lanceolatis integerrimis, caule nudo ſimplici, floribus capitatis.*
SIBTHORPIA (africana) *Shaw. afr. f.* 149.
OROBANCHE (capenſis) *ſcapo longiſſimo inflexo, ſtaminibus exſertis.*
LIPPIA (ovata) *capitulis ovatis, foliis linearibus integerrimis.*
Frutex caule pedali proſtrato, nodis piſiformibus adſperſo, ramis teretibus. Folia ſparſa linearia ſubſucculenta lævia, ex ſingulis alis plura minora interdum ternata. Strobilus ovatus terminalis, bracteis ovatis glabris imbricatis undique, calyce longioribus, apice reflexis. cal. tubuloſus quinquedentatus. cor. infundibuliformis quinquefida atroviolacea. ſtam. intra tubum didyma. Piſt. germen unicum, ſtigma ſimplex.
SESAMUM (capenſe) *foliis inferioribus quinquefidis, ſuperioribus trifidis undulatis.*
VOLKAMERIA (capenſis) *inermis, foliis alternis ovatis, floribus pedunculatis axillaribus.*
MELIANTHUS (major) *Herm. lugdb. t.* 415.
——— (minor) *Comm. rar. t.* 4.

TETRADYNAMIA SILICULOSA.

LEPIDIUM (ruderale) *Linn. ſp.* 900. *& herb. Old.*
THLASPI (africanum) *ſiliculis ſubovatis, foliis lanceolatis ſerrulatis glaberrimis.*
IBERIS (ſemperflorens) *Seb. theſ.* 1. *t.* 13. *f.* 4. *Boccon. ſic. t.* 22. *f.* 1. *herb. Old. ubi etiam occurrit.*
——— (ſempervirens) *Barr. ic.* 214.

SILIQUOSA.

CARDAMINE (africana) *Herm. par. t.* 202. *Plukn. t.* 101. *f.* 5.
SISYMBRIUM (ſylveſtre) *Linn. ſp.* 916. *& herb. Old.*
——— (lyratum) *foliis inferioribus ſublyratis, ſuperioribus inciſo-laciniatis, ſiliquis linearibus obtuſiuſculis.*

Cheiranthus (incanus) *Linn. ſp.* 924. *& herb. Old.*

Heliophila (integrifolia) *Herm. lugdb. t.* 365.

——— (coronopifolia) *Herm. lugdb. t.* 367. *Seb. theſ. t.* 17. *f.* 5. *Plukn. t.* 200. *f.* 3.
differunt ambæ ſpecies foliis anguſtioribus & latioribus, glabris & birſutis.

Hesperis (matronalis) *Linn. ſp.* 927. *& herb. Old.*

——— (africana) *Bocc. ſic. t.* 2. *f.* 1.

Arabis (capenſis) *Herm. lugdb. t.* 367. *Plukn. t.* 432. *f.* 2.

Sinapis (lævigata) *Linn. ſp.* 234.

——— (alba) *ſiliqua birſuta herb. Old.*

Cleome (capenſis) *Linn. ſp.* 940.

MONADELPHIA PENTANDRIA.

Hermannia (althææfolia) *Petiv. gaz. t.* 34. *f.* 2. *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 79.

——— (alnifolia) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 78. *quæ foliis oblongis & rotundis differt.*

——— (trifurcata) *Volk. norimb. t.* 24.

——— (hyſſopifolia) *Volk. norimb. t.* 24.
quæ foliis latioribus & anguſtis ſæpe variat.

——— (lavendulæfolia) *Dill. eltb. t.* 147. *f.* 176.

——— (trifoliata) *Linn. ſp.* 942.

——— (triphylla) *Linn. ſp.* 942. *fl. cap.* 25.

——— (groſſularifolia) *Commel. rar. t.* 7.
quæ diverſa admodum foliorum inciſuris.

——— (pinnata) *Plukn. t.* 344. *f.* 3.
quæ foliis faſciculatis, ternatis & quinatis, ramis ſecundis, in diverſis ſpecíminibus variat.

——— (linifolia) *foliis ſparſis linearibus, pedunculis unifloris.*

——— (cærulea) *foliis lanceolatis, floribus racemoſis ſecundis.*

DECANDRIA.

Geranium (fulgidum) *Dill. eltb. t.* 130. *f.* 137. *Till. piſ. t.* 26.

——— (inquinans) *Dill. eltb. t.* 125. *f.* 151. *Mart. cent. t.* 3.

——— (papilionaceum) *Dill. eltb. t.* 128. *f.* 155. *Mart. cent. t.* 15.

——— (betulinum) *Burm. afr. t.* 33. *f.* 1. 2. *Plukn. t.* 415. *f.* 3.

——— (ſcabrum) *Burm. geran. t.* 1. *n.* 39.
quæ magnitudine foliorum & petiolis admodum differt, nuperque tranſmiſſa fuit varietas, foliis ſeſſilibus confertis adpreſſis plicatis.

——— (cucullatum) *Dill. eltb. t.* 129. *f.* 156. *Herm. lugdb. t.* 275. *Seb. theſ. t.* 26. *f.* 2. *Mart. cent. t.* 28.

——— (fimbriatum) *Burm. geran. n.* 42.

——— (gibboſum) *Herm. lugdb. t.* 285. *Burm. afric. t.* 37. *f.* 2.

——— (carnoſum) *Dill. eltb. t.* 127. *f.* 154.

——— (peltatum) *Mill. dict. t.* 140. *Commel. præl. t.* 2.

——— (acetoſum) *Commel. præl. t.* 4.

——— (zonale) *Commel. præl. t.* 1.

——— (vitifolium) *Dill. eltb. t.* 126. *f.* 153.

——— (capitatum) *Herm. lugdb. t.* 278.

——— (tabulare) *Burm. geran. t.* 1. *n.* 44.

——— (alchimilloides) *Herm. lugdb. t.* 283. *Stiſſ. bot. t.* 107.

——— (odoratiſſimum) *Dill. eltb. t.* 131. *f.* 138.

——— (alceoides) *Mart. cent. t.* 16.

——— (molle) *Vaill. paris. t.* 15. *f.* 3. *& herb. Old.*

——— (groſſularioides) *Herm. lugdb. t.* 289.
β hujus varietas ribeſioides *herb. Old.*

——— (altheoides) *Linn. ſp.* 949.

——— (coriandrifolium) *Rivin. pent. t.* 106. *Herm. lugdb. t.* 282.

Ger.

Geranium (incanum) *Burm. geran.* 26. *Plukn. t.* 186. *f.* 4.

—— (ovale) *calycibus monophyllis, foliis ovalibus crenatis planis tomentoſis, petiolis longiſſimis, caule ſuffruticoſo proſtrato.*

—— (hirtum) *Burm. geran. t.* 1. *n.* 64.

—— (myrrhifolium) *Herm. lugdb. t.* 281. *par.* 178. *Breyn. cent. t.* 59.

—— (prolificum) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 36.

—— (proliferum) *Burm. geran. t.* 2. *n.* 70.

—— (pinnatum) *Commel. præl. t.* 3.

—— (auritum) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 61.

—— (longifolium) *Burm. geran. t.* 2. *n.* 67.

—— (oxaloides) *Burm. t.* 2. *n.* 71. 1765 *in prædio floruit ejuſdem magnitudinis varietas foliis ovali-oblongis.*

—— (lobatum) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 62.

—— (hirſutum) *Burm. geran. t.* 2. *n.* 68.

—— (pinnatifidum) *Burm. geran. t.* 2. *n* 69.

—— (triſte) *Corn. canad. t.* 110. *Breyn. cent. t.* 58. α *geifolium cum var.* β *daucifolium cum varietatibus.*

—— (arenarium) *Burm. geran. n.* 63.

—— (maritimum) *Plukn. t.* 31. *f.* 4.

—— (malacoides) *Lob. ic.* 662.

—— (lupinoides) *Burm. geran. n.* 65.

—— (glaucum) *ibidem. t.* 2. *n.* 62.

—— (arduinum) *Linn. ſp.* 952.

—— (columbinum) *Vaill. pariſ. t.* 15. *f.* 3. & *herb. Old.*

—— (incanum) *Burm. geran. t.* 1. *n.* 26.
β *Plukn. t.* 186. *f.* 4. *licet foliatura diverſa.*

—— (ferulaceum) *Burm. geran. n.* 72.

Geranium (incarnatum) *Burm. afr. t. t.* 34. *f.* 2.

—— (hermannioides) *pedunculis multifloris, floribus linearibus, foliis pinnatis, foliolis linearibus ſubfalcatis, caule fruticoſo.*
Habitus Hermanniæ pinnatæ, floreſcentia ut in Geranio *ſcabro.*

—— (ſtrigoſum) *calycibus ſtrigoſis, foliis bipinnatifidis planiuſculis.*

—— (rapaceum) *calycibus monophyllis, foliis laciniatis hirtis, ſcapis radicalibus aphyllis.*
Rad. bulbus ovatus. Fol. radicalia multa petiolata oblonga varie ſinuata, ſeu laciniata hirta, facie Papaveris erratii, petiolis longis, baſi dentibus binis ſeu ſtipulis duabus adnatis, caul. nullus, ſed ſcapi radicales, foliis duplo longiores pubeſcentes aphylli. Involucrum polyphyllum reflexum. Flores numeroſi violacei.
β *foliis latioribus, floribus purpureis.*

—— (flavum) *calycibus monophyllis, foliis alternatim pinnatis, foliolis pinnatifidis, ſcapis radicalibus hirtis aphyllis.*
floruit in prædio noſtro 1760.
Rad. bulbus ovatus. Fol. ſingulari modo pinnata, foliolis trifariam alternis ſubpinnatifidis inſtar Dauci, pilis albicantibus hirta. Scapi radicales aphylli hirti, involucrum polyphyllum reflexum. Flores numeroſi lutei cal. per. monophyllum, laciniis duabus ſuperioribus majoribus. cor. papilionacea, petalis duobus ſuperioribus adſcendentibus, mediis concavis ſibi mutuo appreſſis, in incipiente floreſcentia petalum inferius includentibus, genitalia uti in reliquis africanis.

—— (grandiflorum) *Burm. afric. t.* 34. *f.* 1.
differt a reliquis hujus terræ Geraniorum *ſpeciebus, calyce monophyllo patente baſi non tubuloſo, ſtaminibus æqualibus, piſtillis quinque diſtinctis nec in roſtrum coalitis. Germina ſubulata vix ſtyli veſtigium habent, & ſingulorum ſtigma eſt verruciforme.*

Geranium (ſpinoſum) *Burm. afr. t.* 31. *differt a congeneribus, calyce quinque-phyllo, ſtaminibus decem æqualibus, antheris ovatis verſatilibus. hinc ambæ hæ ſpecies ſub aliis generibus militare debent.*

POLYANDRIA.

Sida (cordifolia) *Dill. elth. t.* 171. *f.* 209. *Plukn. t.* 131. *f.* 2.
—— (ſpinoſa) *Commel. H. Amſt.* 1. *t.* 2. *& herb. Old.*
Malva (capenſis) *Dill. elth. t.* 196. *f.* 206 *&* 207.
—— *β* (ſcabroſa) *Commel. H. Amſt.* 2. *Plukn. t.* 431. *f.* 5.
—— (verticillata) *Linn. ſp.* 970. *& herb. Old.*
Urena (ſinuata) *Burm. zeyl. t.* 69. *f.* 2. *Plukn. t.* 5. *f.* 3.
Hibiscus (mutabilis) *Rumph. amb.* 4. *t.* 9. *Rheed. mal. t.* 38.. 40. *Ferr. fl. cult. t.* 497. *Merian. ſurin. t.* 31. *& herb. Old.*
—— (Sabdariffa) *Plukn. t.* 6. *f.* 2.
—— (Trionum) *Lob. ic.* 656.

DIADELPHIA HEXANDRIA.

Fumaria (officinalis) *Linn. ſp.* 984.
—— (veſicaria) *Plukn. t.* 335. *f.* 3. *Boerh. lugdb. t.* 310.
Monnieria (trifolia) *Linn. ſp.* 986. *plantæ capenſis caulis ſpinulis undique exaſparatus.*

OCTANDRIA.

Polygala (bracteolata) *Plukn. t.* 52. *f.* 2. *Burm. afr. t.* 73. *f.* 2. *&* 4. *β Breyn. cent. t.* 49. *Burm. afr. t.* 73. *f.* 2. 3. 4. *& glabra. Plukn. t.* 404. *f.* 6. *differt foliis linearibus, lanceolatis, floribus albis & purpuraſcentibus.*
—— (myrtifolia) *Commel. H. Amſt.* 1. *t.* 46. *Burm. afr. t.* 73. *f.* 1. *Plukn. t.* 437. *f.* 4. *variat foliis obtuſiuſculis & acuminatis, floribus albis & purpureis.*
—— (ſpinoſa) *Linn. ſp.* 989.
—— (Heiſteria) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 97. *Seb. theſ.* 2. *t.* 62. *f.* 8. *Plukn. t.* 229. *f.* 5. *foliis eſt lanceolatis linearibus pungentibus ſcabris & piloſis.*
—— (ſtipulacea) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 97. *foliis planis nec pungentibus ab Heiſteria differt.*
—— (pinnata) *floribus inberbibus, ramulis ſecundis, foliis pinnatis, pinnis ſimplicibus linearibus quinquejugis.*
—— (triphylla) *floribus imberbibus, foliis ternis, foliolis cuneiformibus.*
—— (ericoides) *floribus imberbibus, foliis ovato-linearibus adpreſſis. Fol. magnitudine foliorum Ericæ, cauli adpreſſa ſtricta.*

DECANDRIA.

Erythrina (Corallodendron) *Commel. H. Amſt.* 1. *t.* 108. *Rumph. amb.* 2. *t.* 76. *ex ſeminibus capenſibus ſæpe progerminavit.*
Borbonia (ericæfolia) *Linn. ſp.* 993. *fl. cap.* 29.
—— (trinervia) *Plukn. t.* 297. *f.* 4.
—— (lanceolata) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 98. *Plukn. t.* 297. *f.* 3.
—— (cordata) *Seb. theſ.* 1. *t.* 24. *f.* 3. *Breyn. cent. t.* 28.
—— (crenata) *Breyn. cent. t.* 28.
—— (tomentoſa) *Seb. theſ.* 1. *t.* 24. *f.* 2. *magnitudine variat, ſæpeque glabra occurrit.*
—— (lævigata) *Plukn. t.* 414. *f.* 1.
Spartium (ſepiarium) *ibid. t.* 424. *f.* 1.
—— (capenſe) *ibid. t.* 412. *f.* 3. *variat foliis latioribus.*
—— (pinaſtrifolium) *ramis glaberrimis, foliis filiformibus confertis appreſſis, floribus ſpicatis. β foliis ternis. Plukn. t.* 298. *f.* 1. *differt a* ſepiario *foliis ab omni parte caulis approximatis rigidiuſculis, ſpica florum longiore.*

Ge-

Genista (myrtifolia) *foliis lanceolatis glabris, ramis teretibus ſtriatis, pedunculis cum calyce villoſis, floribus capitatis.*
ß bini ex involucro exeunt pedunculi involucrati triflori.
——— (buxifolia) *foliis ovatis glabris, ramis teretibus, floribus terminalibus.*
——— (cotinifolia) *Plukn. t.* 414. *f.* 2.
——— (laricifolia) *foliis filiformibus faſciculatis, floribus ſolitariis & binis. ß Plukn. t.* 31. *f.* 3.
Asphalathus (ſpinoſa) *Breyn. cent. t.* 26.
——— (aſtroites) *Plukn. t.* 413. *f.* 3. *Seb. theſ.* 1. *t.* 24. *f.* 6.
——— (capitata) *Linn. ſp.* 1000. *fl. cap.* 30.
——— (chenopoda) *Breyn. cent. t.* 11. *Seb. theſ.* 1. *t.* 23. *f.* 4.
——— (thymifolia) *Plukn. t.* 413. *f.* 1.
——— (ericæfolia) *ibid. t.* 413. *f.* 6.
——— (verrucoſa) *Linn. ſp.* 1001.
——— (retroflexa) *ibidem.*
——— (uniflora) *Plukn. t.* 413. *f.* 7.
——— (araneoſa) *Plukn. t.* 414. *f.* 4. *Seb. theſ.* 1. *t.* 23. *f.* 6.
——— (quinquefolia) *Plukn. t.* 278. *f.* 4.
——— (cretica) *Zanon. hiſt. t.* 39.
——— (tridentata) *Linn. ſp.* 1002.
——— (anthylloides) *ibidem.*
——— (argentea) *ibidem.*
——— (calloſa) *Plukn. t.* 345. *f.* 4.
——— (pinnata) *Linn. ſp.* 1003. *fl. cap.* 32.
——— (faſcicularis) *foliis quinis ſeſſilibus breviſſimis papilloſis imbricatis, floribus axillaribus.*
Crotalaria (perforata) *Linn. ſp.* 1003. *fl. cap.* 38.
——— (amplexicaulis) *Seb. theſ.* 1. *t.* 24. *f.* 5.
——— (imbricata) *Linn. ſp.* 1004.
——— (retuſa) *Herm. lugdb. t.* 201. *Rumph. amb.* 5. *t.* 96. *f.* 1.
Crotalaria (triflora) *Linn. ſp.* 1004.
——— (lunaris) *ibid.*
——— (laburnifolia) *herb. Old. Herm. lugdb. t.* 197.
——— (villoſa) *Plukn. t.* 185. *f.* 2. *Herm. lugdb. t.* 271.
——— (ſpinuloſa) *foliis alternis orbiculatis amplexicaulibus ſcabriuſculis, margine ſpinuloſis, floribus terminalibus. an Plukn.* 387. *f.* 6.
Ononis (cernua) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 82. *Linn. fl. cap.* 42.
——— (capenſis) *Linn. ſp.* 1011. *fl. cap.* 41.
——— (æthiopica) *racemis ſpicatis terminalibus longis, leguminibus toroſis pendulis, foliis ternatis ellipticis.*
——— (ſtrigoſa) *floribus axillaribus ſeſſilibus, foliis ternatis cuneiformibus villoſis, ſtipulis ariſtatis, ramis ſtrigoſis.*
——— (virgata) *floribus lateralibus, foliis ternatis ovato-cuneiformibus glabris.*
in utriſque flores puſilli laterales lutei.
——— (proſtrata) *caulibus ſimplicibus diffuſis, foliis oblongis hirtis, floribus axillaribus.*
Anthyllis (aſphaltoides) *Linn. ſyſt.* 1160. *cent.* 183.
——— (ononides) *ſuffruticoſa, foliis ternatis obovatis, capitulis terminalibus pedunculatis.*
Lupinus (integrifolius) *Linn. ſp.* 1016.
Phaseolus (inamoenus) *ibid.* 1016.
——— (capenſis) *caule erecto geniculato ſtriato, leguminibus compreſſis planis, foliis ovato-lanceolatis.*
Dolichos (capenſis) *Linn. ſp.* 1020.
——— (minimus) *Burm. zeyl. t.* 84. *f.* 2. & *herb. Oldenl.*
——— (lignoſus) *Rumph. amb.* 5. *t.* 136. & *herb. Oldenl.*
Glycine (bituminoſa) *Herm. lugdb. t.* 493.
——— (proſtrata) *caule glabro proſtrato, foliis ternatis uno verſu poſitis.*
Lathyrus (ſativus) *Linn. ſp.* 1030.

VICIA (benghalenſis) *Herm. lugdb. t.* 675.

—— (lathyroides) *Herm. par.* 242. *Oed. dan. t.* 58.

—— (ſativa) *Linn. ſp.* 1037. & *herb. Old.*

—— (peregrina) *Plukn. t.* 233. *f.* 6. & *herb. Old.*

ARACHIS (africana) *caule nullo, foliolis oblongis, foliis ternatis, petiolis longiſſimis, pedunculis radicalibus breviſſimis.*

ERVUM (Ervilia) *Linn. ſp.* 1040. & *herb. Old.*

—— (hirſutum) *ibidem.*

CYTISUS (æthiopicus) *ibid.* 1042.

—— (pſoraloides) *Plukn. t.* 320. *f.* 3.

—— (hirtus) *pedunculis terminalibus, calycibus hirſutis ventricoſis, foliis ternis linearibus.*

ROBINIA (capenſis) *racemis ſimplicibus axillaribus, foliis pinnatis cum impari, ſtipulis geminis.*

COLUTEA (arboreſcens) *Commel. rar. t.* 11.

—— (fruteſcens) *Breyn. cent. t.* 29. *Mill. ic.* 99.
foliatura & creſcendi modo valde differt.

—— (herbacea) *Commel. H. Amſt. t.* 44. *Volkam. norimb. t.* 118.
& hæc foliorum magnitudine variat.

ULEX (capenſis) *Petiv. gaz. t.* 83. *f.* 9. *Plukn. t.* 185. *f.* 6.

CORONILLA (Emerus) *Linn. ſp.* 1046. *herb. Old.*

—— (juncea) *Barr. ic.* 133. *herb. Old.*

—— (argentea) *Linn. ſp.* 1047. *herb. Old.*

—— (varia) *ibidem.*

—— (myrtifolia) *herbacea, foliis ſeptenis ovato-lanceolatis nervoſis, leguminibus ſolitariis.*

—— (thymifolia) *ſuffruticoſa, foliis lanceolatis concavis, capitulis terminalibus ſexfloris.*

ORNITHOPUS (perpuſillus) *Linn. ſp.* 1049. & *herb. Old.*

HEDYSARUM (capenſe) *foliis ternatis cuneiformibus emarginatis, leguminibus monoſpermis glabris.*

INDIGOFERA (racemoſa) *Linn. ſp.* 1062.

GALEGA (officinalis) *Moris. hiſt.* 2. *ſ.* 2. *t.* 7. *f.* 9.

ASTRAGALUS (ſeſameus) *Plukn. t.* 79. *f.* 3. *Columm. ecphr. t.* 301. & *herb. Old.*

PSORALEA (pinnata) *Herm. lugdb. t.* 213. *Rivin. tetr. t.* 5.

—— (aculeata) *Plukn. t.* 387. *f.* 6.

—— (hirta) *Linn. ſp.* 1074. *fl. cap.* 35.

—— (tenuifolia) *Linn. ſp.* 1074.

—— (aphylla) *Breyn. cent. t.* 25.

—— (cytiſoides) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 84. *Plukn. t.* 185. *f.* 5.

—— (ononides) *foliis ternatis, foliolis obovatis, floribus axillaribus ſpicatis, pedicellis alternis bifloris.*

—— (proſtrata) *Linn. amoen.* 6. *t.* 93.

—— (linearis) *foliis ſimplicibus linearibus cum acumine, floribus terminalibus ternis.*

TRIFOLIUM (Melilotus indica) *Plukn. t.* 45. *f.* 4 & 5.

—— (repens) *Rivin. tetr. t.* 17. & *herb. Old.*

—— (proſtratum) *caulibus procumbentibus, foliis cuneiformibus emarginatis, calycibus ſtrigoſis ariſtatis.*

—— (fruticans) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 106.

LOTUS (proſtratus) *Linn. ſp.* 1090.

—— (jacobæus) *Mill. dict. t.* 168. *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 83.

—— (mauritanicus) *Linn. ſp.* 1091.

—— (fruticoſus) *caule fruteſcente ſtriato, foliis ternis ovato-lanceolatis, capitulis aphyllis pedunculatis.*

—— (ſuffruticoſus) *caule filiformi proſtrato, foliolis quinis linearibus, pedunculis capillaribus bifloris, leguminibus linearibus minimis.*

—— (tenuifolius) *leguminibus ſubbinatis, foliis ternatis capillaribus, caule ſuffruticoſo.*

LOTUS (alopecuroides) *caule fruticoſo, foliis quinis ovatis, pedunculis axillaribus filiformibus, floribus capitatis.*

——? (villoſus) *caule proſtrato, foliis obovatis ternis, capitulis ſeſſilibus villoſis.*

—— (creticus) *Plukn. t.* 43. *f.* 1. *herb. Old.*

—— (hirſutus) *Moris. hiſt.* 2. *t.* 18. *f.* 14. & *herb. Old.*

MEDICAGO (polymorpha) *Linn. ſp.* 1097. *plures hujus varietates in herb.* Old. *occurrunt.*

—— (radiata) *Moris. hiſt.* 2. *t.* 16. *f.* 3.

POLYADELPHIA DODECANDRIA.

MONSSONIA (grandiflora) *Geranium Breyn. prodr. t.* 21. *f.* 2.
Rad. lignoſa. Folia radicalia petiolata quinata, foliola linearia pinnata, pinnis ſublaciniatis. ſcapi duo vel tres uniflori ſpithamei, foliis duplo longiores, in medio cincti involucro parvo hexaphyllo, foliolis lanceolatis; flos inſtar Anemones. cal. perianth. pentaphyllum erectum perſiſtens, foliolis lanceolatis æqualibus ſub apice mucronatis. Cor. petala quinque obovata æqualia, calyce duplo longiora. Stam. filamenta quinque, calyce paullo breviora lanceolata ſemitrifida. antheræ ſingulis filamentis tres oblongæ. Piſt. germen pentagonum breve. ſtylus columnaris longitudine ſtaminum. ſtigmata quinque oblonga ſubcylindrica æqualia colorata.

SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

TRAGOPOGON (picroides) *Linn. ſp.* 1111. & *herb. Old.*

SONCHUS (oleraceus) *cum varietatibus Linn. ibidem.*

LACTUCA (ſativa) *Linn. ſp.* 1118.

LEONTODON (Taraxacum) *folio anguſtiore. ibid.* 1122.

—— (autumnale) *ibid.* 1123.

HIERACIUM (capenſe) *Linn. ſp.* 1127.

ANDRYALA (lanata) *Dill. elth. t.* 150. *f.* 180. *Mill. ic.* 146. *f.* 1.

CICHORIUM (Intybus) *Linn. ſp.* 1142.

CARDUUS (criſpus) *Loeſl. pruſſ. t.* 5.

—— (marianus) *Linn. ſp.* 1154.

CYNARA (Carbunculus) *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 7. *t.* 33. *f.* 7.
Omnes huc uſque enumeratæ plantæ in Oldenl. herbario inveniuntur, dubitandum tamen, num pro genuinis incolis habendæ, vel an potius cum quibusdam aliis enumeratis per ſemina ex Europa illuc miſſa propagatæ fuere.

CARLINA (atractyloides) *Plukn. t.* 273. *f.* 4.

—— (ſcabra) *caule folioſo, foliis lanceolatis dentato-lobatis repandis tomentoſis.*

—— (patula) *Plukn t.* 378. *f.* 1.

—— (aculeata) *caule lanato multifloro, floribus ſeſſilibus terminalibus, foliis lineari-cuſpidatis repandis tomentoſis ſæpius ternis.*

CARTHAMUS (lanatus) *Col. ecphr. t.* 25.

—— (rigidus) *caule folioſo multifloro, foliis radicalibus petiolatis ovato-lanceolatis ſinuoſis ſpinoſis ſubtus tomentoſis.*
β var. caule unifloro, foliis anguſtioribus.

—— (glaber) *foliis ſeſſilibus ovatis glabris integerrimis, hinc inde ſpinuloſis.*

DISCOIDEÆ.

BIDENS (tenella) *Linn. ſp.* 1166. *afr.* 47.

CACALIA (papillaris) *Dill. elth. t.* 55. *f.* 63.

—— (anteuphorbium) *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 7. *t.* 37. *f.* 10. *Dill. elth. t.* 55. *f.* 2. 3.

—— (Ficoides) *Commel. rar. t.* 40. *Bradl. ſucc. t.* 49.
tres hujus varietates in hortis coluntur, foliorum magnitudine & forma diverſæ.

AGERATUM (conyzoides) *Herm. parad. t.* 161. *Plukn. phyt. t.* 88. *f.* 1.

PTERONIA (camphorata) *Plukn. t.* 56. *f.* 2.

STÆHELINA (gnaphaloides) *Plukn. t.* 302. *f.* 3. *Petiv. gazoph. t.* 6. *f.* 11.

——— (centauroides) *foliis linearibus integerrimis glabris, ſquamis calycinis ovatis imbricatis.*

CHRYSOCOMA (oppoſitifolia) *Breyn. cent. t.* 17. *f.* 2.

——— (incana) *fruticoſa, ramis oppoſitis divergentibus apice trifloris, foliis linearibus obtuſis tomentoſis.*

Frutex ſimilis oppoſitifoliæ, ramulis brachiatis, floreſcentibus tripollicaribus in medio in duo vel tria brachia diviſis, ſingulis foliolis confertis oppoſitis ſubconnatis, flores ut in oppoſitifolia *ſeſſiles.*

——— (Coma aurea) *Plukn. t.* 327. *f.* 2. *Volkam. norimb. t.* 148.

——— (cernua) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 45.

——— (ciliata) *Commel. ibid. t.* 48.

——— (ſcabra) *Dill. t.* 88. *f.* 103.

——— (gnaphaloides) *fruticoſa, foliis linearibus ſparſis tomentoſis.*

ß var. caule glaberrimo, foliis linearibus glabris, tota quoque tomentoſa.

——— (pinifolia) *arboreſcens, foliis confertis adpreſſis linearibus, apice ſubulatis.*

TARCHONANTHUS (camphoratus) *Herm. lugdb. t.* 229. *Plukn. t.* 174. *f.* 1.

ATHANASIA (ſquarroſa) *Linn. ſp.* 1180. *afr.* 52.

——— (crenata) *Linn. H. Cliff.* 398.

——— (capitata) *Breyn. cent. t.* 78.

——— (lævigata) *Linn. ſp.* 1181.

——— (dentata) *Commel. rar. t.* 41.

——— (trifurcata) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 49.

——— (crithmifolia) *Burm. afr. t.* 69. *f.* 1. *Mill. dict. t.* 327. *f.* 2. *Commel. H. Amſt. t.* 50. *Plukn. t.* 302. *f.* 7.

——— (pubeſcens) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 47.

ATHANASIA (annua) *Herm. lugdb. t.* 227. *Triumf. obſ. t.* 86.

——— (linifolia) *fruteſcens, corymbo terminali, pedunculis unifloris, foliis lineari-ovatis glaberrimis. herb. Old.*

CALLICORNIA (gnaphaloides) *ramis unifloris, floribus ſubſeſſilibus, foliis linearibus. Plukn. t.* 350. *pl.* 4.

Frutex ramis *e cicatricibus ſcabriuſculis,* folia *trifaria erectiuſcula linearia pollicaria tomentoſa,* flores *ſolitarii terminales ſubſeſſiles;* cal. *communis ovatus imbricatus, ſquamis membranaceis coloratis.* cor. *compoſita radiata, corollulæ hermaphroditæ tubuloſæ pubeſcentes, fœmineæ ligulatæ lanceolatæ trifidæ.* Stam. *hermaphroditorum* filamenta *quinque.* anth. *cylindraceæ tubuloſæ.* Piſt. germ. *utriſque parvum.* ſtyl. *filiformis.* ſtigma *bifidum.* Peric. *calyx immutatus.* Sem. *ſingulis ſolitaria, pappo plumoſo quinqueſeto.* recept. *paleis floſculos diſtinguentibus.*

hujus varietas foliis breviſſimis tenuioribus glaberrimis.

——— (tenuifolia) *floribus pedunculatis minoribus, foliis capillaceis ſæpius faſciculatis.*

——— (triflora) *ramis trifloris, foliis ovato-linearibus glabris.*

SUPERFLUA.

TANACETUM (crithmifolium) *Burm. afric. t.* 68. *f.* 4. *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 57. *Petiv. gazoph. t.* 34. *f.* 1.

——— (ſuffruticoſum) *Plukn. t.* 430. *f.* 7. *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 100.

——— (fruteſcens) *Commel. ibid. t.* 101.

——— (capenſe) *foliis radicalibus pinnatifido-lyratis, caulinis amplexicaulibus cordato-lanceolatis dentatis, caulibus herbaceis nudiuſculis.*

ARTEMISIA (æthiopica *Linn. ſp.* 1184.

——— (ambigua) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 59.

GNA-

Gnaphalium (arboreum) *Linn. ſp.* 1191. *afr.* 53.
ß Burm. afr. t. 79. *f.* 4. *pluresque hujus reperiuntur varietates, florum & foliorum magnitudine diverſæ.*
—— (grandiflorum) *Burm. afr. t.* 86. *f.* 1.
foliis orbicularibus ovatis & lanceolatis, floribus albis, & luteis minoribus variat.
—— (coronatum) *Burm. afr. t.* 69. *f.* 3.
—— (diſcolorum) *Linn. ſp.* 1191.
—— (niveum) *Burm. afr. t.* 77. *f.* 1.
—— (muricatum) *Burm. afr. t.* 79. *f.* 1. *Petiv. gazoph. t.* 7. *f.* 3. *Plukn. t.* 406. *f.* 6.
ß Burm. d. l. f. 2. 3. *Petiv. t.* 8. *f.* 1. *Plukn. t.* 410. *f.* 2.
—— (ericoides) *Linn. ſp.* 1193. *afr.* 57.
—— (teretifolium) *Burm. afr. t.* 77. *f.* 3. *Plukn. t.* 308. *f.* 2.
—— (dentatum) *Burm. afr. t.* 68. *f.* 3.
—— (ſerratum) *Burm. afr. t.* 76. *f.* 3. *Breyn. prodr. t.* 18. *f.* 2.
—— (patulum) *Linn. ſp.* 1194.
—— (ſpatulatum) *Breyn. prodr. t.* 18. *f.* 3.
—— (petiolatum) *Burm. afr. t.* 76. *f.* 2.
—— (cylindricum) *Plukn. t.* 298. *f.* 4.
—— (orientale) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 55. *Moris. hiſt.* 3. *f.* 7. *t.* 10. *f. ult.*
—— (rutilans) *Dillen. eltb. t.* 107. *f.* 127.
—— (imbricatum) *Burm. afr. t.* 80. *f.* 2.
—— (cymoſum) *Dillen. eltb. t.* 107. *f.* 128.
—— (nudifolium) *Breyn. cent. t.* 71.
—— (plantagineum) *herbaceum, foliis radicalibus petiolatis ovato-lanceolatis quinquenerveis ſcabris, cau-linis binis ſeſſilibus, corymbo compoſito. Petiolis foliis longioribus, foliis ovatis a præcedenti differt.*
—— (fætidum) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 56. *Plukn. t.* 243. *f.* 1. *Moris. f.* 7. *t.* 20. *f.* 32.
—— (undulatum) *Dillen. eltb. t.* 108. *f.* 130.
—— (criſpum) *Plukn. t.* 298. *f.* 3.
—— (helianthemifolium) *Volkam. Norimb. t.* 194.
—— (ſquarroſum) *Plukn. t.* 323. *f.* 1.
—— (ſtellatum) *Burm. afr. t.* 8. *f.* 1.
—— (indicum) *Plukn. t.* 187. *f.* 5.
—— (glomeratum) *Linn. ſp.* 1200.
—— luteo-album) *Linn. ſyſt.* 1210.
—— (plenum) *Burm. afr. t.* 78. *f.* 3.
—— (ſeſſile) *Burm. afr. t.* 80. *f.* 3.
—— (ſtæchas) *Linn. ſyſt.* 121.
—— (incanum) *Burm. afr. t.* 78. *f.* 1.
—— (radicans) *caule fruticoſo radicante, floribus cymoſis, foliis linearibus mucronatis.*

Xeranthemum (veſtitum) *Burm. afr. t.* 66. *f.* 1. *Petiv. gaz. t.* 1. *f.* 9. *Seb. theſ.* 2. *t.* 43. *f.* 5.
—— (ſpecioſiſſimum) *Burm. afr. t.* 66. *f.* 2. *Breyn. prodr. t.* 71. *f.* 1. *Seb. theſ.* 2. *t.* 89. *f.* 6.
—— (proliferum) *Linn. ſp.* 1202.
—— (caneſcens) *Burm. afr. t.* 68. *f.* 1.
—— (imbricatum) *Breyn. prod. t.* 18. *f.* 1.
—— (retortum) *Dill. eltb. t.* 322. *f.* 415.
—— (ſpinoſum) *Burm. afr. t.* 67. *f.* 3.
—— (ſeſamoides) *Burm. afr. t.* 67. *f.* 2.
ß Plukn. t. 449. *f.* 9. *Breyn. prodr. t.* 16. *f.* 2.

Xeranthemum (paniculatum) *Burm. afr. t. 67. f. 1.*
quæ foliis lanceolatis & ovatis.
——— (tenuifolium) *Burm. afr. t. 66. f. 3.*
——— (ramoſum) *fruticoſum, foliis ovato-lanceolatis tomentoſis, ramis ſubfolioſis unifloris.*
——— (leucanthemifolium) *fruticoſum, foliis ſeſſilibus pinnatifidis ſerratis.*
Baccharis (ivæfolia) *Plukn. t. 328. f. 2. Feuill. peruv. t. 37.*
——— (neriifolia) *Linn. ſp. 1204.*
——— (indica) *Breyn. cent. t. 70. a qua miſſa ſpecimina differunt, foliis profundis dentatis, & anguſtioribus.*
——— (ulmifolia) *foliis petiolatis ovatis ſerrato-dentatis.*
Conyza (linifolia) *Plukn. t. 79. f. 2. Capenſis folia minora, caulis pubeſcens corymboſus, corolla nuda.*
——— (ſaxatilis) *Moris. biſt. 3. ſ. 7. t. 10. f. 16. Bocc. muſ. t. 104. Baub. prodr. t. 123.*
——— (bifrons) *Plukn. t. 87. f. 4.*
——— (tomentoſa) *foliis confertis oblongis, caule corymboſo, corollis radiatis.*
Erigeron (dentatum) *Plukn. t. 223. f. 5.*
——— (tuberoſum) *Moris. biſt. 3. ſ. 7. t. 19. f. 20.*
——— (fætidum) *Herm. lugdb. t. 662. Plukn. t. 223. f. 4.*
Pardisium (capenſe) *berb. Old. planta acaulis. folia radicalia plurima runcinata tripollicaria. ſcapi aphylli, longitudine foliorum uniflori. cal. communis imbricatus, foliis lanceolatis, longitudine floris. cor. bermaphrodita, diſci tubuloſa quinquefida, radii ligulata tridentata linearis. ſtam. filamenta quinque brevia, antheræ cylindricæ tubuloſæ. Piſt. germen ovatum, ſtylus ſemibifidus, ſtigma obtuſum. peric. calyx immutatus. ſemina ovata, pappo plumoſo, longitudine calycis, receptaculum paleaceum.*

Senecio (hieracifolius) *Herm. parad. t. 226. Plukn. t. 112. f. 1.*
——— (perſicæfolius) *Linn. ſp. 1215.*
——— (virgatus) *Linn. ibid. afr. 63.*
——— (purpureus) *Breyn. cent. t. 67.*
——— (haſtulatus) *Dill. eltb. t. 152. f. 184.*
——— (pubigerus) *Moris. biſt. 3. ſ. 7. t. 18. f. 32. Breyn. cent. t. 65.*
——— (elegans) *Commel. H. Amſt. 2. t. 30. Seb. theſ. t. 22. f. 1. β Volk. norimb. t. 225.*
——— (umbellatus) *Linn. ſp. 1220.*
——— (linifolius) *Boccon. muſ. t. 49.*
——— (Doria) *Dill. eltb. t. 105. f. 125. & berb. Old.*
——— (longifolius) *Commel. H. Amſt. 2. t. 71. Breyn. cent. t. 63. Plukn. t. 421. f. 5.*
——— (halimifolius) *Dillen. eltb. t. 104. f. 124.*
——— (ilicifolius) *Commel. rar. t. 42.*
——— (rigens) *Commel. H. Amſt. t. 72. Volkam. norimb. t. 226.*
——— (rigidus) *Commel. H. Amſt. 2. t. 75. Seb. theſ. t. 22. f. 4.*
——— (populifolius) *Linn ſp. 1224.*
——— (verbaſcifolius) *corollis revolutis, foliis petiolatis ovato-oblongis crenulatis tomentoſis, caule fruticoſo, ex tomento albicante & foliorum figura Verbaſcum babitu refert, Flores terminales ex foliolorum axillis ſex capitati.*
——— (lanatus) *Linn. ſyſt. 1216. binæ in Oldenl. berb. babentur bujus ſpecimina, magnitudine & foliorum figura diverſa.*
——— (lanigerus) *corollis radiantibus, foliis pinnatifidis, caule ſimplici unifloro ſubnudo, radice tuberoſa. ad foliorum ortum ex radice lanugineſum tomentum.*
——— (lanceolatus) *corollis radiantibus, foliis ſemi-amplexicaulibus lanceolatis ſerratis ſubtus tomentoſis, floribus corymboſis.*
Aster (polifolius) *Linn. ſp. 1224.*
——— (taxifolius) *ibid. afr. 69.*
——— (reflexus) *ibid. afr. 68. Commel. H. Amſt. 2. t. 28.*

As-

ASTER (crinitus) *Linn. ſp.* 1225.
—— (fruticoſus) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 27. *β Plukn. t.* 340. *f.* 19.
—— (tenellus) *Plukn. t.* 271. *f.* 4.
—— (oppoſitifoliis) *Mill. t.* 76. *f.* 2.
—— (æthiopicus) *foliis oppoſitis ovali-oblongis, margine carinaque ſcabris, pedunculis nudis, caule fruticoſo.*
—— (linarifolius) *Plukn. t.* 14. *f.* 7.
—— (linifolius) *Linn. ſp.* 1228.
—— (tradeſcanti) *Linn. ibid.* 1231. *& herb. Old.*
—— (hyſſopifolius) *foliis faſciculatis linearibus obtuſiuſculis, pedunculis nudis unifloris.*
Fruticoſo adfinis, folia vero magis faſciculata tenuiora, flores minores violacei.
SOLIDAGO (canadenſis) *Plukn. t.* 236. *f.* 1. *& herb. Oldenl.*
—— (lanceolata) *Roy. prodr.* 163. *n.* 13.
—— (retuſa) *foliis inæqualibus cuneiformibus, apice cuſpidatis.*
INULA (dyſenterica) *Linn. ſp.* 1237. *& herb. Oldenl.*
—— (hirta) *ibid.*
—— (aromatica) *Plukn. t.* 326. *f.* 2.
—— (pinifolia) *Breyn. cent. t.* 64. *Plukn. t.* 350. *f.* 4.
—— (fætida) *Mill. ic.* 233.
—— (lanigera) *caule fruticoſo, foliis lanceolatis tomentoſis.*
differunt ſpecimina, foliis glaberrimis & ex lana tomentoſis.
CINERARIA (geifolia) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 73. *Seb. theſ.* 1. *t.* 22. *f.* 2. *Plukn. t.* 421. *f.* 4.
—— (cymbalarifolia) *Linn. ſp.* 1242.
—— (ſonchifolia) *Breyn. prodr.* 3. *t.* 21.
—— (linifolia) *Linn. ſp.* 1244. *afr.* 82.
—— (othonnites) *ibid.*
—— (amelloides) *Mill. ic. t.* 76. *f.* 2.
ARNICA (piloſelloides) *Linn. ſp.* 1245. *afr.* 73.
—— (crocea) *Burm. afr. t.* 56. *f.* 2. *Plukn. t.* 343. *f.* 4.
ARNICA (caffra) *Linn. ſyſt.* 1219. *Burm. afr. t.* 55.
—— (Gerbera) *Burm. afr. t.* 56. *f.* 1. *Buxb. cent.* 5. *f.* 24. *Plukn. t.* 313. *f.* 5.
—— (coronopifolia) *Linn. ſp.* 1247.
PERDICIUM (ſemifloſculare) *Linn. ſp.* 1248. *afr.* 72.
LEYSERA (gnaphaloides) *Herm. lugdb. t.* 71. *Breyn. prodr. t.* 14. *f.* 3.
TAGETES (patula) *Dillen. eltb. t.* 279. *f.* 361.
—— (erecta) *Linn. ſp.* 1249.
CHRYSANTHEMUM (floſculoſum) *Alp. exot. t.* 326.
—— (ericæfolium) *Burm. afr. t.* 58. *f.* 2.
—— (ſegetum) *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 6. *t.* 4. *f.* 1. *& herb. Old.*
COTULA (anthemoides) *Dillen. eltb. t.* 23. *f.* 25. *Plukn. t.* 274. *f.* 5.
—— (coronopifolia) *Dillen. eltb. t.* 23. *f.* 26. *Breyn. cent. t.* 76.
—— (turbinata) *Breyn. cent. t.* 73.
—— (linifolia) *foliis linearibus villoſis, corollis abſque radio*
ANACYCLUS (creticus) *Linn. ſp.* 1259. *& herb. Old.*
ANTHEMIS (leucantha) *Linn. ſp.* 1261. *afr.* 75.
—— (altiſſima) *Linn. ſp.* 1259. *& herb. Oldenl.*
—— (afra) *foliis oblongis dentatis, caule fruteſcente, pedunculis longis folioſis unifloris.*
ACHILLÆA (inodora) *Linn. ſp.* 1265.
—— (faſciculata) *foliis faſciculatis linearibus cinereis, caule fruticoſo, floribus corymboſis.*
—— (ptarmica) *Linn. ſp.* 1266. *& herb. Old.*
BUPHTHALMUM (capenſe) *Linn. ſp.* 1274. *afr.* 15.
differt latitudine foliorum.
—— (ſalicifolium) *Mich. flor. t.* 3. 4. *& herb. Oldenl.*
—— (durum) *Plukn. t.* 21. *f.* 3.
—— (leucoifolium) *Breyn. prodr. t.* 15. *f.* 2.

BUPHTHALMUM? (tenuifolium) *foliis linearibus, caule fruticoſo, calycibus lanatis.*
——— (maritimum) } *Linn. ſp.*
——— (ſpinoſum) } 1275. &
——— (aquaticum) } *herb. Old.*
AMELLUS (lychnitis) *Linn. ſp.* 1276.
——— (tenuifolius) *foliis ſubalternis linearibus, pedunculis unifloris.*

FRUSTRANEA.

GORTERIA (perſonata) *Plukn. t.* 273. *f.* 6.
——— (ringens) *Mill. ic. t.* 49.
——— (ſquarroſa) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 28.
——— (ciliaris) *Burm. afr. t.* 54. *f.* 1. *Plukn. t.* 354. *f.* 3. *Seb. theſ.* 1. *t.* 23. *f.* 1.
——— (fruticoſa) *Waltb. hort. t* 7. *Plukn. t.* 273. *f.* 5.
——— (mitis) *Burm. afr. t.* 54. *f.* 2.
OSMITES (Bellidaſtrum) *Linn. ſp.* 1285.
——— (camphoria) *Linn. ibid. afr.* 78.
——— (aſteriſcoides) *Burm. afr. t.* 58. *f.* 1. *Seb. theſ.* 1. *t.* 16. *f.* 4.
CENTAUREA (incana) *calycibus inermibus, foliis oblongis dentatis tomentoſis, caule fruteſcente.*
——— (odorata) *Breyn. cent. t.* 72.
——— (benedicta) *Linn. ſp.* 1296. *herb. Old.*
——— (montana) *ibidem.*

NECESSARIA.

CALENDULA (officinalis) *Linn. ſp.* 1304. & *herb. Old.*
——— (pluvialis) *Mill. ic. t.* 75. *f.* 2. *Herm. lugdb. t.* 105. *Breyn. icon. t.* 14. *f.* 1.
——— (hybrida) *Mill. ic. t.* 75. *f.* 1.? *Breyn. ic. t.* 14. *f.* 2.
——— (nudicaulis) *Commel. H. Amſt. t.* 33.
——— (graminifolia) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 34. *Plukn. t.* 370. *f.* 7. *Mill. dict. t.* 76.

differt foliis integerrimis & denticulatis.
——— (fruticoſa) *Linn. ſp.* 1305.
——— (monſtroſa) *foliis oblongis ſinuato-dentatis, caule ſubnudo corymboſo, floribus nutantibus.*
ARCTOTIS (ſuperba) *Volk. norimb. t.* 224.
——— (triſtis) *Breyn. icon. t.* 15.
——— (Calendula) *Herm. lugdb. t.* 42. *Commel. rar. t.* 36.
——— (acaulis) *Commel. rar. t.* 35.
——— (plantaginea) *Linn. ſp.* 1306.
——— (anguſtifolia) *ibidem.*
——— (aſpera) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 22. *Boerh. lugdb. t.* 120.
——— (carduifolia) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 23.
——— (paradoxa) *Plukn. t.* 312. *f.* 5.
——— (paleacea) *Burm. afr. t.* 65. *f.* 1.
——— (anthemoides) *ibid. t.* 63. *f.* 2. *Plukn. t.* 275. *f.* 7.
——— (dentata) *Burm. afr. t.* 64. *Plukn. t.* 276. *f.* 2. *β t.* 382. *f.* 5.
——— (aurea) *Burm. afr. t.* 57. *f.* 2.
——— (trifurcata) *floſculis radiantibus ſterilibus, foliis pinnatis linearibus, apice trifurcatis.*
——— (rigida) *acaulos, floſculis radiantibus linea viridi luteis, foliis pinnatis oblongis ſubtus tomentoſis.*
——— (aſplenifolia) *foliis ſimplicibus & pinnatis, laciniis lanceolatis ſubtus tomentoſis, margine repandis. forte præcedentis varietas, habitu tamen valde diverſa.*
OSTEOSPERMUM (piſiferum) *Burm. afr. t.* 61. *f.* 2. *Mill. ic. t.* 194. *f.* 1.
——— (ilicifolium) *Burm. afr. t.* 62.
——— (ſpinoſum) *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 43. *Volk. norimb. t.* 105.
——— (moniliferum) *Dillen. elth. t.* 68. *f.* 79. *Plukn. t.* 382. *f.* 4. *Breyn. cent. t.* 76.
——— (polygaloides) *Plukn. t.* 382. *f.* 2.

Os-

Osteospermum (dentatum) *foliis lanceolatis ſinuoſo-dentatis rigidis, floribus corymboſis.*
——— (incanum) *foliis obovatis integerrimis ſubtus tomentoſis.*
——— (rubens) *Burm. afr. t. 61. f. 2.*

Othonna (bulboſa) *Breyn. cent. t. 66. Linn. ſp. 1309. cum varietatibus ex Oldenl. herbario deſumtis.*
——— (dentata) *Burm. afr. t. 59.*
——— (Tagetes) *Linn. ſp. 1309.*
——— (pectinata) *Commel. H. Amſt. 2. t. 69. Mill. ic. t. 194. f. 2.*
——— (abrotanifolia) *Commel. H. Amſt. 2. t. 32. Plukn. t. 323. f. 2. Seb. theſ. t. 23. f. 6. Volkam. norimb. t. 225.*
——— (coronopifolia) *Commel. H. Amſt. 2. t. 70.*
——— (cheirifolia) *Duham. arb. t. 17.*
——— (linifolia) *foliis linearibus, caule fruticoſo erecto.*
——— (arboreſcens) *Dillen. elth. t. 103. f. 123.*

Eriocephalus (africanus) *Dill. elth. t. 110. f. 134. Walth. hort. t. 1.*
——— (racemoſus) *Linn. ſp. 1311. afr. 87.*
β foliis linearibus indiviſis minoribus, ad ramulorum exortum faſciculatis, racemis florum ſpicatis.
Lanugo interjecta albiſſima, quæ in præcedenti e rubro ſplendens.

SEGREGATA.

Sphæranthus (africanus) *Plukn. t. 108. f. 7.*
Stoebe (æthiopica) *Linn. ſp. 1315.*

SYNGENESIA MONOGAMIA.

Seriphium (cinereum) *Petiv. gazoph. t. 3. f. 9. Plukn. t. 297. f. 1. & 445. f. 2. quæ melior.*
——— (plumoſum) *Petiv. gazoph. t. 5. f. 4. Breyn. cent. 1. t. 12.*
——— (fuſcum) *Breyn. cent. t. 69. Petiv. gazoph. t. 5. f. 2. & t. 8. f. 1.*

Corymbium (africanum) *Burm. afr. t. 70. f. 1. Plukn. t. 272. f. 4.*
——— (gramineum) *Plukn. t. 272. f. 5.*
habitu ac forma multo tenerior præcedenti, ut & citata Plukn. figura; Caul. ſpithameus, folia radicalia linearia ſcirpi inſtar, caulina breviſſima, corymbus pedicellis ſubbifloris.

Lobelia (pinifolia) *Burm. afr. t. 41. f. 2. Breyn. cent. t. 87.*
——— (paniculata) *Burm. afr. t. 38. f. 3.*
——— (Phyteuma) *Linn. ſp. 1319.*
——— (bulboſa) *Burm. afr. t. 38. f. 2.*
——— (tuberoſa) *ibid. t. 40. f. 1.*
——— (Cheiranthus) *Commel. H. Amſt. 2. t. 42.*
——— (cardinalis) *Moris. hiſt. 2. ſ. 5. t. 5. f. 54. & herb. Oldenl.*
——— (Erinus) *Herm. lugdb. t. 111. quæ figura foliorum differt.*
——— (erinoides) *ibid. t. 109.*
——— (zeylanica & hirta) *Linn. ſp. 1. p. 935. & herb. Oldenl. Seb. theſ. t. 22. f. 12.*
——— (lutea) *Burm. afr. t. 39. f. 1.*
——— (hirſuta) *ibid. t. 40. f. 2.*
——— (coronopifolia) *ibid. t. 38. f. 1. Breyn. cent. t. 88.*
——— (comoſa) *Linn. ſp. 1322.*
——— (capitata) *caule erecto, foliis lanceolatis dentatis, floribus terminalibus.*
quoad foliaturam Coronopifoliam æmulatur, flores vero plures pedicellati capitati, uti ex viva mihi adparuit planta.
——— (tenella) *caule proſtrato ſuffruticoſo, foliis linearibus.*
——— (volubilis) *caule volubili, foliis linearibus.*
in ſicco ſpecimine corolla apparet dipetala hians, ad fundum diviſa, labio ſuperiori bifido, inferiori trifido, laciniis exterioribus ovatis, media productiore oblonga. ſtam. fil. breviſſima, antheræ exterius pilis albicantibus hirtæ.

Viola (tricolor) *Renealm. ſp. t. 140. & herb. Oldenl. ubi & alba occurrit.*

GYNANDRIA DIANDRIA.

ORCHIS (bicornis) *Buxb. cent.* 3. *t.* 8.
——— (biflora) *Linn. ſp.* 1330.
——— (cornuta) *ibid.*
——— (flexuoſa) *ibid.* 1331.
——— (papilionacea) *ibid. & berb. Oldenl.*
——— (burmanniana) *ibid.* 1334.
——— (cernua) *bulbis indiviſis, nectarii labio quinquefido, folio cordato, ſcapo birſuto ſpicato, floribus cernuis.*
——— (foliacea) *Buxb. cent.* 3. *t.* 14.
——— (depſata) *Buxb. cent.* 3. *t.* 12.
——— (tenuifolia) *bulbis indiviſis, ſcapo folioſo, foliis linearibus erectis.*
——— (calcarata) *bulbis divaricatis, corollæ galea fornicata cornuta, alis patentibus, labio prominulo, calcari longiſſimo.*
β *Buxb. cent.* 3. *t.* 10.
SATYRIUM (capenſe) *Linn. ſp.* 1339.
——— (cornutum) *bulbis palmatis, foliis radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis, flore unico cornuto.*
OPHRYS (catholica) *Buxb. cent.* 3. *t.* 21.
——— (circumflexa) *ibid. t.* 13.
——— (caffra) *Linn. ſp.* 1344.
SERAPIAS (longifolia) *Linn. ſp.* 1345. *& berb Petiv.*
ARETHUSA (capenſis) *ibid.* 1346.

TRIANDRIA.

FERRARIA (undulata) *E. N. C.* 1761. *t.* 3. *f.* 1. *Mill. ic.* 280. *Ferr. fl. cult. t.* 171. *Rudb. elyſ. p.* 49. *f.* 9. *Barr. ic.* 1216. *Moris. biſt.* 2. *ſ.* 4. *t.* 4. *f.* 7.

HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA (longa) *Mill. ic. t.* 51. *& berb. Old.*

POLYANDRIA.

GREWIA (occidentalis) *Commel. H. Amſt.* 1. *t.* 85. *Seb. theſ.* 1. *t.* 29. *f.* 3. *Dubam. arb. t.* 108. *Plukn. t.* 237. *f.* 1.
CALLA (æthiopica) *Commel. H. Amſt. t.* 60.
BRABEJARIA (verticillata). *Plukn. t.* 265. *f.* 3. *noſtram optime refert plantam excepta fructificatione, Folia verticillata ſeptem petiolata lanceolata dentata lævia ſubtus tomentoſa. Amenta axillaria ſolitaria erecta pedunculata brevia, ſquamis undique imbricatis ovatis acutis multifloris: floſculorum calyx nullus, corolla infundibuliformis quinquefida, ſtamina quinque, ſtylus unicus.*

MONOECIA TRIANDRIA.

PERPENSUM (blitiſpermum) *Plukn. t.* 18. *f.* 2.
Caul. nullus, folia radicalia reniformia crenulata. ſcapus bipedalis, amentis plurimis ſparſis, ex ſquamulis linearibus unifloris, cal. perianthium nullum. cor. nulla. ſtam. filam. nulla. Antheræ duæ ovales oppoſitæ geminæ. piſt. germ. ovatum acutum, apice bifido. ſtyli duo reflexi filiformes, ſtigmata ſimplicia. per. nullum. ſemen ovatum induratum, cortice tectum.

TETRANDRIA.

CENTILLA (villoſa) *Linn. ſp.* 1393. *afr.* 99.
——— (glabrata) *ibid. afr.* 100.
URTICA (urens) *Linn. ſp.* 1396. *differt tantum denticulis laciniatis.*

PENTANDRIA.

SERPICULA (ſerpillifolia) *foliis alternis lineari-oblongis.*
——— (thymifolia) *foliis alternis ovato-lanceolatis reflexis ſubtus lucidis. Flores maſculini pedunculati, foeminini ſeſſiles.*
XANTHIUM (ſpinoſum) *berb. Oldenl. Plukn. t.* 239. *f.* 1. *Herm. par. t.* 246. *Magnol. bort. t.* 208. *Volkam. norimb. t.* 149. *Moris. biſt.* 3. *ſ.* 15. *t.* 2. *f.* 3.
SOLANDRA (capenſis) *Linn. ſp.* 1407.

POLYANDRIA.

POTERIUM (ſanguiſorba) *Linn. ſp.* 1411. *& berb. Oldenl.*

Mo-

MONADELPHIA.

Thuja (aphylla) *Shaw. afr. f.* 188.

Cupressus (juniperoides) *Linn. ſp.* 1422.

Jatropha (Manihot) *Sloan. hiſt.* 1. *t.* 85.

Ricinus (communis) *Linn. ſp.* 1430. *& herb. Oldenl.*

SYNGENESIA.

Cucurbita (Citrullus) *Rumph. amb.* 5. *t.* 146. *& herb. Oldenl.*

Cucumis (prophetarum) *Shaw. afr.* 164. *& herb. Oldenl.*

——— (ſativus) *Linn. ſp.* 1437. *& herb. Oldenl.*

Bryonia (cordifolia) *Rumph. amb.* 5. *t.* 166.

hæc cum Bryonia alba ex Cap. B. Spei ſæpius miſſa fuit.

——— (africana) *Herm. parad. t.* 108.

Sicyos (angulata) *Dillen. elth. t.* 51. *f.* 59. *Plukn. phyt. t.* 26. *f.* 4.

DIOECIA TETRANDRIA.

Myrica (trifoliata) *Linn. ſp.* 1453. *afr.* 98.

——— (quercifolia) *Commel. Hort. Amſt.* 2. *t.* 81. *Burm. afr. t.* 98. *f.* 1.

——— (cordifolia) *Walth. hort. t.* 3. *Plukn. t.* 31. *f.* 7. *ß. Burm. afr. t.* 98. *f.* 3.

——— (ilicifolia) *Burm. afr. t.* 98. *f.* 2. *ß. Plukn. t.* 48. *f.* 9.

——— (conifera) *Plukn. t.* 48. *f.* 8.

Cannabis (ſativa) *Linn. ſp.* 1457. *& herb. Old.*

ENNEANDRIA.

Mercurialis (annua) *Linn. ſp.* 1465. *& herb. Oldenl.*

DECANDRIA.

Kiggelaria (africana) *Plukn. t.* 176. *f.* 3. *Sterb. citr. t.* 12.

Schinus (molle) *Seb. theſ.* 2. *t.* 5. *f.* 5.

POLYANDRIA.

Cliffortia (ilicifolia) *Dillen. elth. t.* 31. *f.* 35.

——— (ruſcifolia) *Linn. H. Cliff. t.* 31. *Plukn. t.* 297. *f.* 2.

——— (polygonifolia) *Linn. H. Cliff. t.* 32.

——— (trifoliata) *Plukn. t.* 319 *f.* 4.

——— (hirta) *foliis oblongis, pilis hiſpidis.*

SYNGENESIA.

Ruscus (Hypophyllum) *Dill. elth. t.* 251. *f.* 303. *& herb. Oldenl.*

——— (racemoſa) *Linn. ſp.* 1474. *& herb. Oldenl.*

GYNANDRIA.

Clutia (alaternoides) *Plukn. t.* 230. *f.* 1. *Burm. afr. t.* 43. *f.* 1. *Commel. H. Amſt.* 2. *t.* 2.

——— (polygonoides) *Burm. afr. t.* 43. *f.* 3.

——— (pulchella) *Commel. H. Amſt. t.* 91.

POLYGAMIA MONOECIA.

Celtis (africana) *Burm. afr. t.* 88.

Andropogon (muticum) *Moris. hiſt. ſ.* 8. *t.* 3. *f.* 11.

Valantia (cruciata) *Linn. ſp.* 1491. *& herb. Old.*

Atriplex (Halimus) *Linn. ſp.* 1492.

Mimosa (nilotica) *Veſling. ægypt. t.* 8. *Hern. Mexic. t.* 866. *Plukn. t.* 123. *f.* 1. *quæ inter depictas capenſes & ſiccas occurrit.*

——— (capenſis) *Plukn. t.* 123. *f.* 2.

DIOECIA.

Diospyros (Lotus) *Linn. ſp.* 1510.

Anthospermum (æthiopicum) *Linn. H. Cliff. t.* 27. *Plukn. t.* 183. *f.* 1. *Walth. hort. t.* 9.

——— (ciliare) *Plukn. t.* 244. *f.* 5.

Arctopus (echinatus) *Plukn. t.* 271. *f.* 5. *Burm. afr. t.* 1.

CRYPTOGAMIA FILICES.

Equisetum (capenſe) *caule tereti ſublignoſo glaberrimo, frondibus verticillatis, ſetis numeroſis longiſſimis, internodiis diviſis.*

Acro-

Acrosticum (heterophyllum) *Linn. amoen.* 1. *t.* 2. *Petiv. gazoph. t.* 53. *f.* 12.
—— —— (pectinatum) *Plukn. t.* 95. *f.* 7. *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 8. *t.* 9. *f.* 30.
—— —— (barbarum) *Plukn. t.* 181. *f.* 5.

Pteris (adianthoides) *Plukn. t.* 354. *f.* 4. & 1.

Blechnum (capenſe) *frondibus pinnatis, pinnis ſeſſilibus cordato-lanceolatis integerrimis.*

Asplenium (lucidum) *frondibus alternatim decompoſitis, pinnulis alternis pinnatifidis inciſo ſerrulatis glaberrimis.*
—— —— (Trichomanes) *Plukn. phyt. t.* 73. *f.* 6.

Polypodium (auriculatum) *Breyn. cent. t.* 44. *f.* 2. *Burm. Zeyl. t.* 44. *f.* 2. *Plukn. t.* 30. *f.* 4.
—— —— (lignoſum) *frondibus bipinnatis, pinnis alternis, pinnulis pinnatifidis, laciniis ovatis integerrimis.*

Adianthum (æthiopicum) *Plukn. t.* 253. *f.* 2.

Trichomanes (adianthoides) *Plukn. t.* 123. *f.* 6. *Burm. zeyl. t.* 43.
—— —— (æthiopicum) *frondibus bipinnatis, pinnis alternis, pinnulis pinnatifido-inciſis glabris.*

A L G Æ.

Fucus (natans) *Rumph. amb.* 6. *t.* 76. *f.* 2.
—— (granulatus) *Linn. ſp.* 1629. *hujus varietas ramulis petiolatis filiformibus tenuioribus, margine laciniis ciliatis.*
—— (cartilagineus) *ibid.* 1636.
—— (furcellatus) *Dill. muſc. t.* 10 *f.* 8.
—— (filiformis) *Dill. muſc. t.* 31. *f.* 9. *D.*
—— (denticulatus) *caule compreſſo ramoſo, ramis dentato-geniculatis ramuloſis ſubdichotomis.*
—— (faſtigiatus) *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 15. *t.* 9. *f.* 9. *capenſis caules craſſiores breviores ſæpius diviſi, apice non bifido.*
—— (plumoſus) *caule plano, margine laciniis inæqualiter plumoſis, ramis ſparſis.* *var. multo tenerior, ramis pluribus.*
—— (papilloſus) *Seb. theſ.* 3. *t.* 103. *f.* 2.
—— (foliaceus) *Dill. muſc. t.* 9. *f.* 4. *Seb. theſ.* 3. *t.* 103. *f.* 1.
—— (cartilagineus) *Seb. theſ.* 3. *t.* 102. *f.* 1. 2. *cujus plures varietates, colore & teneritudine diſtinctæ.*
—— (corneus) *Huds. angl. n.* 38.
—— (exciſus) *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 11.
—— (ciliatus) *Huds. angl. n.* 31.
—— (pinnatus) *fronde pinnata, pinnis alternis, pinnulis veſiculoſis oblongis.*
—— (membranaceus) *caule compreſſo, ramis oppoſitis, inferne ſimplicibus, ſuperne pinnatifidis.*
—— (verrucoſus) *ramulis ſimplicibus verrucoſis.*
—— (bifurcatus) *Moris. hiſt.* 3. *ſ.* 15. *t.* 8. *f.* 12.

Ulva (labyrinthiformis) *Dill. muſc. t.* 8. *f.* 1.

Conferva (littoralis) *ibid. t.* 4. *f.* 19.
—— —— (filamentoſa) *ibid. t.* 3. *f.* 11. *b.*
—— —— (radicalis) *ibid. t.* 2. *f.* 8.
—— —— (ſcoparia) *Linn. ſp.* 1635.

Cellularia (avicularia) *Pall. Zooph.* 68.
—— —— (floccoſa) *ibid.* 70.

F I N I S.

Ireon (*verticillatum*) } *eſt* { Roridula (*dentata*) } *Linn. in app. Generum,*
Geranium (*grandiflorum*) } { Grielum (*tenuifolium*) }

Vitia typographica atque errores benevolus corrigat Lector.

44. f.

ve

4 ffnch, 241 pp., 9 ffnch, 32 pp. [malch.

67 tav., ma sono 68 perchè la nume

della tav. 21 è ripetuta

gT. FM.

27080